ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____А. А. Цыглин
"30" 08 2019 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Факультетская терапия, профессиональные болезни

Разработчики	Кафедра факультетской терапии Кафедра терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО
Направление (специальность) подготовки	31. 05. 01 Лечебное дело
Наименование ООП	31. 05. 01 Лечебное дело
Квалификация	Врач-лечебник
ФГОС ВО	Утвержден приказом МОН РФ от 09. 02. 2016 № 95

СОГЛАСОВАНО
Председатель УМС специальности
Лечебное дело
_____проф. Д. А. Валишин
28. 06.2019г.

Одобрено на совместном заседании кафедры факультетской терапии и кафедры терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО 30.05.2019г.,протокол № 13

Начальник отдела качества образования и мониторинга
_____А. А. Хусаенова
«28» 08 2019г.

Утверждено на заседании ЦМК терапевтических дисциплин от 19.06.2019г., протокол № 7

1. Цель и задачи ФОМ(ФОС)

Цель ФОМ (ФОС) –установить уровень сформированности компетенций у обучающихся специалитета, изучивших **дисциплину** «Факультетская терапия, профессиональные болезни».

Основной задачей ФОМ (ФОС) дисциплины «Факультетская терапия, профессиональные болезни» является проверка знаний, умений и владений обучающегося согласно матрице компетенций рассматриваемого направления подготовки.

2. Паспорт тестового материала по дисциплине «Факультетская терапия, профессиональные болезни»

Наименование пункта	Значение
Факультет	Лечебный
Кафедра	Кафедра факультетской терапии. Кафедра терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО
Автор-разработчик	доц. Макеева Г. К., доц. Амирова Г.Ф., доц. Кудашева А. Р., асс. Хакимова Р.А., асс. Мирончук Н.Н.
Наименование дисциплины	Факультетская терапия, профессиональные болезни
Общая трудоемкость по учебному плану	396 часа (11 ЗЕ), из них по модулю «факультетская терапия» - 324 часа (9 ЗЕ), по модулю «профессиональные болезни» - 72 часа (2 ЗЕ)
Наименование папки	Оценочные материалы
Вид контроля	Промежуточная аттестация (по модулю «Факультетская терапия» в форме экзамена в VIIIсеместре, по модулю «Профессиональные болезни» в форме зачета в IX семестре)
Для специальностей	Лечебное дело
Количество тестовых заданий всего по дисциплине	1050, в том числе по модулю «Факультетская терапия» - 750, по модулю «профессиональные болезни» - 300
Количество заданий при тестировании обучающегося	200, в том числе по модулю «Факультетская терапия» - 100, по модулю «профессиональные болезни» - 100
Из них правильных ответов должно быть (%) :	71 % и более
Для оценки «отлично» не менее	91-100%
Для оценки «хорошо» не менее	81-90%
Для оценки «удовлетворительно» не менее	71-80%
Время тестирования (в минутах)	По модулю «факультетская терапия» - 100 минут, по модулю «профессиональные болезни» - 100 минут.

3. Тестовые вопросы

3.1. Тестовые вопросы по модулю «Факультетская терапия»

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
1.	**ПК-5**	ОСНОВНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ОЧАГОВОЙ ПНЕВМОНИИ
		1) притупление перкуторного звука
		2) бронхиальное дыхание в месте притупления
		3) лихорадка
		4) влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы
		5) ослабление дыхания
2.	**ПК-5**	ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ АУСКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЗНАК ДОЛЕВОЙ (КРУПОЗНОЙ) ПНЕВМОНИИ
		1) бронхиальное дыхание
		2) сухие хрипы
		3) крепитация
		4) влажные хрипы
3.	**ПК-5**	ОСНОВНОЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПНЕВМОНИИ
		1) гомогенное затемнение соответственно доле или сегменту
		2) картина ателектаза
		3) тяжистый легочный рисунок
		4) очаговые тени
		5) диффузное снижение прозрачности
4.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ ПРИ ДОЛЕВОЙ (КРУПОЗНОЙ) ПНЕВМОНИИ
		1) воспалительный процесс в легочной ткани
		2) поражение межреберных нервов
		3) скопление экссудата в плевральной полости
		4) развитие фибринозного воспаления плевры
5.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО ГРУДНАЯ КЛЕТКА НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЫ, СМЕЩЕНИЯ СРЕДОСТЕНИЯ НЕТ, ТУПОЙ ЗВУК ПРИ ПЕРКУССИИ, ЗВОНКИЕ ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ И ОТЧЕТЛИВАЯ КРЕПИТАЦИЯ. ВАШ ДИАГНОЗ
		1) долевая пневмония
		2) эмфизема
		3) пневмоторакс
		4) бронхоэктазы
		5) фиброз легкого
6.	**ПК-5**	ПРИ ФИЗИКАЛЬНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЛЯ ДОЛЕВОЙ (КРУПОЗНОЙ) ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРНО
		1) ослабление голосового дрожания, ослабление везикулярного дыхания, крепитация
		2) усиление голосового дрожания, бронхиальное дыхание, крепитация

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) усиление голосового дрожания, жесткое дыхание, крепитация
		4) ослабление голосового дрожания, жесткое дыхание, крепитация
7.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО 55 ЛЕТ ОБНАРУЖЕНО ОТСТАВАНИЕ ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ДЫХАНИИ, ПРИТУПЛЕНИЕ НИЖЕ УРОВНЯ 3-ГО РЕБРА, ТАМ ЖЕ - ОСЛАБЛЕННОЕ ДЫХАНИЕ И СНИЖЕНИЕ БРОНХОФОНИИ. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ - СМЕЩЕНИЕ СЕРДЦА ВЛЕВО. ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) гидроторакс
		2) крупозная пневмония
		3) ателектаз
		4) пневмоцирроз
		5) пневмоторакс
8.	**ПК-5**	ПРИЗНАК, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОЛЕВОЙ (КРУПОЗНОЙ) ПНЕВМОНИИ В ФАЗЕ ОПЕЧЕНЕНИЯ
		1) отставание одной половины грудной клетки при дыхании
		2) мелкопузырчатые влажные хрипы
		3) притупление соответственно доле
		4) усиленная бронхофония
		5) бронхиальное дыхание в зоне притупления
9.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТРЕПТОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ
		1) цефтриаксон
		2) гентамицин
		3) доксициклин
		4) бисептол
10.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФЛОРОЙ
		1) амоксициллин
		2) нитроксолин
		3) гентамицин
		4) тетрациклин
11.	**ПК-8**	АНТИБИОТИК 1РЯДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗНОЙ ПНЕВМОНИИ
		1) цефтриаксон
		2) гентамицин
		3) азитромицин
		4) бисептол
12.	**ПК-8**	ГРУППА АНТИБИОТИКОВ 1РЯДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗНОЙ ПНЕВМОНИИ
		1) пенициллины
		2) макролиды
		3) цефалоспорины
		4) аминогликозиды
		5) карбапенемы

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
13.	**ПК-5**	ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ ПНЕВМОНИИ
		1) лейкопения, анемия, тромбоцитопения
		2) лейкоцитоз, лимфоцитоз
		3) лейкоцитоз, тромбоцитоз
		4) лейкоцитоз со сдвигом влево
14.	**ПК-6**	К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЯМ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ
		1) микоплазмы
		2) пневмококк
		3) гемофильная палочка
		4) синегнойная палочка
15.	**ПК-6**	К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ФРИДЛЕНДЕРОВСКОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ
		1) пневмоциста
		2) пневмококк
		3) гемофильная палочка
		4) клебсиелла пневмонии
16.	**ПК-6**	ДЛЯ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРНО
		1) деструктивный характер пневмонии
		2) «ржавая» мокрота
		3) скудные физикальные данные
		4) частое развитие эмпиемы плевры
17.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) цефтриаксон
		2) амоксициллин
		3) азитромицин
		4) левофлоксацин
18.	**ПК-6**	ДЛЯ ИНФАРКТНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИ ТЭЛА ХАРАКТЕРНО
		1) деструктивный характер пневмонии с формированием множественных абсцессов
		2) внезапное появление одышки и боли в груди
		3) выраженные симптомы интоксикации
		4) частое развитие эмпиемы плевры
19.	**ПК-6**	ЛЕЙКОПЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ
		1) хламидиями
		2) пневмококком
		3) золотистым стафилококком
		4) кишечной палочкой
20.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВОЙ ПНЕВ-

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		МОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) цефтриаксон
		2) флуконазол
		3) азитромицин
		4) левофлоксацин
21.	**ПК-8**	ПРИ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ В ЛЕЧЕНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ
		1) пенициллин
		2) гентамицин
		3) бисептол
		4) ампиокс
22.	**ПК-5**	ПРИЗНАК НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПО РЕСТРИКТИВНОМУ ТИПУ
		1) снижение показателей пробы Тиффно
		2) снижение ОФВ1
		3) снижение ЖЕЛ
		4) снижение ЖЕЛ и ОФВ1одновременно добавила этот ответ-сверить эталон!
23.	**ПК-6**	В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ОТМЕЧЕНО МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПНЕВМОНИЕЙ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ С МАЛОПРОДУКТИВНЫМ КАШЛЕМ И ВЫРАЖЕННЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ ИНТОКСИКАЦИИ. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ - ДВУСТОРОННЕЕ УСИЛЕНИЕ ЛЕГОЧНОГО РИСУНКА В ПРИКОРНЕВЫХ ОБЛАСТЯХ, ПОЛИМОРФНЫЕ ОЧАГИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ АМОКСИЦИЛЛИНОМ, ЦЕФАЛОСПОРИНАМИ НЕЭФФЕКТИВНА. ВЕРОЯТНАЯ ЭТИОЛОГИЯ ПНЕВМОНИИ
		1) золотистый стафилококк
		2) микоплазма
		3) пневмоциста
		4) пневмококк
24.	**ПК-6**	ДЛЯ ФРИДЛЕНДЕРОВСКОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРНО
		1) деструктивный характер пневмонии с формированием множественных абсцессов
		2) «ржавая» мокрота
		3) скудные физикальные данные
		4) интерстициальный характер пневмонии
25.	**ПК-6**	У СЛУЖАЩЕЙ КРУПНОЙ ГОСТИНИЦЫ С КОНДИЦИОНЕРАМИ ОСТРО ПОВЫСИЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА ДО 40^{O}, ПОЯВИЛСЯ ОЗНОБ, КАШЕЛЬ С МОКРОТОЙ, КРОВОХАРКАНЬЕ, БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ ПРИ ДЫХАНИИ, МИАЛГИИ, ТОШНОТА, ДИАРЕЯ. ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ ВЫЯВЛЕНА ИНФИЛЬТРАЦИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ С ОБЕИХ СТОРОН. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ПНЕВМОНИИ
		1) клебсиелла

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		2) палочка Пфейффера
		3) легионелла
		4) золотистый стафилококк
26.	**ПК-6**	ПНЕВМОНИЯ СЧИТАЕТСЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ (ГОСПИ-ТАЛЬНОЙ), ЕСЛИ ОНА ДИАГНОСТИРОВАНА
		1) при поступлении в стационар
		2) через 2-3 дня и более после госпитализации
		3) после выписки из стационара
27.	**ПК-6**	ОСЛОЖНЕНИЮ ПНЕВМОНИИ АБСЦЕССОМ СПОСОБСТВУЕТ
		1) курение
		2) гипертоническая болезнь
		3) дефицит IgE
		4) иммунодефицитные состояния
28.	**ПК-6**	ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОСТРЫЙ АБС-ЦЕСС И ГАНГРЕНУ ЛЕГКОГО, ПРОНИКАЮТ В ЛЕГОЧНУЮ ТКАНЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
		1) по бронхам
		2) по лимфатическим сосудам
		3) по кровеносным сосудам
		4) при ранении легкого
29.	**ПК-6**	ГАНГРЕНУ ЛЕГКОГО ОТ ОСТРОГО АБСЦЕССА ОТЛИЧАЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ
		1) возбудителей заболевания
		2) более тяжелого течения заболевания с прогрессированием гнойно-некротических процессов в легких над деструктивными
		3) частого присоединения осложнений-кровохарканья и легочного кровотечения, острого пиопневмоторакса, сердечно-сосудистой не-достаточности
		4) отсутствия клинических и рентгенологических признаков отгра-ничения воспалительного процесса в легких
30.	**ПК-6**	ПОЯВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬ-НОГО С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
		1) смещением органов средостения в больную сторону
		2) усилением дыхательных шумов
		3) высоким стоянием диафрагмы
		4) втягиванием межреберий при вдохе
		5) ослаблением или отсутствием дыхательных шумов на стороне по-ражения
31.	**ПК-10**	ОСНОВНЫМИ И НАИБОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АБСЦЕССА ЛЕГКОГО ЯВЛЯЮТСЯ
		1) санационная бронхоскопия с местным применением антибактери-альных антисептических средств

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		2) катетеризация гнойника через трахею или грудную стенку
		3) трансторакальная пункция гнойника с промыванием полости в легком и введением в нее лекарственных средств
		4) все перечисленное
32.	**ПК-6**	БОЛЬНОЙ 50 ЛЕТ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ АЛКОГОЛЕМ, С ТЯЖЕЛЫМ КАРИЕСОМ ЗУБОВ. В ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ СЛАБОСТЬ, БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ СПРАВА. ЛИХОРАДКА, КАШЕЛЬ С ГНОЙНОЙ МОКРОТОЙ. НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ПОЛОСТЬ 3 СМ В ДИАМЕТРЕ В ВЕРХНЕЙ ДОЛЕ СПРАВА, НАПОЛНЕННАЯ ЖИДКОСТЬЮ. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) бронхоэктазы
		2) абсцесс
		3) инфаркт легкого
		4) рак легкого
		5) туберкулез
33.	**ПК-5**	ХАРАКТЕРИСТИКА АБСЦЕССА ЛЕГКОГО, СОЕДИНЕННОГО С БРОНХОМ
		1) притупление, ослабленное дыхание и бронхофония, смещение средостения в противоположную сторону
		2) то же, но смещение в сторону притупления
		3) притупление с тимпаническим звуком, амфорическое дыхание, крупнопузырчатые хрипы
		4) притупление, бронхиальное дыхание, усиленная бронхофония
		5) инспираторная одышка, уменьшение объема легких, крепитация
34.	**ПК-6**	ПОД ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОНИМАЮТ
		1) состояние, при котором не обеспечивается поддержание нормального газового состава крови, либо последнее достигается перенапряжением аппарата внешнего дыхания, ведущим к снижению его функциональных возможностей
		2) состояние, при котором не обеспечивается доставка необходимого количества кислорода к периферическим тканям
		3) состояние, при котором имеет место значительное снижение объемов дыхания (ЖЕЛ и др)
		4) состояние, при котором снижение функциональной способности легких (обструктивные и/или рестриктивные изменения) ведет к появлению одышки
		5) состояние, сопровождающееся острой или хронической альвеолярной гипоксией
35.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ ПРИ ОСТРОМ АБСЦЕССЕ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) лейкопения
		2) нейтрофильный лейкоцитоз
		3) лимфоцитоз
		4) эозинофилия
		5) моноцитоз

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
36.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ МОКРОТОЙ ДЛЯ II ПЕРИОДА АБСЦЕССА ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ
		1) слизисто-гнойная мокрота
		2) грязно-гнойная, расслаивающаяся при стоянии на 3 слоя
		3) прозрачная, тягучая, стекловидная
		4) “ржавая” или с прожилками крови
		5) слизистая
37.	**ПК-5**	КАКОЙ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МОКРОТЫ С ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДЕСТРУКЦИИ ТКАНИ ЛЕГКОГО
		1) кристаллы Шарко - Лейдена
		2) лейкоциты
		3) эластические волокна
		4) спирали Куршмана
		5) эритроциты
38.	**ПК-6**	ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГАНГРЕНЫ ЛЕГКОГО, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ОБУСЛОВЛЕНО
		1) воздействием инфекционного фактора-ассоциации гноеродной микрофлоры и неспорообразующих анаэробов
		2) местными условиями, благоприятными для вегетации возбудителей инфекции (при предшествующих хронических неспецифических заболеваниях легких, пороках развития легких и т. д.)
		3) общими факторами, снижающими резистентность макроорганизма к инфекции (иммунодефицит, тяжелый сахарный диабет, злокачественные опухоли, алиментарная дистрофия и т. д.)
		4) совокупностью всех перечисленных факторов
39.	**ПК-5**	У БОЛЬНОГО 35 ЛЕТ В ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ СЛАБОСТЬ, ПОТЛИВОСТЬ, УТОМЛЯЕМОСТЬ, БОЛИ В ПРАВОМ БОКУ ПРИ ДЫХАНИИ, ТЕМПЕРАТУРА 38°С, ЧД - 28 В МИНУТУ, ПУЛЬС - 100 В МИНУТУ. ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОТСТАЕТ ПРИ ДЫХАНИИ. ГОЛОСОВОЕ ДРОЖАНИЕ СПРАВА ВНИЗУ НЕ ПРОВОДИТСЯ, ТАМ ЖЕ ИНТЕНСИВНОЕ ПРИТУПЛЕНИЕ. ДЫХАНИЕ НАД НИЖНИМ ОТДЕЛОМ ПРАВОГО ЛЕГКОГО ОСЛАБЛЕНО. ГРАНИЦЫ СЕРДЦА СМЕЩЕНЫ ВЛЕВО. АНАЛИЗ КРОВИ: ЛЕЙК. – $12x10^9$/Л, П/Я - 13%, ЛИМФ. - 13%, СОЭ - 38 ММ/Ч. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) инфильтративный туберкулез легких
		2) плевропневмония
		3) экссудативный плеврит
		4) ателектаз
		5) спонтанный пневмоторакс
40.	**ПК-6**	ВОЗБУДИТЕЛЬ ПНЕВМОНИИ, ПРИ КОТОРОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАБЛЮДАЕТСЯ ДЕСТРУКЦИЯ ЛЕГКИХ
		1) пневмококк
		2) стрептококк
		3) стафилококк
		4) легионелла

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		5) вирус
41.	**ПК-8**	ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ
		1) стойкий выпот
		2) подозрение на эмпиему плевры
		3) подозрение на раковую этиологию
		4) неясные причины выпота
		5) во всех перечисленных случаях
42.	**ПК-5**	ХАРАКТЕРНЫЙ АУСКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЗНАК БРОНХОСПАЗМА
		1) сухие хрипы
		2) влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы
		3) амфорическое дыхание
		4) крепитация
43.	**ПК-5**	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАЗОВ
		1) рентгеноскопия легких
		2) томография легких
		3) бронхоскопия
		4) бронхография
		5) спирография
44.	**ПК-6**	ВЕДУЩИМ СИНДРОМОМ ПРИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) обратимая бронхиальная обструкция
		2) необратимая бронхиальная обструкция
		3) кашель
		4) кровохарканье
45.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ХОБЛ
		1) вишневый румянец щек
		2) акроцианоз «мраморный», холодный на ощупь
		3) бледность кожных покровов
		4) диффузный цианоз, теплый на ощупь
		5) цвет кожи не изменен
46.	**ПК-6**	МАРКЕРЫ ХОБЛ
		1) эозинофилы и необратимая бронхиальная обструкция
		2) нейтрофилы и необратимая бронхиальная обструкция
		3) эозинофилы и обратимая бронхиальная обструкция
		4) нейтрофилы и обратимая бронхиальная обструкция
47.	**ПК-5**	КОЛИЧЕСТВО ПАЧКА/ЛЕТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ
		1) число выкуриваемых сигарет в сутки х стаж курения (годы)
		2) число выкуриваемых сигарет в сутки х стаж курения (месяцы)
		3) число выкуриваемых пачек в неделю х стаж курения (недели)

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) число выкуриваемых сигарет в неделю х стаж курения (дни)
48.	**ПК-5**	ПАЦИЕНТА МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК ЗЛОСТНОГО КУРИЛЬЩИКА, ЕСЛИ ИНДЕКС КУРЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА (ИКЧ)
		1) >220
		2) >300
		3) >80
		4) >120
49.	**ПК-5**	ПОКАЗАТЕЛЬ $ОФВ_1$ ПРИ ХОБЛ 2 СТАДИИ СОСТАВЛЯЕТ
		1) ≥ 80%
		2) <80%
		3) < 50%
		4) < 30%
50.	**ПК-5**	ПОКАЗАТЕЛЬ $ОФВ_1$ ПРИ ХОБЛ 3 СТАДИИ СОСТАВЛЯЕТ
		1) ≥ 80%
		2) <80%
		3) < 50%
		4) < 30%
51.	**ПК-5**	БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ СЧИТАЕТСЯ ОБРАТИМОЙ, ЕСЛИ ПРИРОСТ $ОФВ_1$ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БРОНХОДИЛАТАЦИОННОГО ТЕСТА СОСТАВЛЯЕТ
		1) ≥ 50%
		2) ≥ 30%
		3) ≥ 25%
		4) ≥ 15%
52.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
		1) спирография
		2) пульсоксиметрия
		3) исследование газового состава артериальной крови
		4) исследование газового состава венозной крови
53.	**ПК-6**	СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА
		1) инспираторная одышка
		2) экспираторная одышка
		3) крепитация
		4) акроцианоз
54.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЯВЛЯЮЩИЙСЯ ХАРАКТЕР ПЕРКУТОРНОГО ЗВУКА ПРИ ХОБЛ
		1) не изменен
		2) тимпанический
		3) укороченный
		4) коробочный

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		5) перкуторная тупость
55.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ
		1) диффузионная способность (по CO_2)
		2) остаточный объем
		3) максимальная вентиляция легких (МВЛ)
		4) проба Тиффно
		5) жизненная емкость легких (ЖЕЛ)
56.	**ПК-6**	ЗАБОЛЕВАНИЯ (ЗАБОЛЕВАНИЕ), ПРИВОДЯЩИЕ (ЕЕ) К РАЗВИТИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА
		1) хронический обструктивный бронхит
		2) силикоз
		3) фиброзирующий альвеолит
		4) ожирение
		5) все вышеперечисленные заболевания
57.	**ПК-6**	ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРИЗНАК, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ХРОНИЧЕСКОМУ БРОНХИТУ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ БРОНХОВ
		1) свистящие хрипы на выдохе
		2) сухие хрипы на вдохе
		3) сухие жужжащие хрипы на вдохе и выдохе
		4) звонкие влажные хрипы по передней поверхности грудной клетки
		5) не звонкие влажные хрипы над проекцией базальных отделов
58.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ СИММЕТРИЧНЫ, КОРОБОЧНЫЙ ЗВУК ПРИ ПЕРКУССИИ, ОСЛАБЛЕННОЕ ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ С УДЛИНЕННЫМ ВЫДОХОМ, ПЕЧЕНОЧНАЯ ТУПОСТЬ СМЕЩЕНА ВНИЗ. ВАШ ДИАГНОЗ
		1) гидропневмоторакс
		2) фиброз легких
		3) диффузная эмфизема легких
		4) бронхиальная астма
		5) крупозная пневмония
59.	**ПК-5**	ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАТИМОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОБА С
		1) серетидом
		2) сальбутамолом
		3) физической нагрузкой
		4) гистамином
60.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ МУКОЛИТИКОМ
		1) ацетилцистеин
		2) йодид калия
		3) бромид натрия
		4) трипсин
		5) мукалтин

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
61.	**ПК-8**	ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ АНТИБИОТИКАМИ
		1) в осенне-зимний период
		2) длительно
		3) не следует применять вообще
		4) при выделении гнойной мокроты
		5) при появлении кровохарканья
62.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА И БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) анализ мокроты
		2) бронхоскопия
		3) томография
		4) бронхография
		5) сцинтиграфия легких
63.	**ПК-5**	ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛЕГОЧНОМ СЕРДЦЕ У БОЛЬНОГО С ХОБЛ
		1) одышка разной степени
		2) набухание шейных вен
		3) акроцианоз
		4) тахикардия
		5) пульсация в эпигастрии
64.	**ПК-5**	У БОЛЬНОЙ 46 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕЙ ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ВНЕЗАПНО РАЗВИЛАСЬ ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ОДЫШКА СМЕШАННОГО ХАРАКТЕРА, СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ В ПРОЕКЦИИ СРЕДНЕГО ЛЕГОЧНОГО ПОЛЯ СПРАВА. НА ЭКГ РЕГИСТРИРУЮТСЯ ЗУБЕЦ S В ПЕРВОМ И ЗУБЕЦ Q В ТРЕТЬЕМ СТАНДАРТНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ. КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЖЕТ ОБУСЛОВИТЬ ПРИВЕДЕННУЮ ВЫШЕ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ
		1) острый инфаркт миокарда
		2) спонтанный пневмоторакс
		3) бронхиальная астма
		4) тромбоэмболия легочной артерии
		5) очаговая пневмония
65.	**ПК-5**	У БОЛЬНОГО 27 ЛЕТ 3 ДНЯ ТОМУ НАЗАД ВНЕЗАПНО ПОЯВИЛСЯ ОЗНОБ, СУХОЙ КАШЕЛЬ, БОЛИ В ПРАВОМ БОКУ, ЛИХОРАДКА ДО 38, 9°С. ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОТСТАЕТ ПРИ ДЫХАНИИ. ПЕРКУТОРНО ОТ 3-ГО МЕЖРЕБЕРЬЯ СПЕРЕДИ И ОТ СЕРЕДИНЫ МЕЖЛОПАТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА СЗАДИ - ТУПОЙ ЗВУК, ДЫХАНИЕ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ НЕ ПРОВОДИТСЯ. ЛЕВАЯ ГРАНИЦА СЕРДЦА СМЕЩЕНА НА 1, 5 СМ К НАРУЖИ ОТ СРЕДИННОКЛЮЧИЧНОЙ ЛИНИИ. КАКОЙ ДИАГНОЗ СООТВЕТСТВУЕТ ЭТИМ ДАННЫМ

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		1) очаговая пневмония в нижней доле справа
		2) крупозная пневмония справа
		3) обострение хронического бронхита
		4) правосторонний экссудативный плеврит
		5) правосторонний гидроторакс
66.	**ПК-6**	ПРИ 2 СТАДИИ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА АУСКУЛЬТАТИВНО ХАРАКТЕРНО
		1) сухие свистящие хрипы
		2) влажные мелкопузырчатые хрипы
		3) участки «немого легкого»
		4) крепитация
67.	**ПК-6**	ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ ВОЗМОЖНО ОСЛОЖНЕНИЕ
		1) левожелудочковая недостаточность
		2) анемия
		3) отек легких
		4) правожелудочковая недостаточность
		5) плеврит
68.	**ПК-6**	ФАКТОР, НЕ УЧАСТВУЮЩИЙ В МЕХАНИЗМЕ УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
		1) альвеолярный отек
		2) отек слизистой бронхов
		3) бронхоспазм
		4) повышенная секреция слизи
		5) нарушение выделения мокроты
69.	**ПК-10**	СРЕДСТВА ДЛЯ БЫСТРОГО ОБЛЕГЧЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
		1) быстродействующие в-адреномиметики
		2) ингаляционные глюкокортикостероиды
		3) антитела к IgE
70.	**ПК-6**	ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНА АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА «НЕМОГО ЛЕГКОГО» ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ
		1) накоплением экссудата в плевральной полости
		2) наличием воздуха в плевральной полости
		3) бронхоспазмом
		4) полной обтурацией просвета бронхов вязкой мокротой с развитием ателектазов легочной ткани
71.		УТВЕРЖДЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
	ПК-6	1) БА - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей с участием эозинофилов, тучных клеток и Т-лимфоцитов
		2) характерным признаком БА является прогрессирующая необратимая бронхиальная обструкция в результате фиброза и перестройки

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		стенки бронхов
		3) причиной развития БА является врожденный дефицит $б_1$ - антитрипсина, приводящий к обструкции дыхательных путей вязким секретом
		4) среди перечисленных утверждений правильного нет
72.	**ПК-6**	ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
		1) положительные кожные пробы с аллергенами и связь клинических симптомов с контактом с этими аллергенами
		2) появление приступа удушья при физической нагрузке
		3) появление симптомов бронхиальной астмы при приеме нестероидных противовоспалительных средств
73.	**ПК-6**	ПРИ КАКОЙ ПАТОЛОГИИ ОБЫЧНО ВЫСЛУШИВАЮТСЯ ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ В ЛЕГКИХ
		1) пневмоторакс
		2) бронхопневмония
		3) эмфизема легких
		4) плевральный выпот
		5) рак легкого
74.	**ПК-5**	ХАРАКТЕРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
		1) лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево
		2) эозинофилия
		3) тромбоцитопения
		4) лимфоцитоз
75.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ 1 СТУПЕНИ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
		1) препарат неотложной помощи по потребности.
		2) теофиллин замедленного высвобождения
		3) антилейкотриеновые препараты
76.	**ПК-6**	ВНЕШНИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ И ПРОЯВЛЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
		1) генетическая предрасположенность к атопии
		2) пол
		3) ожирение
		4) аллергены
77.	**ПК-6**	ПРИ 1 СТУПЕНИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СИМПТОМЫ (ПРИСТУПЫ УДУШЬЯ) НАБЛЮДАЮТСЯ
		1) реже 1 раза в месяц
		2) реже 1 раза в неделю
		3) реже 1 раза в день
		4) ежедневно
78.	**ПК-6**	ПРИ 2 СТУПЕНИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СИМПТОМЫ (ПРИ-

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		СТУПЫ УДУШЬЯ) НАБЛЮДАЮТСЯ
		1) реже 1 раза в месяц
		2) реже 1 раза в неделю
		3) реже 1 раза в день
		4) ежедневно
79.	**ПК-6**	ПРИ 3 СТУПЕНИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СИМПТОМЫ (ПРИСТУПЫ УДУШЬЯ) НАБЛЮДАЮТСЯ
		1) реже 1 раза в месяц
		2) реже 1 раза в неделю
		3) реже 1 раза в день
		4) ежедневно
80.	**ПК-5**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНОГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
		1) верапамил
		2) атенолол
		3) метилдопа
		4) гипотиазид
81.	**ПК-6**	ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО
		1) экспираторная одышка
		2) инспираторная одышка
		3) мелкопузырчатые влажные хрипы
		4) кашель с гнойной мокротой
82.	**ПК-11**	ПРЕПАРАТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА
		1) сальбутамол
		2) преднизолон
		3) мукалтин
		4) атровент
83.	**ПК-8**	в-АГОНИСТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ
		1) сальбутамол
		2) беротек
		3) сальметерол
		4) беклометазон
84.	**ПК-8**	БОЛЬНОЙ, СТРАДАЮЩИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, СТАЛ ОТМЕЧАТЬ ПРИСТУПЫ БОЛЕЙ ЗА ГРУДИНОЙ СТЕНОКАРДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ СЕРДЦА. КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВОПОКАЗАН В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
		1) амлодипин
		2) атенолол
		3) эналаприл

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) верапамил
85.	**ПК-8**	60-ЛЕТНЕМУ БОЛЬНОМУ, СТРАДАЮЩЕМУ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ПОЛИПАМИ В НОСУ, В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ИБС НАЗНАЧЕНА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ. КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВОПОКАЗАН В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
		1) амлодипин
		2) аторвастатин
		3) эналаприл
		4) аспирин
86.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ - КОМБИНАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО В2-АДРЕНОМИМЕТИКА И ИНГАЛЯЦИОННОГО ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДА
		1) беродуал
		2) пульмикорт
		3) серетид
		4) сальбутамол
87.	**ПК-6**	МАРКЕРЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
		1) эозинофилы и обратимая бронхиальная обструкция
		2) эозинофилы и необратимая бронхиальная обструкция
		3) нейтрофилы и обратимая бронхиальная обструкция
		4) нейтрофилы и необратимая бронхиальная обструкция
88.	**ПК-11**	МАШИНОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ДОСТАВЛЕН БОЛЬНОЙ 22 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВОЗБУЖДЕН, ЧСС - 120 УДАРОВ В МИН., ЧД - 32 В МИН. ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ: ДЫХАНИЕ РЕЗКО ОСЛАБЛЕНО, ЕДИНИЧНЫЕ СУХИЕ ХРИПЫ. PaO_2 - 50 ММ РТ. СТ. В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ 10 ИНГАЛЯЦИЙ БЕРОТЕКА. ВРАЧОМ СКОРОЙ ПОМОЩИ ВНУТРИВЕННО ВВЕДЕНО 10 мл 2, 4% РАСТВОРА ЭУФИЛЛИНА. ЧТО ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО ПРОТИВОПОКАЗАНО БОЛЬНОМУ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ
		1) эуфиллин парентерально
		2) внутривенная регидратация
		3) кортикостероиды
		4) увеличение дозы симпатомиметиков (сальбутамол, беротек, астмопент)
		5) ингаляции кислорода
89.	**ПК-6**	ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНО ВЫСЛУШИВАНИЕ СУХИХ СВИСТЯЩИХ ХРИПОВ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЕГКИХ
		1) повышение воздушности легких
		2) наличие жидкости в полости плевры
		3) нарушение бронхиальной проходимости
		4) уплотнение легочной ткани
		5) наличие полости в легочной ткани

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
90.	**ПК-8**	БОЛЬНОЙ 49 ЛЕТ В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НАЗНАЧЕН ПРЕДНИЗОЛОН ВНУТРЬ 20 МГ В СУТКИ. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПРИЗНАКИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ИСЧЕЗЛИ, НО ПОЯВИЛИСЬ БОЛИ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ИЗЖОГА, "КИСЛАЯ ОТРЫЖКА". ПРОВЕДИТЕ КОРРЕКЦИЮ ЛЕЧЕНИЯ
		1) срочно отменить преднизолон
		2) вдвое уменьшить суточную дозу преднизолона
		3) назначить препарат в той же дозе, но с интервалом в несколько дней
		4) назначить М-холинолитики, антациды, заменить преднизолон бекотидом
		5) назначить преднизолон парентерально
91.	**ПК-8**	К КОМБИНИРОВАННЫМ ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ
		1) эуфиллин
		2) салметерол
		3) бекотид
		4) серетид
92.	**ПК-6**	ПРИ 1 СТАДИИ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА АУСКУЛЬТАТИВНО ХАРАКТЕРНО
		1) сухие свистящие хрипы
		2) влажные мелкопузырчатые хрипы
		3) участки «немого легкого»
		4) крепитация
93.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ - КОМБИНАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО В2-АДРЕНОМИМЕТИКА И ИНГАЛЯЦИОННОГО ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДА
		1) беродуал (ипратропия бромид/сальбутамол)
		2) пульмикорт (будесонид)
		3) серетид (флутиказон/салметерол)
94.	**ПК-8**	62-ЛЕТНИЙ БОЛЬНОЙ, СТРАДАЮЩИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, СТАЛ ОТМЕЧАТЬ ПРИСТУПЫ БОЛЕЙ ЗА ГРУДИНОЙ СТЕНОКАРДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ СЕРДЦА. КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ НЕ ПОКАЗАН В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
		1) коринфар
		2) атенолол
		3) нитросорбид
		4) верапамил
		5) изоптин
95.	**ПК-8**	У БОЛЬНОГО БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ. КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) метопролол
		2) амлодипин
		3) клофелин
		4) эналаприл
96.	**ПК-11**	ПРЕПАРАТ, ПОКАЗАННЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА
		1) атропин
		2) сальбутамол
		3) интал
		4) преднизолон
		5) мукалтин
97.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭУФИЛЛИНА
		1) угнетение вагусных влияний
		2) блокада медиаторов аллергических реакций
		3) угнетение фосфодиэстеразы
		4) активация адренорецепторов
		5) угнетение дыхательного центра
98.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭУФИЛЛИНА
		1) дилятация бронхов
		2) снижение секреции
		3) противоаллергическое действие
		4) адреномиметическое действие
		5) антигистаминное действие
99.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛЬБУТАМОЛА (БЕРОТЕКА)
		1) снижение тонуса вагуса
		2) стимуляция β_2-рецепторов
		3) блокада а-рецепторов
		4) блокада гистаминорецепторов
		5) непосредственное влияние на гладкую мускулатуру бронхов
100.	**ПК-5**	ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
		1) стекловидная, вязкая
		2) гнойная
		3) с прожилками крови
		4) слизисто-гнойная
101.	**ПК-8**	β- АГОНИСТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТ-ВИЕМ
		1) сальбутамол
		2) беротек
		3) сальметерол
102.	**ПК-8**	АНТИАНГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ПОКАЗАННЫЙ БОЛЬНОМУ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ, СТРАДАЮЩЕМУ БРОНХИ-АЛЬНОЙ АСТМОЙ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		1) нитросорбид
		2) пропранолол
		3) метопролол
		4) амлодипин
		5) моночинкве
103.	**ПК-5**	ИЗМЕНЕНИЯ НА ЭКГ, УБЕДИТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЭМ-ПРОБЫ
		1) реверсия негативного зубца Т
		2) удлинение интервала PQ
		3) депрессия сегмента ST более 2 мм
		4) появление предсердной экстрасистолии
		5) преходящая блокада правой ножки пучка Гиса
104.	**ПК-5**	ПРИЗНАК, НЕХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ВАРИАНТНОЙ СТЕНОКАРДИИ
		1) быстропреходящий подъем сегмента ST на ЭКГ
		2) при коронарографии в 10% случаев выявляются малоизмененные или непораженные коронарные артерии
		3) приступы возникают чаще ночью
		4) наиболее эффективны антагонисты кальция
		5) физическая нагрузка плохо переносится
105.	**ПК-5**	БОЛЬНОЙ 45-ЛЕТ ПОЛУЧАЕТ ПО ПОВОДУ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ИНЪЕКЦИИ ГЕПАРИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ПРЕПАРАТА РАЗВИЛОСЬ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГЕПАРИНА НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ
		1) фибриноген
		2) аминокапроновую кислоту
		3) протаминсульфат
		4) викасол
106.	**ПК-6**	ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ СИТУАЦИЕЙ, УГРОЖАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕМ
		1) инфаркта миокарда
		2) пароксизма тахиаритмии
		3) фибрилляции желудочков
		4) асистолии
		5) разрыва стенки желудочка
107.	**ПК-6**	ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СТЕНОКАРДИИ 1-ГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА
		1) депрессия сегмента ST при ВЭМ-пробе
		2) возникновение болей при подъеме до 1-го этажа
		3) отсутствие изменений ЭКГ в покое
		4) иррадиация болей в левое плечо
		5) давящий характер болей

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
108.	**ПК-6**	ДЛЯ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ ФК 2 ХАРАКТЕРНО
		1) выраженное ограничение физической активности, возникновение приступа при подъеме на 1 этаж
		2) возникновение приступов в покое
		3) незначительное ограничение физической активности, возникновение приступов при подъеме по лестнице выше 1 этажа
		4) возникновение приступов стенокардии в ночное время
109.	**ПК-6**	ДЛЯ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ ФК 3 ХАРАКТЕРНО
		1) выраженное ограничение физической активности, возникновение приступа при подъеме на 1 этаж
		2) возникновение приступов в покое
		3) незначительное ограничение физической активности, возникновение приступов при подъеме по лестнице выше 1 этажа,
		4) ходьбе на расстояние более 200 м
		5) возникновение приступов стенокардии в ночное время
110.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) курантил
		2) верапамил
		3) метопролол
		4) каптоприл
111.	**ПК-6**	ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШАЯ СТЕНОКАРДИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ ПРИСТУПОВ СТЕНОКАРДИИ ДАВНОСТЬЮ
		1) 1 день
		2) 1 неделя
		3) 1 месяц
		4) 1 год
112.	**ПК-5**	ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСТРОГО ПРИСТУПА БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ У МУЖЧИНЫ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С
		1) ФГС
		2) ЭКГ
		3) рентгенографии грудной клетки
		4) коронароангиографии
113.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ В-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ ИБС СЛЕДУЮЩИЙ
		1) уменьшение ЧСС и потребности миокарда в кислороде
		2) снятие спазма коронарных артерий и коррекция липидного обмена
		3) расширение периферических сосудов, уменьшение преднагрузки и потребности миокарда в кислороде
		4) воздействие на обмен ишемизированных миоцитов
114.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИТРАТОВ ПРИ ИБС СЛЕДУЮЩИЙ

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		1) уменьшение ЧСС и потребности миокарда в кислороде
		2) снятие спазма коронарных артерий и коррекция липидного обмена
		3) расширение периферических сосудов, уменьшение преднагрузки и потребности миокарда в кислороде
		4) воздействие на обмен ишемизированных миоцитов
115.	**ПК-8**	С АНТИАГРЕГАНТНОЙ ЦЕЛЬЮ У БОЛЬНЫХ ИБС ПРИМЕНЯЮТ
		1) гепарин
		2) варфарин
		3) стрептокиназу
		4) клопидогрель
116.	**ПК-6**	У БОЛЬНОЙ 46 ЛЕТ НОЧЬЮ СТАЛИ ВОЗНИКАТЬ ПРИСТУПЫ ЗАГРУДИННЫХ БОЛЕЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ НА ЭКГ РЕГИСТРИРОВАЛСЯ ПРЕХОДЯЩИЙ ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST. ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) инфаркт миокарда
		2) ТЭЛА
		3) стенокардия Принцметала
		4) стенокардия напряжения ФК 4
117.	**ПК-5**	ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) велоэргометрия
		2) рентгенография ОГКг
		3) эхокардиография
		4) исследование крови на миоглобин
118.	**ПК-6**	ПОРОК СЕРДЦА, ПРИ КОТОРОМ ХАРАКТЕРНЫ ПРИСТУПЫ СТЕНОКАРДИИ
		1) митральный стеноз
		2) митральная недостаточность
		3) аортальный стеноз
		4) аортальная недостаточность
119.	**ПК-5**	ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) мягкая артериальная гипертензия
		2) тромбофлебит вен нижних конечностей
		3) нетипичный болевой синдром в грудной клетке
		4) гиперлипидемия
120.	**ПК-6**	РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ИБС И ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ ИМЕЕТ
		1) возраст и пол больного
		2) гиперлипидемия
		3) эхокардиография

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) коронарография
121.	**ПК-6**	ПРИЗНАКОМ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) изменение длительности и интенсивности болевых приступов
		2) нарушение ритма и проводимости
		3) снижение АД
		4) повышение АД
122.	**ПК-5**	НАЗОВИТЕ КРИТЕРИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ С ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
		1) усталость
		2) одышка
		3) депрессия сегмента ST на 2 мм
		4) подъем АД
123.	**ПК-11**	УКАЖИТЕ МЕРЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗРЫВЕ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
		1) электрическая дефибриляция
		2) непрямой массаж сердца
		3) оперативное лечение
		4) консервативное лечение сердечными гликозидами и диуретиками
		5) любое лечение абсолютно бесперспективно
124.	**ПК-5**	ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДАЕТ РАЗВИТИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА В ПЕРВЫЕ 4 ЧАСА ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ
		1) АСТ
		2) КФК-МВ
		3) ЛДГ
		4) щелочная фосфатаза
		5) г -глютаматтранспептидаза
125.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИОКАРДЕ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) определение СОЭ и лейкоцитов
		2) определение ЛДГ в крови
		3) определение суммарной КФК в крови
		4) определение уровня трансаминаз в крови
		5) определение уровня МВ-фракции КФК в крови
126.	**ПК-5**	АУСКУЛЬТАТИВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА МОГУТ БЫТЬ
		1) тоны сердца звучные, ритмичные
		2) первый тон усилен, диастолический шум на верхушке
		3) систолический шум на верхушке, акцент II тона на легочной артерии
		4) ослабление обоих тонов на верхушке
		5) систолический шум над аортой

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
127.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЙ СИМПТОМ ДЛЯ СИНДРОМА ДРЕСС-ЛЕРА
		1) повышение температуры тела до 39єС
		2) перикардит
		3) жгучие боли за грудиной
		4) увеличения количества эозинофилов
		5) артрит
128.	**ПК-11**	НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ В КАЧЕСТВЕ АНТИАГРЕГАН-ТА У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДОЛ-ЖЕН БЫТЬ НАЗНАЧЕН
		1) дипиридамол
		2) ацетилсалициловая кислота
		3) варфарин
		4) гидрохлортиазид
		5) тиклопидин
129.	**ПК-5**	НАЗОВИТЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
		1) умеренный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево
		2) значительный лейкоцитоз, лимфоцитоз
		3) эозинофилия
		4) анемия, ускорение СОЭ, лейкопения
		5) лейкоцитоз в первые 3 дня, ускорение СОЭ в последующие 5-7 дней
130.	**ПК-5**	ЭКГ ПРИЗНАКОМ ПОДОСТРОГО ПЕРИОДА ТРАНСМУРАЛЬ-НОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) глубокий отрицательный коронарный зубец Т
		2) нарушение ритма и проводимости
		3) наличие комплекса QS
		4) смещение сегмента ST ниже изолинии
		5) снижение амплитуды зубца R
131.	**ПК-11**	БОЛЬНОЙ 47 ЛЕТ ПОСТУПИЛ В КЛИНИКУ С ДИАГНОЗОМ: ОСТРЫЙ НИЖНИЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА. В ПЕРВЫЕ СУТКИ НАБЛЮДЕНИЯ ВНЕЗАПНО ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ. ПУЛЬС И ДАВЛЕНИЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ. НА ЭКГ: СИНУСОВЫЙ РИТМ С ПЕРЕХОДОМ В АСИСТОЛИЮ ЖЕЛУДОЧКОВ. ЛЕЧЕНИЕ
		1) дефибрилляция
		2) непрямой массаж сердца
		3) внутрисердечное введение симпатомиметиков
		4) индерал внутривенно
		5) ганглиоблокаторы
132.	**ПК-5**	ВЫДЕЛИТЕ ГЛАВНЫЙ ЭКГ - ПРИЗНАК ИНФАРКТА МИОКАР-ДА (НЕКРОЗ)
		1) гипертрофия левого желудочка

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) появление глубокого и широкого зубца Q
		3) нарушение a-v проводимости
		4) снижение вольтажа основных зубцов ЭКГ
		5) блокада левой ножки пучка Гиса
133.	**ПК-5**	У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА (1-Е СУТКИ) РАЗВИЛСЯ ПРИСТУП СЕРДЦЕБИЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ РЕЗКОЙ СЛАБОСТЬЮ, ПАДЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. НА ЭКГ: ЗУБЕЦ Р НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, QRS УШИРЕН (0. 12 СЕК) И ДЕФОРМИРОВАН, ЧИСЛО ЖЕЛУДОЧКОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ 150 В МИНУТУ. ВАШ ДИАГНОЗ
		1) пароксизм мерцания предсердий
		2) желудочковая пароксизмальная тахикардия
		3) трепетание предсердий
		4) синусовая тахикардия
		5) наджелудочковая пароксизмальная тахикардия
134.	**ПК-8**	УКАЖИТЕ ПРЕПАРАТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ НАИБОЛЬШИМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
		1) спазмолитики
		2) блокаторы кальциевых каналов
		3) средства нейролептанальгезии
		4) нитраты короткого и пролонгированного действия
		5) сердечные гликозиды
135.	**ПК-11**	У БОЛЬНОГО РАЗВИЛСЯ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННЫЙ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВКЛЮЧАЮТ ВВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА
		1) эуфиллин
		2) лазикс
		3) лидокаин
		4) обзидан
		5) гепарин
136.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) снижение АД менее 80/50 мм рт. ст.
		2) тахикардия
		3) акроцианоз
		4) снижение общего периферического сосудистого сопротивления
		5) полиурия
137.	**ПК-6**	НА 3-Й НЕДЕЛЕ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТМЕЧАЮТСЯ БОЛЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, УВЕЛИЧЕНИЕ СОЭ, ШУМ ТРЕНИЯ ПЕРИКАРДА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ДИАГНОЗ
		1) распространение зоны поражения миокарда
		2) идиопатический перикардит

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		3) постинфарктный синдром Дресслера
		4) разрыв миокарда
		5) разрыв сердечных хорд
138.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО 52 ЛЕТ С ОСТРЫМ ПЕРЕДНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ВОЗНИК ПРИСТУП УДУШЬЯ. ПРИ ОСМОТРЕ: ДИФФУЗНЫЙ ЦИАНОЗ, В ЛЕГКИХ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЛАЖНЫХ РАЗНОКАЛИБЕРНЫХ ХРИПОВ. ЧСС - 100 В МИНУТУ. АД - 120/100 ММ РТ. СТ. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ ВОЗНИКШЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ
		1) кардиогенный шок
		2) тромбоэмболия легочной артерии
		3) отек легких
		4) разрыв межжелудочковой перегородки
		5) ничего из перечисленного
139.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
		1) миоглобина
		2) щелочной фосфатазы
		3) С-реактивного протеина
		4) трансаминаз
		5) тропонина
140.	**ПК-11**	ПАЦИЕНТУ, ПОСТУПИВШЕМУ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА С БОЛЯМИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ В ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ, СО СТОЙКИМ ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ В V2-V5, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ В СОСТАВЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
		1) ацетилсалициловая кислота внутрь
		2) непрямые антикоагулянты
		3) антиаритмические препараты
		4) тромболитические препараты
		5) блокаторы АДФ-рецепторов тромбоцитов
141.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) мерцательная аритмия
		2) ранние желудочковые экстрасистолы “R на T”
		3) групповые желудочковые экстрасистолы
		4) политопные желудочковые экстрасистолы
		5) наджелудочковые экстрасистолы
142.	**ПК-6**	ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА БОЛЕЙ ЗА ГРУДИНОЙ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА МОЖЕТ БЫТЬ ПОВЫШЕН УРОВЕНЬ
		1) креатинфосфокиназы

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) лактатдегидрогеназы
		3) аспартатаминотрансферазы
		4) альдолазы
143.	**ПК-11**	ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОТЕКА ЛЕГКИХ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ
		1) тромболитики
		2) нитраты в/в
		3) сердечные гликозиды
		4) кордарон
144.	**ПК-8**	АНТИАНГИНАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИБС ЯВЛЯЕТСЯ
		1) клопидогрель
		2) аторвастатин
		3) метопролол
		4) эналаприл
145.	**ПК-8**	ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИБС ЯВЛЯЕТСЯ
		1) клопидогрель
		2) аторвастатин
		3) метопролол
		4) эналаприл
146.	**ПК-8**	АНТИАГРЕГАНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ В ЛЕЧЕНИИ ИБС ЯВЛЯЕТСЯ
		1) клопидогрель
		2) аторвастатин
		3) метопролол
		4) эналаприл
147.	**ПК-6**	НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЬЮ МИОКАРДА В КИСЛОРОДЕ И ЕГО ДОСТАВКОЙ ПО КОРОНАРНОМУ РУСЛУ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ
		1) стабильной стенокардии напряжения
		2) прогрессирующей стенокардии напряжения
		3) впервые возникшей стенокардии
		4) любых вариантах стенокардии
148.	**ПК-6**	ЧТО ОТНОСИТСЯ К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИБС
		1) повышение уровня липопротеидов низкой плотности
		2) сахарный диабет
		3) артериальная гипертония
		4) наследственная отягощенность
149.	**ПК-6**	ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО СООТВЕТСТВУЕТ СТЕНОКАРДИИ

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		1) возникновение болей за грудиной при физической нагрузке
		2) иррадиация боли в правое подреберье
		3) длительность болей 40 мин и более
		4) боли купируются валидолом
150.	**ПК-5**	МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ – «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» ДИАГНОСТИКИ ИБС
		1) ЭКГ
		2) коронарография
		3) эхокардиография
		4) вентрикулография
151.	**ПК-6**	ПРИ ПОСТИНФАРКТНОМ КАРДИОСКЛЕРОЗЕ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ
		1) фибрилляция желудочков
		2) тампонада сердца
		3) тромбоэмболия легочной артерии
		4) аневризма левого желудочка
152.	**ПК-5**	ДЛЯ ПЕРЕДНЕПЕРЕГОРОДОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТРОГО ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНО ПРОЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СЛЕДУЮЩИХ ОТВЕДЕНИЯХ НА ЭКГ
		1) 3-е, 2-е стандартные отведения, AVL
		2) 3-е, 2-е стандартные отведения, AVF
		3) 1-е стандартное отведение, V_5-V_6
		4) V_1-V_3
153.	**ПК-5**	ЭКГ-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) негативный зубец Т
		2) наличие комплекса QS
		3) смещение сегмента ST ниже изолинии
		4) широкий комплекс QRS
154.	**ПК-6**	ЧТО ОТНОСИТСЯ К ОСЛОЖНЕНИЯМ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В ПОДОСТРОМ ПЕРИОДЕ
		1) разрыв сердца
		2) кардиогенный шок
		3) синдром Дресслера
		4) резорбционно-некротический синдром
155.	**ПК-11**	ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ПОВЫШЕННЫМ АД НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ С ВВЕДЕНИЯ
		1) лазикса
		2) лидокаина
		3) дофамина

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) дигоксина
156.	**ПК-11**	ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И НИЗКИМ АД НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ С ВВЕДЕНИЯ
		1) лазикса
		2) лидокаина
		3) дофамина
		4) дигоксина
157.	**ПК-11**	ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНОГО С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ С ВВЕДЕНИЯ
		1) лазикса
		2) лидокаина
		3) дофамина
		4) дигоксина
158.	**ПК-11**	ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНОГО С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ С ВВЕДЕНИЯ
		1) лазикса
		2) лидокаина
		3) дофамина
		4) дигоксина
159.	**ПК-6**	ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ХАРАКТЕРНО
		1) брадикардия
		2) цианоз
		3) олигоанурия
		4) усиленный верхушечный толчок
160.	**ПК-11**	ЛЕЧЕНИЕ КАРДИОГЕННОГО ШОКА У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ С ВВЕДЕНИЯ
		1) лазикса
		2) морфина
		3) строфантина
		4) дигоксина
161.	**ПК-8**	ПРИ СИНДРОМЕ ДРЕССЛЕРА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОКАЗАНЫ
		1) глюкокортикоиды
		2) антибиотики
		3) нитраты
		4) антагонисты кальция

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
162.	**ПК-11**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ ОТМЕНИТЬ У БОЛЬНОГО ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПРИ РАЗВИТИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА
		1) нитроглицерин
		2) эналаприл
		3) метопролол
		4) гепарин
163.	**ПК-10**	ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
		1) кардиогенный шок
		2) АВ-блокада 2 степени
		3) инсульт
		4) желудочковая экстрасистолия
164.	**А/02. 7 ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ ОБЛАДАЕТ
		1) холодовая проба
		2) дипиридамоловая проба
		3) проба с нагрузкой на велоэргометре
		4) проба с гипервентиляцией
165.	**ПК-6**	ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) фибрилляция желудочков
		2) желудочковая бигимения
		3) атриовентрикулярная блокада II степени
		4) синоаурикулярная блокада II степени
166.	**ПК-8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОБОСТРЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНОГО ИБС
		1) амоксициллин
		2) эуфиллин
		3) аспирин
		4) амлодипин
167.	**ПК-6**	ДЛЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ ХАРАКТЕРНО
		1) снижение систолического АД менее 80 мм. рт. ст.
		2) появление систолического шума на верхушке
		3) отсутствие пульса и АД на периферических артериях
		4) усиленный верхушечный толчок
168.	**ПК-5**	В КАКИХ ОТВЕДЕНИЯХ ЭКГ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ИНФАРКТ ПЕРЕДНЕ-БОКОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
		1) 1, AVL, V_5-V_6
		2) 1, AVL, V1-V_3
		3) 2, 3 стандартные, AVF

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) 2, 3 стандартные, AVF, V_5-V_6
169.	**ПК-5**	В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ КРУПНООЧАГОВОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ЭКГ ВЫЯВЛЯЕТСЯ
		1) подъем сегмента ST
		2) патологический зубец Q
		3) депрессия сегмента ST
		4) патологический зубец QS
170.	**ПК-5**	В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КРУПНООЧАГОВОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ЭКГ ВЫЯВЛЯЕТСЯ
		1) подъем сегмента ST
		2) патологический зубец Q
		3) депрессия сегмента ST
		4) отрицательный зубец T
171.	**ПК-5**	ХАРАКТЕРНЫМ ЭКГ-ПРИЗНАКОМ НАДЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) полная компенсаторная пауза
		2) неизмененный комплекс QRS
		3) деформация комплекса QRS
		4) удлинение интервала PQ
172.	**ПК-5**	ХАРАКТЕРНЫМ ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) неполная компенсаторная пауза
		2) неизмененный комплекс QRS
		3) деформация комплекса QRS
		4) удлинение интервала PQ
173.	**ПК-5**	ПРИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ 1 СТЕПЕНИ НАБЛЮДАЕТСЯ
		1) выпадение отдельных сердечных циклов
		2) выпадение отдельных желудочковых комплексов
		3) выпадение отдельных предсердных комплексов
		4) удлинение интервала PQ
174.	**ПК-5**	ПРИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ 2 СТЕПЕНИ НАБЛЮДАЕТСЯ
		1) выпадение отдельных сердечных циклов
		2) выпадение отдельных желудочковых комплексов
		3) выпадение отдельных предсердных комплексов
		4) удлинение интервала PQ
175.	**ПК-8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ АВ-БЛОКАДЕ 2 СТЕПЕНИ
		1) эналаприл
		2) атенолол
		3) амлодипин

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) гипотиазид
176.	**ПК-8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ ДВУХСТОРОН-НЕМ СТЕНОЗЕ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
		1) эналаприл
		2) атенолол
		3) амлодипин
		4) гипотиазид
177.	**ПК-8**	ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ПРИЕМЕ
		1) эналаприла
		2) кордарона
		3) метопролола
		4) верапамила
178.	**ПК-8**	ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ПРЕПАРАТУ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕ-НИИ
		1) нитратами
		2) селективными бета-блокаторами
		3) антагонистами кальция
		4) ингибиторами АПФ
179.	**ПК-8**	ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ПРИЕМЕ
		1) статинов
		2) ингибиторов АПФ
		3) антагонистов кальция
		4) бета-блокаторов
180.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АСПИРИНА
		1) подавление синтеза ЛПНП в гепатоците
		2) подавление абсорбции холестерина в кишечнике
		3) угнетает действие циклооксигеназ
		4) угнетает синтез витамина К в печени
181.	**ПК-8**	ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИНГИБИТОРОВ АПФ
		1) бронхообструктивный синдром
		2) беременность
		3) гипокалиемия
		4) АВ-блокада 2 степени
182.	**ПК-8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
		1) гепарин
		2) дигоксин
		3) аспирин
		4) эналаприл
183.	**ПК-8**	МЕТОПРОЛОЛ НЕЛЬЗЯ КОМБИНИРОВАТЬ С

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) эналаприлом
		2) аспирином
		3) верапамилом
		4) амлодипином
184	**ПК-8**	. В ОТЛИЧИЕ ОТ ИНГИБИТОРОВ АПФ БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТО-РОВ АНГИОТЕНЗИНА 2
		1) реже вызывают кашель
		2) не вызывают гипотензии
		3) уменьшают ЧСС
		4) увеличивают ЧСС
185.	**ПК-8**	К БЛОКАТОРАМ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА 2 ОТНОСИТ-СЯ
		1) эналаприл
		2) аспирин
		3) валсартан
		4) варфарин
186.	**ПК-8**	ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯ-ЕТСЯ
		1) синоатриальная блокада
		2) хроническая сердечная недостаточность
		3) желудочковая экстрасистолия
		4) наджелудочковая экстрасистолия
187.	**ПК-8**	ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ВАРФАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) синоатриальная блокада
		2) фибрилляция предсердий
		3) желудочковая экстрасистолия
		4) наджелудочковая экстрасистолия
188.	**ПК-8**	ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ВАРФАРИНА ЯВ-ЛЯЕТСЯ
		1) тромбоцитопения
		2) хроническая сердечная недостаточность
		3) желудочковая экстрасистолия
		4) гиперкалиемия
189.	**ПК-5**	ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В ПЛАЗ-МЕ КРОВИ
		1) ≤ 6, 5 ммоль\л
		2) ≤ 5, 6 ммоль\л
		3) ≤ 5, 0 ммоль\л
		4) ≤ 3, 0 ммоль\л
190.	**ПК-5**	ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ХС ЛПНП В ПЛАЗМЕ КРОВИ
		1) ≤ 6, 5 ммоль\л
		2) ≤ 5, 6 ммоль\л

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		3) ≤ 5, 0 ммоль\л
		4) ≤ 3, 0 ммоль\л
191.	**ПК-5**	ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ТРИГЛИЦЕРИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ
		1) ≤ 1, 0 ммоль\л
		2) ≤ 1, 7 ммоль\л
		3) ≤ 2, 0 ммоль\л
		4) ≤ 3, 0 ммоль\л
192.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СТАТИНОВ
		1) подавление синтеза ЛПОНП в гепатоците
		2) подавление абсорбции холестерина в кишечнике
		3) подавление синтеза апопротеина В-100
		4) связывание желчных кислот в просвете тонкого кишечника
193.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭЗЕТИМИБА
		1) подавление синтеза ЛПОНП в гепатоците
		2) подавление абсорбции холестерина в кишечнике
		3) подавление синтеза апопротеина В-100
		4) связывание желчных кислот в просвете тонкого кишечника
194.	**ПК-8**	ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБНЫЕ ВЫЗВАТЬ РАБДОМИОЛИЗ
		1) статины
		2) фибраты
		3) секвестранты желчных кислот
		4) препараты никотиновой кислоты
195.	**ПК-6**	К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ
		1) артериальная гипертензия
		2) сахарный диабет
		3) курение
		4) мужской пол
196.	**ПК-6**	К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ
		1) употребление алкоголя
		2) наследственность
		3) курение
		4) мужской пол
197.	**ПК-5**	КОЭФФИЦИЕНТ АТЕРОГЕННОСТИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ
		1) не более 1-1, 5
		2) не более 2-2, 5
		3) не более 3-3, 5
		4) не более 4-4, 5

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
198.	**ПК-8**	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СТАТИНОВ
		1) подавление синтеза холестерина в гепатоците
		2) подавление абсорбции холестерина в кишечнике
		3) подавление синтеза апопротеина В-100
		4) связывание желчных кислот в просвете тонкого кишечника
199.	**ПК-5**	ИЗМЕНЕНИЯ НА ЭКГ УБЕДИТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЭМ-ПРОБЫ
		1) реверсия негативного зубца Т
		2) удлинение интервала PQ
		3) депрессия сегмента ST более 2 мм
		4) появление предсердной экстрасистолии
		5) преходящая блокада правой ножки пучка Гиса
200.	**ПК-5**	57-ЛЕТНИЙ БОЛЬНОЙ ЖАЛУЕТСЯ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ ПОД УТРО ВОЗНИКАЮТ ЗАГРУДИННЫЕ БОЛИ СЖИМАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, ОТДАЮЩИЕ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА ПОСЛЕ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА. ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ МОНИТОРИРОВАНИИ В МОМЕНТ ПРИСТУПА ПОДЪЕМ ST В ОТВЕДЕНИЯХ V_2-V_58 ММ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ST НА ИЗОЛИНИИ. КАКАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНОГО
		1) стабильная стенокардия 4-го функционального класса
		2) инфаркт миокарда
		3) ишемическая дистрофия миокарда
		4) вариантная стенокардия
		5) прогрессирующая стенокардия
201.	**ПК-6**	ВАРИАНТЫ СТЕНОКАРДИИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПОКАЗАНИЕМ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
		1) стенокардия Принцметала
		2) впервые возникшая стенокардия напряжения
		3) прогрессирующая стенокардия
		4) частая стенокардия напряжения и покоя
		5) все вышеперечисленное
202.	**ПК-5**	ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСТРОГО ПРИСТУПА БОЛИ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И ЗА ГРУДИНОЙ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ
		1) с зондирования желудка
		2) с рентгеноскопии желудочно-кишечного тракта
		3) с ЭКГ
		4) с гастродуоденоскопии
		5) с исследования мочи на уропепсин
203.	**ПК-5**	БОЛЬНОЙ 40 ЛЕТ, ЖАЛОБЫ НА ДЛИТЕЛЬНЫЕ НОЮЩИЕ БОЛИ В ПРЕКАРДИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕЧЕТКО СВЯЗАННЫЕ С ВОЛНЕНИЯМИ, ОЩУЩЕНИЯ "ПРОКОЛОВ" В ЛЕВОЙ ПОЛО-

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		ВИНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. ПРИ ОСМОТРЕ ПАТОЛОГИИ НЕ ВЫЯВЛЕНО, ЭКГ БЕЗ ОСОБЕННОСТЕЙ. С КАКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
		1) с исследования крови на сахар и холестерин
		2) с исследования крови на липопротеиды
		3) с эхокардиографии
		4) с велоэргометрии
		5) с фонокардиографии
204.	**ПК-6**	У БОЛЬНОЙ 52 ЛЕТ ПРИСТУПЫ ЗАГРУДИННЫХ БОЛЕЙ ПРИ БЫСТРОЙ ХОДЬБЕ И ПОДЪЕМЕ НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ, ПРОХОДЯЩИЕ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИН. В ПОКОЕ ИЛИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НИТРОГЛИЦЕРИНА. В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 2 НЕДЕЛЬ ПРИСТУПЫ УЧАСТИЛИСЬ, СТАЛИ ВОЗНИКАТЬ ПРИ ХОДЬБЕ В ОБЫЧНОМ ТЕМПЕ. ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ МОНИТОРИРОВАНИИ В МОМЕНТ ПРИСТУПА ЗАФИКСИРОВАНЫ СИНУСОВАЯ ТАХИКАРДИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ЭКСТРАСИСТОЛЫ И ДЕПРЕССИЯ ST, ДОСТИГАЮЩАЯ 2 ММ В ОТВЕДЕНИЯХ V_4-V_6. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ НА ЭКГ В ПОКОЕ В ЭТИХ ЖЕ ОТВЕДЕНИЯХ СОХРАНЯЕТСЯ СТОЙКАЯ ДЕПРЕССИЯ ST, ДОСТИГАЮЩАЯ 1 ММ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) стабильная стенокардия 2-го ФК
		2) инфаркт миокарда
		3) стабильная стенокардия 4-го ФК
		4) стенокардия Принцметала
		5) прогрессирующая стенокардия
205.	**ПК-6**	ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ВАРИАНТНОЙ СТЕНОКАРДИИ ПРИНЦМЕТАЛА
		1) на ЭКГ регистрируется депрессия сегмента ST
		2) приступ вариантной стенокардии чаще всего провоцируется физической нагрузкой
		3) вариантная стенокардия возникает в результате спазма коронарных артерий
		4) для предупреждения приступов целесообразно использовать b-адреноблокаторы
		5) вариантная стенокардия относится к стабильным формам ИБС
206.	**ПК-6**	БОЛЬНОЙ 46 ЛЕТ, НОЧЬЮ СТАЛИ ВОЗНИКАТЬ ПРИСТУПЫ ЗАГРУДИННЫХ БОЛЕЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ НА ЭКГ РЕГИСТРИРОВАЛСЯ ПРЕХОДЯЩИЙ ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST. ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) стенокардия Принцметала
		2) повторный инфаркт миокарда
		3) развитие постинфарктной аневризмы
		4) приступы не имеют отношения к основному заболеванию
		5) тромбоэмболия ветвей легочной артерии
207.	**ПК-6**	РИСК РАЗВИТИЯ ИБС УМЕНЬШАЕТ

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) повышение уровня липопротеидов высокой плотности
		2) сахарный диабет
		3) артериальная гипертония
		4) наследственная отягощенность
		5) курение
208.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ЭКГ-ПРИЗНАК ВАРИАНТНОЙ СТЕНОКАРДИИ
		1) горизонтальная депрессия ST
		2) депрессия ST выпуклостью кверху и несимметричный зубец Т
		3) подъем ST во время приступа
		4) глубокие зубцы Q
		5) зубцы QS
209.	**ПК-6**	ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС, СТЕНОКАРДИИ СТАНОВИТСЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ, КОГДА
		1) описан типичный ангинозный приступ, выявлены атеросклеротические изменения (бляшки) артерий при коронарографии
		2) имеются симптомы недостаточности кровообращения
		3) выявлены нарушения ритма
		4) имеются факторы риска ИБС
		5) выявлена кардиомегалия
210.	**ПК-6**	ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СТЕНОКАРДИИ
		1) иррадиация болей в нижнюю челюсть
		2) возникновение болей при подъеме на лестницу (более 1 этажа)
		3) длительность болей 40 мин и более
		4) выявление стеноза коронарной артерии
		5) боли сопровождаются чувство нехватки воздуха
211.	**ПК-5**	ЭКГ-ПРИЗНАКИ ГИПЕРКАЛИЕМИИ
		1) высокий остроконечный зубец Т
		2) депрессия сегмента ST
		3) инверсия зубца Т
		4) тахикардия
		5) наличие зубца Q
212.	**ПК-5**	КРИТЕРИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
		1) горизонтальная депрессия интервала ST более 1 мм
		2) то же менее 0, 5 мм
		3) косонисходящая депрессия интервала ST менее 1 мм
		4) увеличение зубца Q в V5-V6
		5) синусовая тахикардия
213.	**ПК-6**	КАКОЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ВАРИАНТНОЙ СТЕНОКАРДИИ (ПРИНЦМЕТАЛА) ВЕРНО
		1) депрессия ST на ЭКГ

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) приступы болей чаще при нагрузке
		3) обычно развивается инфаркт миокарда
		4) причиной болей является коронароспазм
214.	**ПК-5**	МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИБС В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
		1) ЭКГ
		2) велоэргометрия (ВЭМ)
		3) фонокардиография
		4) эхокардиография
		5) тетраполярная реография
215.	**ПК-6**	СИМПТОМ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ ПОСТИНФАРКТНОМ КАРДИОСКЛЕРОЗЕ
		1) нарушение ритма
		2) левожелудочковая недостаточность
		3) правожелудочковая недостаточность
		4) аневризма левого желудочка
		5) все вышеперечисленное
216.	**ПК-5**	ДЛЯ ЗАДНЕДИАФРАГМАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТРОГО ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНО ПРОЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СЛЕДУЮЩИХ ОТВЕДЕНИЯХ НА ЭКГ
		1) 1-е, 2-е стандартные отведения, AVL
		2) 3-е, 2-е стандартные отведения, AVF
		3) 1-е стандартное отведение, V_5-V_6
		4) AVL, V_1-V_4
		5) только AVL
217.	**ПК-5**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДАЕТ РАЗВИТИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА В ПЕРВЫЕ 4 ЧАСА ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ
		1) АСТ
		2) тропонин
		3) ЛДГ
		4) щелочная фосфатаза
		5) g-глютаматтранспептидаза
218.	**ПК-11**	МУЖЧИНА 50 ЛЕТ ПОСТУПИЛ В БИТ С ТИПИЧНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ И ЭКГ ОСТРОГО ПЕРЕДНЕГО ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОСЛОЖНИЛОСЬ РАЗВИТИЕМ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ С ЧАСТОТОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОГО РИТМА 40 В МИНУТУ. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПРИМЕНЕНИЕ
		1) адреномиметиков
		2) атропина
		3) лазикса

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) эуфиллина
		5) установление эндокардиального электрода и проведение временной кардиостимуляции
219.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ ЭКГ-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) негативный зубец Т
		2) нарушение ритма и проводимости
		3) наличие комплекса QS
		4) смещение сегмента ST ниже изолинии
		5) снижение амплитуды зубца R
220.	**ПК-10**	БОЛЬНОЙ, 64 ГОДА. ЗАДНЕ-ДИАФРАГМАЛЬНЫЙ ИНФАРКТ, ДАВНОСТЬ – 12 ЧАСОВ. ОДЫШКА УМЕРЕННАЯ, СОХРАНЯЕТСЯ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ. ПУЛЬС - 64 В МИНУТУ, РИТМИЧНЫЙ, АД - 140/80 ММ РТ. СТ. С ЧЕГО СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ НЕОТЛОЖНУЮ ПОМОЩЬ
		1) алтеплаза
		2) нитросорбид
		3) строфантин внутривенно
		4) гепарин
		5) нитроглицерин внутривенно
221.	**ПК-6**	СИНДРОМ ДРЕССЛЕРА, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА - ЭТО
		1) разрыв межжелудочковой перегородки
		2) разрыв межпредсердной перегородки
		3) отрыв сосочковой мышцы
		4) аутоиммунная реакция
		5) рецидивирующий инфаркт миокарда
222.	**ПК-6**	НЕ ОТНОСИТСЯ К ОСЛОЖНЕНИЯМ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
		1) разрыв сердца
		2) кардиогенный шок
		3) синдром Дресслера
		4) нарушение ритма сердца
		5) нарушение проводимости
223.	**ПК-6**	223. ДЛЯ СИНДРОМА ДРЕССЛЕРА ХАРАКТЕРНО
		1) повышение температуры тела
		2) перикардит
		3) плеврит
		4) пневмония
		5) все вышеперечисленное
224.	**ПК-8**	НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕЗАГРЕГАНТ
		1) нитросорбид
		2) аспирин

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) варфарин
		4) гепарин
		5) нифедипин
225.	**ПК-6**	ДЛЯ ТАМПОНАДЫ СЕРДЦА ХАРАКТЕРНО
		1) парадоксальный пульс
		2) увеличение пульсового давления
		3) глухие тоны сердца
		4) усиленный верхушечный толчок
		5) расширение сердца
226.	**ПК-11**	БОЛЬНОЙ 48 ЛЕТ, ДОСТАВЛЕН В БИТ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ТРАНСМУРАЛЬНОГО ПЕРЕДНЕПЕРЕГОРОДОЧНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА. ПОЯВИЛАСЬ ОДЫШКА, ТАХИПНОЭ, СНИЖЕНИЕ АД ДО 100/70 ММ РТ. СТ., ТАХИКАРДИЯ ДО 120 В МИНУТУ. В НИЖНИХ ОТДЕЛАХ ЛЕГКИХ ПОЯВИЛИСЬ ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ. В 3-4 МЕЖРЕБЕРЬЕ ПО ЛЕВОМУ КРАЮ ГРУДИНЫ СТАЛ ВЫСЛУШИВАТЬСЯ ИНТЕНСИВНЫЙ СИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ С РИТМОМ ГАЛОПА. НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ В ПРАВОМ ЖЕЛУДОЧКЕ УВЕЛИЧЕНО. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) разрыв наружной стенки желудочка
		2) эмболия легочной артерии
		3) разрыв межжелудочковой перегородки
		4) тромбоэндокардит
		5) эпистенокардический перикардит
227.	**ПК-5**	БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НЕКРОЗА МИОКАРДА
		1) щелочная фосфатаза и γ-глутамилтранспептидаза крови
		2) миоглобин и КФК-МВ
		3) эозинофилы
		4) креатинин и мочевина
		5) холестерин, триглицериды, ЛПНП
228.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИОКАРДЕ
		1) определение СОЭ и лейкоцитов
		2) определение ЛДГ в крови
		3) определение суммарной КФК в крови
		4) определение уровня трансаминаз в крови
		5) определение уровня тропонинов в крови
229.	**ПК-10**	У БОЛЬНОГО РАЗВИЛСЯ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННЫЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, С ВВЕДЕНИЯ КАКОГО ПРЕПАРАТА НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ
		1) эуфиллин
		2) нитроглицерин в/в
		3) лидокаин

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) метопролол
		5) гепарин
230.	**ПК-6**	ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ХАРАКТЕРНО
		1) повышение АД более 140/90 мм рт. ст.
		2) дыхание Чейн-Стокса
		3) диффузный теплый цианоз
		4) снижение АД менее 90/50 мм рт. ст.
		5) полиурия
231.	**ПК-6**	У 45-ЛЕТНЕГО БОЛЬНОГО ПОСЛЕ БОЛЬШОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ РАЗВИЛИСЬ РЕЗКИЕ ДАВЯЩИЕ ЗАГРУДИННЫЕ БОЛИ, ОТДАЮЩИЕ В ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ. БОЛИ БЫЛИ КУПИРОВАНЫ СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ ВНУТРИВЕННЫМ ВВЕДЕНИЕМ МОРФИНА НА ЭКГ: ПОДЪЕМ ST В ОТВЕДЕНИЯХ I, AVL, V_5-V_6, СНИЖЕНИЕ ST В ОТВЕДЕНИЯХ III, V_1-V_2. ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) тромбоэмболия легочной артерии
		2) задне-диафрагмальный инфаркт миокарда
		3) передний распространенный инфаркт миокарда
		4) передне-перегородочный инфаркт миокарда
		5) передне-боковой инфаркт миокарда
232.	**ПК-5**	В КАКИХ ОТВЕДЕНИЯХ ЭКГ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ИНФАРКТ ЗАДНЕ-БОКОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
		1) AVL, V_5-V_6
		2) 3, 2 стандартные, AVF
		3) V_1-V_3
		4) 3, 2 стандартные, AVF, V_5-V_6
		5) V_3-V_6
233.	**ПК-6**	КАК СЛЕДУЕТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ УХУДШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ, ЕСЛИ У БОЛЬНОГО НА 4-Й НЕДЕЛЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ВОЗНИКЛИ ИНТЕНСИВНЫЕ СЖИМАЮЩИЕ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ПОЯВИЛАСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА НА ЭКГ И ВНОВЬ ПОВЫСИЛАСЬ АКТИВНОСТЬ АСТ, АЛТ, КФК - МВ
		1) ТЭЛА
		2) рецидивирующий инфаркт миокарда
		3) повторный инфаркт миокарда
		4) развитие синдрома Дресслера
		5) вариантная стенокардия
234.	**ПК-10**	ПРИ ОСТРО ВОЗНИКШЕЙ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ
		1) фуросемид в/в
		2) эуфиллин в/в
		3) ингаляции симпатомиметика
		4) обзидан в/в

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
235.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ЭКГ-ПРИЗНАК КРУПНООЧАГОВОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
		1) горизонтальная депрессия ST
		2) депрессия ST выпуклостью кверху и несимметричный зубец Т
		3) подъем ST
		4) глубокие зубцы Q
		5) зубцы QS
236.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ЭКГ-ПРИЗНАК ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
		1) горизонтальная депрессия ST
		2) депрессия ST выпуклостью кверху и несимметричный зубец Т
		3) подъем ST
		4) глубокие зубцы Q
		5) зубцы QS
237.	**ПК-5**	ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ОСТРОЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
		1) увеличение уровня миоглобина, креатинина, мочевины
		2) увеличение активности АСТ, АЛТ, билирубина
		3) появление С-реактивного белка, ревматоидного фактора, LE-клеток
		4) повышение уровня тропонина, миоглобина, КФК-МВ
		5) повышение щелочной фосфатазы, АСТ, АЛТ
238.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО 52 ЛЕТ С ОСТРЫМ ПЕРЕДНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ВОЗНИК ПРИСТУП УДУШЬЯ. ПРИ ОСМОТРЕ: ДИФФУЗНЫЙ ЦИАНОЗ, В ЛЕГКИХ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЛАЖНЫХ РАЗНОКАЛИБЕРНЫХ ХРИПОВ. ЧСС - 100 В МИНУТУ. АД - 120/100 ММ РТ. СТ. КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО
		1) кардиогенный шок
		2) тромбоэмболия легочной артерии
		3) отек легких
		4) разрыв межжелудочковой перегородки
		5) ничего из перечисленного
239.	**ПК-8**	БОЛЬНЫМ, ПЕРЕНЕСШИМ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАЗНАЧАЮТ ДЛИТЕЛЬНО АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ, ПОТОМУ ЧТО ОНА
		1) снижает протромбиновый индекс
		2) препятствует агрегации тромбоцитов
		3) лизирует образовавшиеся тромбы
		4) ингибирует внутренний механизм свертывания крови
		5) механизм положительного действия аспирина неизвестен
240.	**ПК-11**	ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИМЕНЯЕТСЯ
		1) верапамил

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) допамин
		3) панангин
		4) строфантин
241.	**ПК-6**	ДЛЯ ПОЛНОЙ AV-БЛОКАДЫ ХАРАКТЕРНО
		1) частота пульса - 72 в минуту
		2) ритм перепела
		3) пушечный тон Стражеско
		4) ритм галопа
		5) дефицит пульса
242.	**ПК-8**	КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ
		1) строфантин
		2) лидокаин
		3) новокаинамид
		4) этацизин
		5) кордарон
243.	**ПК-8**	У БОЛЬНОГО С СИНДРОМОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА ОТМЕЧАЕТСЯ СИНУСОВАЯ БРАДИКАРДИЯ 45 В МИНУТУ. ОТ УСТАНОВКИ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА БОЛЬНОЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
		1) анаприлин
		2) кордарон
		3) атропин
		4) дигоксин
		5) новокаинамид
244.	**ПК-6**	У 42-ЛЕТНЕГО БОЛЬНОГО, СТРАДАЮЩЕГО МИТРАЛЬНЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА, ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ АНГИНЫ ПОЯВИЛИСЬ ЧАСТЫЕ ПРЕДСЕРДНЫЕ ЭКСТРАСИСТОЛЫ, ОЩУЩАЕМЫЕ БОЛЬНЫМ КАК НЕПРИЯТНЫЕ "ТОЛЧКИ" В ГРУДИ. ЧЕМ ГРОЗИТ ДАННОЕ НАРУШЕНИЕ РИТМА
		1) развитием недостаточности кровообращения
		2) появлением мерцательной аритмии
		3) появление пароксизмальной тахикардии
		4) появлением коронарной недостаточности
		5) развитием фибрилляции желудочков
245.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО ВНЕЗАПНО ВОЗНИК ПРИСТУП СЕРДЦЕБИЕНИЯ (160 В МИНУТУ), КОТОРЫЙ ВРАЧ КУПИРОВАЛ ПРОБОЙ ВАЛЬСАЛЬВЫ. ПРИСТУП СЕРДЦЕБИЕНИЯ СКОРЕЕ ВСЕГО БЫЛ ОБУСЛОВЛЕН
		1) синусовой тахикардией
		2) пароксизмальной мерцательной аритмией
		3) пароксизмальным трепетанием предсердий

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) пароксизмальной наджелудочковой тахикардией
		5) пароксизмальной желудочковой тахикардией
246.	**ПК-5**	246. ВЫЯВЛЕНИЕ НА ЭКГ УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА PQ, РАВНОГО 0, 28 С, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО
		1) блокады синоатриального проведения
		2) блокады атриовентрикулярного проведения 1-й степени
		3) блокады атриовентрикулярного проведения 2-й степени
		4) блокады атриовентрикулярного проведения 3-й степени
		5) синдрома преждевременного возбуждения желудочков
247.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ
		1) никотиновая кислота
		2) клофибрат
		3) тироксин
		4) аторвастатин
248.	**ПК-8**	У БОЛЬНОГО 74 ЛЕТ НАБЛЮДАЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПРИСТУПЫ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, РЕДКИЙ ПУЛЬС. ГОСПИТАЛИЗИРОВАН В СВЯЗИ С КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ. НА ЭКГ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПОЛНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ БЛОКАДА СЕРДЦА, ЧСС – 46 В МИНУТУ, ПРИЗНАКОВ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕТ. ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНУЮ ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО
		1) имплантация ЭКС
		2) назначить аспаркам
		3) назначить анаприлин
		4) провести дефибрилляцию
		5) ничего из перечисленного
249.	**ПК-6**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИМПТОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ДЛЯ СТЕНОКАРДИИ
		1) колющие боли в области сердца во время физической нагрузки
		2) желудочковая экстрасистолия после физической нагрузки
		3) загрудинная боль и депрессия сегмента ST, возникающие одновременно при нагрузке
		4) зубец Q в отведениях III и aVF
		5) отрицательный зубец Т в левых грудных отведениях
250.	**ПК-8**	ОСНОВНОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ В-БЛОКАТОРОВ ПРИ СТЕНОКАРДИИ СВЯЗАН С
		1) уменьшением частоты и силы сокращений сердца
		2) расширением коронарных артерий
		3) расширением периферических артерий
		4) увеличением коронарного кровотока вследствие увеличения ЧСС
		5) дилятацией периферической венозной системы
251.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ЭКГ-ПРИЗНАК ПРОГРЕССИРУЮ-

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		ЩЕЙ СТЕНОКАРДИИ
		1) горизонтальная депрессия ST
		2) депрессия ST выпуклостью кверху и несимметричный зубец Т
		3) подъем ST
		4) глубокие зубцы Q
		5) зубцы QS
252.	**ПК-5**	КАКИЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА
		1) диффузный гиперкинез
		2) диффузный гипокинез
		3) локальный гипокинез
		4) локальный гиперкинез
253.	**ПК-6**	ПРИ КАКОМ ТИПЕ ГИПЕРЛИПОПРОТЕИДЕМИИ ПОВЫШЕНО СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ ХОЛЕСТЕРИНА, ТРИГЛИЦЕРИДОВ, ЛПНП И ЛПОНП
		1) I
		2) IIа
		3) IIб
		4) III
		5) IV
254.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЙ ХАРАКТЕР БОЛЕЙ У БОЛЬНОГО С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
		1) колющая боль в сердце при физической нагрузке
		2) тупая ноющая боль после нервного перенапряжения
		3) стойкая загрудинная давящая, иногда жгучая, с широкой иррадиацией
		4) сжимающая боль в сердце, купирующаяся нитроглицерином через 2-5 минут
		5) острая режущая боль в сердце, связанная с определенным положением тела
255.	**ПК-5**	ХАРАКТЕРНЫМ ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) отсутствие во всех отведениях зубца Р
		2) неизмененный комплекс QRS
		3) деформация комплекса QRS
		4) удлинение интервала PQ
256.	**ПК-6**	САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) острая левожелудочковая недостаточность
		2) тампонада сердца
		3) фибрилляция желудочков
		4) ТЭЛА
257.	**ПК-6**	ПРИСТУПЫ МОРГАНЬИ-АДАМСА-СТОКСА ВОЗНИКАЮТ У

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		БОЛЬНЫХ ИБС ПРИ
		1) мерцательной аритмии
		2) синусовой брадикардии
		3) желудочковой экстрасистолии
		4) полной АВ-блокаде
258.	**ПК-6**	КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ДАЕТ КЛИНИКУ СТЕНОКАРДИИ
		1) заболевания пищевода
		2) диафрагмальная грыжа
		3) язвенная болезнь желудка
		4) хронический колит
		5) острый панкреатит
259.	**ПК-8**	АНТИАНГИНАЛЬНЫМ И ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ СТЕНОКАРДИИ ОБЛАДАЕТ
		1) аспирин
		2) каптоприл
		3) метопролол
		4) изосорбид-динитрат
260.	**ПК-8**	СИНДРОМ «ОБКРАДЫВАНИЯ» У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА
		1) нитроглицерин
		2) каптоприл
		3) аторвастатин
		4) метопролол
		5) дипиридамол
261.	**ПК-6**	НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНА В ПЛАНЕ
		1) развития инфаркта миокарда
		2) тромбоэмболии мозговых сосудов
		3) развития фатальных нарушений ритма сердца
		4) развития легочной гипертензии
		5) развития венозной недостаточности
262.	**ПК-6**	КАКИЕ ЦИФРЫ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ ПРИНИМАЮТСЯ ЗА КРИТЕРИЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
		1) систолическое давление равно или выше 130 мм рт. ст., а диастолическое давление равно или выше 85 мм рт. ст.
		2) систолическое давление выше 140 мм рт. ст., а диастолическое давление выше 90 мм рт. ст.
		3) систолическое давление равно или выше160 мм рт. ст., а диастолическое давление равно или выше - 100 мм рт. ст.
263.	**ПК-6**	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ
		1) 5 – 11 %
		2) 12 – 15 %
		3) 6 – 25 %
		4) 35-45%
		5) 35-70%
264.	**ПК-8**	БОЛЬНОЙ 35 ЛЕТ СТРАДАЕТ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 2-Й СТ., ИМЕЕТ МЕСТО ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИЙ ТИП ГЕМОДИНАМИКИ. КАКОМУ ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
		1) эналаприл
		2) метопролол
		3) коринфар
		4) верошпирон
		5) клофелин
265.	**ПК-6**	КАКОЙ ПРИЗНАК НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ: ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 1 СТ. У БОЛЬНОГО 35 ЛЕТ
		1) отсутствие изменений глазного дна
		2) клубочковая фильтрация 80 мл/мин
		3) зубец R в V_5-V_6 равен 35 мм
		4) быстрая нормализация АД
		5) уровень мочевой кислоты = 7 мг% (0, 40 ммоль/л)
266.	**ПК-6**	КАКОЙ ПРИЗНАК ВСТРЕЧАЕТСЯ С НАСТУПЛЕНИЕМ 2 СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ (ВОЗ)
		1) гипертонические кризы
		2) дилатация сердечных полостей
		3) стабилизация АД в форме систолодиастолической гипертензии
		4) гипертрофия левого желудочка
		5) появление приступов стенокардии
267.	**ПК-10**	У БОЛЬНОГО 58 ЛЕТ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА РАЗВИЛСЯ ОТЕК ЛЕГКИХ. АД - 220/140 ММ РТ. СТ. КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ
		1) беталок
		2) коринфар
		3) капотен
		4) дигоксин
		5) лазикс
268.	**ПК-8**	КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ БОЛЬНОМУ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С АД - 190/110 ММ РТ. СТ., У КОТОРОГО ИМЕЕТСЯ ПОЛИПОЗ НОСА И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
		1) клофелин
		2) эналаприл

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) гипотиазид
		4) амлодипин
		5) атенолол
269.	**ПК-6**	АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПОДОЗРЕНА ПО СЛЕДУЮЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ И ПРОЯВЛЕНИЯМ
		1) кратковременные эпизоды потери сознания
		2) нарушения сердечного ритма и проводимости
		3) наличие периферических отеков
		4) носовые кровотечения
		5) нарушение ритма дыхания
270.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) систолический шум на верхушке сердца
		2) приглушенность тонов сердца
		3) акцент II тона над аортой
		4) ритм галопа
		5) систолический шум над аортой
271.	**ПК-6**	КРИТЕРИЯМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЮТСЯ
		1) геморрагии или экссудаты на глазном дне
		2) быстро прогрессирующее ухудшение функции почек
		3) отек соска зрительного нерва
		4) сочетание трех названных критериев
		5) резистентность к лечению в-адреноблокаторами
272.	**ПК-5**	ГОРМОНОМ С ВЫСОКОЙ ПРЕССОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) кальцитонин
		2) адреналин
		3) инсулин
		4) альдостерон
		5) пролактин
273.	**ПК-5**	ПРИЗНАКИ ЭКГ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
		1) остроконечный зубец Р в отведениях II, III
		2) гипертрофия левого желудочка
		3) блокада правой ножки пучка Гиса
		4) блокада левой ножки пучка Гиса
		5) уширенный, двугорбый зубец Р в отведениях I, II
274.	**ПК-6**	УРОВЕНЬ РИСКА У БОЛЬНОГО 56 ЛЕТ, ИМЕЮЩЕГО 3 СТЕПЕНЬ АГ, КУРЯЩЕГО
		1) низкий риск (1)
		2) средний риск (2)

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		3) высокий риск (3)
		4) очень высокий риск (4)
275.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ У БЕРЕМЕННЫХ
		1) в-адреноблокаторы
		2) ингибиторы АПФ
		3) допегит (метилдопа)
		4) антагонисты рецепторов ангиотензина 11
		5) диуретики
276.	**ПК-8**	ЧТО ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
		1) нитроглицерин
		2) метопролол
		3) празозин
		4) бародуал
277.	**ПК-6**	КАКОЙ ПРИЗНАК СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ГИПЕРТОНИ-ЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 1 СТАДИИ
		1) отсутствие признаков поражения органов-мишеней
		2) скорость клубочковой фильтрации 60 мл/мин
		3) индекс Соколова-Лайона равен 40 мм
		4) холестерин 6, 5 ммоль/л
278.	**ПК-6**	КАКОЙ ПРИЗНАК СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ГИПЕРТОНИ-ЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 2 СТАДИИ
		1) отсутствие признаков поражения органов-мишеней
		2) скорость клубочковой фильтрации 90 мл/мин
		3) индекс Соколова-Лайона равен 40 мм
		4) холестерин 6, 5 ммоль/л
279.	**ПК-6**	КАКОЙ ПРИЗНАК ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 3 СТАДИИ ГИПЕРТОНИ-ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
		1) дилатация сердечных полостей
		2) стабилизация АД в форме систоло-диастолической гипертензии
		3) появление приступов стенокардии
		4) гипертрофия левого желудочка
280.	**ПК-6**	ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ МОГУТ ОСЛОЖНЯТЬ ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
		1) только при 1 стадии
		2) только при 2 стадии
		3) только при 3 стадии
		4) при любой стадии
		5) только при злокачественной гипертензии
281.	**ПК-8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬ-НОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ХРОНИЧЕСКОЙ

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
		1) клофелин
		2) эналаприл
		3) метопролол
		4) верапамил
282.	**ПК-8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ТАХИКАРДИЕЙ
		1) гипотиазид
		2) эналаприл
		3) амлодипин
		4) верапамил
283.	**ПК-8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С БРАДИКАРДИЕЙ
		1) гипотиазид
		2) эналаприл
		3) амлодипин
		4) верапамил
284.	**ПК-6**	НОРМАЛЬНОЕ АД
		1) ниже 120/80 мм рт. ст.
		2) ниже 130/85 мм рт. ст.
		3) ниже 139/89 мм рт. ст.
		4) ниже 159/99 мм рт. ст.
		5) ниже 179/109 мм рт. ст.
285.	**ПК-6**	ВЫСОКОЕ НОРМАЛЬНОЕ АД
		1) ниже 120/80 мм рт. ст.
		2) ниже 130/85 мм рт. ст.
		3) ниже 139/89 мм рт. ст.
		4) ниже 159/99 мм рт. ст.
		5) ниже 179/109 мм рт. ст.
286.	**ПК-6**	АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 1 СТЕПЕНИ
		1) 120-129/80-85 мм рт. ст.
		2) 130-139/85-89 мм рт. ст.
		3) 140-159/90-99 мм рт. ст.
		4) 160-179/100-109 мм рт. ст.
		5) 180-189/110-115 мм рт. ст.
287.	**ПК-6**	АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 2 СТЕПЕНИ
		1) 120-129/80-85 мм рт. ст.
		2) 130-139/85-89 мм рт. ст.
		3) 140-159/90-99 мм рт. ст.
		4) 160-179/100-109 мм рт. ст.
		5) 180-189/110-115 мм рт. ст.
288.	**ПК-6**	АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 3 СТЕПЕНИ

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) 140-159/90-99 мм рт. ст.
		2) 160-179/100-109 мм рт. ст.
		3) 180/110 мм рт. ст. и выше
		4) 190/115 мм рт. ст. и выше
		5) 200/120 мм рт. ст. и выше
289.	**ПК-6**	ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ АД У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БО-ЛЕЗНЬЮ
		1) ниже 110/70 мм рт. ст.
		2) ниже 120/80 мм рт. ст.
		3) ниже 125/75 мм рт. ст.
		4) ниже 130/85 мм рт. ст.
		5) ниже 140/90 мм рт. ст.
290.	**ПК-6**	ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ АД У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
		1) ниже 110/70 мм рт. ст.
		2) ниже 120/80 мм рт. ст.
		3) ниже 125/75 мм рт. ст.
		4) ниже 130/85 мм рт. ст.
		5) ниже 140/90 мм рт. ст.
291.	**ПК-6**	МУЖЧИНА, 60 ЛЕТ, СТРАДАЕТ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-ЗИЕЙ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ, КУРИТ. ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ СТЕНТИРО-ВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АД = 160/95 ММ РТ СТ. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) гипертоническая болезнь 2 стадия 2 степень риск 3
		2) гипертоническая болезнь 3 стадия 3 степень риск 4
		3) гипертоническая болезнь 3 стадия 2 степень риск 4
		4) гипертоническая болезнь 2 стадия 1 степень риск 3
292.	**ПК-6**	ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 2 СТАДИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТИЕМ
		1) стенокардии напряжения
		2) инфаркта миокарда
		3) гипертрофии левого желудочка
		4) хронической сердечной недостаточности
293.	**ПК-6**	ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 3 СТАДИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТИЕМ
		1) микроальбуминурии
		2) протеинурии
		3) гломерулонефрита
		4) хронической почечной недостаточности
294.	**ПК-6**	ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 3 СТАДИИ ПОРАЖЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
		1) утолщением комплекса интимы-медии более 0, 9 мм
		2) «перемежающейся» хромотой
		3) появлением атеросклеротических бляшек в крупных артериях

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) увеличением скорости пульсовой волны (плече-лодыжечный индекс)
295.	**ПК-8**	ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В СОЧЕТАНИИ С ИБС (СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ)
		1) каптоприл
		2) гипотиазид
		3) метопролол
		4) метилдопа
296.	**ПК-8**	ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
		1) лизиноприл
		2) верапамил
		3) метопролол
		4) метилдопа
297.	**ПК-10**	ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА
		1) каптоприл
		2) гипотиазид
		3) метопролол
		4) метилдопа
298.	**ПК-10**	ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА, ОСЛОЖНЕННОГО ОТЕКОМ ЛЕГКИХ
		1) каптоприл
		2) фуросемид
		3) метопролол
		4) клофелин
299.	**ПК-10**	ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА, ОСЛОЖНЕННОГО РАЗВИТИЕМ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
		1) нитроглицерин
		2) фуросемид
		3) метопролол
		4) магния сульфат
		5) клофелин в\в
300.	**ПК-10**	СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АД У БОЛЬНЫХ С РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМОЙ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ
		1) фуросемида
		2) клофелина и бета-блокатора
		3) нитропруссида натрия и бета-блокатора

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) дроперидола
301.	**ПК-6**	КАКОЙ ПРИЗНАК ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 2 СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
		1) дилатация сердечных полостей
		2) стабилизация АД в форме систолодиастолической гипертензии
		3) появление приступов стенокардии
		4) гипертрофия левого желудочка
302.	**ПК-10**	У БОЛЬНОГО 58 ЛЕТ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА РАЗВИЛАСЬ НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ. КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ
		1) нитроглицерин
		2) магния сульфат
		3) дигоксин
		4) лазикс
303.	**ПК-10**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА У БЕРЕМЕННЫХ
		1) нитроглицерин
		2) магния сульфат
		3) дигоксин
		4) лазикс
304.	**ПК-10**	У БОЛЬНОГО 58 ЛЕТ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА РАЗВИЛАСЬ НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ. КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ
		1) нитроглицерин
		2) магния сульфат
		3) дигоксин
		4) лазикс
305.	**ПК-10**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА У БЕРЕМЕННЫХ
		1) нитроглицерин
		2) магния сульфат
		3) дигоксин
		4) лазикс
306.	**ПК-6**	ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) увеличение сердечного выброса вследствие повышения активности симпатоадреналовой системы
		2) повышение общего периферического сопротивления
		3) гиперпродукция ренина, ангиотензина и альдостерона
		4) повышение выделения вазопрессина
		5) задержка натрия в стенках артериол

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
307.	**ПК-10**	ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ИСПОЛЬЗУЮТ
		1) капотен сублингвально
		2) клофеллин в\в
		3) натрия нитропруссид
		4) фуросемид в\в
308.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО 58 ЛЕТ, ПЕРЕНЕСШЕГО АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ, НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА АД - 220/140 ММ РТ. СТ. КАКОЙ КРИТЕРИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТ 3 СТАДИЮ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
		1) появление гипертонических кризов
		2) высокий уровень АД
		3) возраст пациента
		4) коронарная реваскуляризация
309.	**ПК-6**	В ТИПИЧНЫХ СЛУЧАЯХ ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА РАЗВИВАЕТСЯ
		1) через 2-3 недели после перенесенной ангины
		2) на фоне ОРВИ
		3) вне связи с какой-либо перенесенной инфекцией
		4) после физической нагрузки, переохлаждения
		5) в остром периоде стрептококковой инфекции
310.	**ПК-6**	ЗАТЯЖНОМУ ТЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ СООТВЕТСТВУЕТ
		1) длительность атаки 3 – 6 мес., умеренная активность процесса
		2) длительность атаки более 6 мес., монотонная, моносиндромная картина
		3) волнообразное течение с четкими обострениями и неполными ремиссиями
		4) длительность атаки до 3 мес., острое начало, полисиндромность поражения
		5) стертая картина болезни
311.	**ПК-8**	В КАЧЕСТВЕ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ НАЗНАЧАЮТ
		1) аминохинолиновые препараты (делагил)
		2) нестероидные противовоспалительные средства (вольтарен, бруфен)
		3) ацетилсалициловая кислота
		4) бензилпенициллин или полусинтетические пенициллины
312.	**ПК-6**	ВОЗБУДИТЕЛЕМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) золотистый стафилококк
		2) в-гемолитический стрептококк группы С
		3) в-гемолитический стрептококк группы А

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) возбудитель неизвестен
		5) пневмококк
313.	**ПК-6**	ДЛЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
		1) это заболевание, вызванное аденовирусами
		2) развитию ревматического процесса способствует наследственная (генетическая) предрасположенность
		3) аутоиммунные реакции при ревматизме наблюдаются крайне редко
		4) заболевание возникает в любом возрасте
314.	**ПК-6**	ДЛЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
		1) это заболевание, вызванное респираторными вирусами
		2) исходом ОРЛ может быть хроническая ревматическая болезнь сердца
		3) аутоиммунные реакции при ревматическом процессе наблюдаются крайне редко
		4) заболевание может развиться после детских инфекций – кори и коклюша
315.	**ПК-6**	ДЛЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
		1) ведущую роль в патогенезе заболевания играет бактериальное воспаление эндокарда
		2) порок сердца возникает вследствие развития бородавчато-язвенного эндокардита
		3) эффективность длительного лечения пенициллином весьма высока
		4) поражаются в основном крупные суставы
		5) порок сердца развивается спустя месяц после начала первой атаки ревматизма
316.	**ПК-6**	ДЛЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
		1) ведущую роль в патогенезе заболевания играет бактериальное воспаление эндокарда
		2) порок сердца возникает вследствие развития бородавчато-язвенного эндокардита
		3) эффективность длительного лечения пенициллином весьма высока
		4) поражается в основном миокард и эндокард с последующим развитием пороков сердца и ХСН
		5) порок сердца развивается спустя месяц после начала первой атаки ревматизма
317.	**ПК-6**	КАКОЙ КЛАПАН СЕРДЦА РАНЬШЕ ПОРАЖАЕТСЯ ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ
		1) аортальный
		2) митральный
		3) трехстворчатый

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) клапан легочной артерии
		5) все клапаны одновременно
318.	**ПК-6**	ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ ЧАСТО ПРЕДШЕСТВУЕТ ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ
		1) зеленящим стрептококком
		2) в - гемолитическим стрептококком группы А
		3) аденовирусом
		4) вирусом кори
		5) пневмококком
319.	**ПК-6**	ОСНОВНОЙ ПРОВОЦИРУЮЩИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ
		1) неинфекционные агенты
		2) аллергическая реакция
		3) стрептококковая инфекция
		4) солнечная инсоляция
		5) снижение защитных факторов организма
320.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) крапивница
		2) кольцевидная эритема
		3) петехии
		4) узловатая эритема
		5) иктеричность кожи
321.	**ПК-6**	ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ВОЗНИКАЕТ ЧЕРЕЗ
		1) 1-2 года
		2) 2-3 недели
		3) 3 дня
		4) полгода
322.	**ПК-6**	III - ЕЙ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СООТВЕТСТВУЕТ
		1) температура тела 37^0С
		2) отсутствие одышки
		3) АСГ - 1: 250
		4) серомукоиды - 0, 220
		5) С - реактивный белок +++
323.	**ПК-8**	ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ВОЛЬТАРЕНА СВЯЗАН С
		1) блокированием гистамина
		2) возбуждением адренорецепторов
		3) влиянием на гипоталамические центры
		4) стимулированием метаболизма миокарда
		5) подавление биосинтеза простагландинов

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
324.	**ПК-6**	ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ЭТИОЛОГИИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ИГРАЕТ
		1) зеленящий стрептококк
		2) в-гемолитический стрептококк группы А
		3) палочка Фридлендера
		4) респираторно-синтициальный вирус
		5) гемофильная палочка
325.	**ПК-6**	ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ
		1) клетки Боткина
		2) ашофф-талалаевские гранулемы
		3) клетки Ходжкина
		4) тельца Жолли
326.	**ПК-6**	РЕВМАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
		1) поражением мелких суставов кистей рук
		2) «летучим» поражением крупных суставов
		3) поражением крупных суставов с их деформацией
		4) поражением большого пальца стопы
327.	**ПК-6**	КОЛЬЦЕВИДНАЯ ЭРИТЕМА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ НА КОЖЕ
		1) лица
		2) ладоней и стоп
		3) волосистой части головы
		4) внутренней поверхности конечностей
328.	**ПК-6**	К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (МАЛЫМ) КРИТЕРИЯМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ОТНОСИТСЯ
		1) лихорадка
		2) кардит
		3) хорея
		4) артрит
329.	**ПК-6**	ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ 2-3 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ДЕТСКОЙ ИНФЕКЦИИ
		1) ветряной оспы
		2) инфекционного мононуклеоза
		3) паротита
		4) скарлатины
		5) кори
330.	**ПК-5**	К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (МАЛЫМ) КРИТЕРИЯМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ НА ЭКГ ОТНОСИТСЯ
		1) уширение комплекса QRS
		2) удлинение интервала PQ
		3) индекс Соколова-Лайона

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) депрессия сегмента ST
331.	**ПК-6**	ИСХОДОМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) ревматоидный артрит
		2) хроническая ревматическая болезнь сердца
		3) кольцевидная эритема
		4) хорея
332.	**ПК-8**	ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ
		1) антибиотиков пенициллинового ряда
		2) антибиотиков-аминогликозидов
		3) нестероидных противовоспалительных препаратов
		4) сердечных гликозидов
333.	**ПК-8**	ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ
		1) антибиотиков пенициллинового ряда
		2) нестероидных противовоспалительных препаратов
		3) антибиотиков-аминогликозидов
		4) сердечных гликозидов
334.	**ПК-8**	ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ
		1) ципрофлоксацина
		2) бициллина
		3) цефтриаксона
		4) кларитромицина
335.	**ПК-5**	ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ
		1) иррадиирует в левую подмышечную область
		2) лучше выслушивается в положении на правом боку
		3) сопровождается третьим тоном
		4) лучше выслушивается в положении на левом боку в фазе выдоха
		5) лучше выслушивается в вертикальном положении
336.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ СТЕНОЗА ЛЕВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОТВЕРСТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) увеличение левой границы сердца
		2) Faciesmitralis
		3) наличие мерцательной аритмии
		4) наличие "щелчка открытия" митрального клапана
337.	**ПК-6**	НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
		1) ревматизма
		2) инфаркта миокарда
		3) травмы грудной клетки

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) инфекционного эндокардита
		5) всех вышеперечисленных заболеваний
338.	**ПК-5**	ПРИ СОЧЕТАННОМ МИТРАЛЬНОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА ГРАНИЦЫ СЕРДЦА СМЕЩАЮТСЯ
		1) вверх
		2) влево, вверх и вправо
		3) вверх и вправо
		4) влево
		5) влево и вниз
339.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ
		1) увеличение КДО левого желудочка
		2) увеличение давления в левом предсердии
		3) увеличение сердечного выброса
		4) снижение давления в левом желудочке
340.	**ПК-5**	ВЕЛИЧИНА ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ ДОСТИГАЕТ
		1) 4 - 8 мм рт. ст.
		2) 20 - 30 мм рт. ст.
		3) 1 - 2 мм рт. ст.
		4) 40 - 50 мм рт. ст.
		5) не более 10 мм рт. ст.
341.	**ПК-6**	КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ПРЕСИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ У БОЛЬНЫХ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ
		1) усиливается
		2) уменьшается
		3) не изменяется
		4) исчезает
342.	**ПК-6**	ПОРОК СЕРДЦА - КЛАПАННАЯ МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В СЛУЧАЕ
		1) расширения полости левого желудочка и фиброзного кольца при гемодинамических перегрузках
		2) неполное смыкание створок митрального клапана вследствие их органического изменения
		3) дисфункции папиллярных мышц
		4) разрыва хорды
		5) кальциноза клапанного кольца в пожилом возрасте
343.	**ПК-6**	ПРИ МИТРАЛЬНОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА ХАРАКТЕРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
		1) кожные покровы бледные
		2) цвет кожи с оттенком "кофе с молоком”

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) акроцианоз, цианотический румянец
		4) цвет кожи "землистый"
		5) цвет кожи не изменен
344.	**ПК-6**	ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
		1) астеническая конституция
		2) диастолическое дрожание над верхушкой
		3) систолическое дрожание во II межреберье справа
		4) ослабление I тона на верхушке
		5) пульсация печени
345.	**ПК-8**	ЖЕНЩИНА 40 ЛЕТ, СТРАДАЮЩАЯ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ, ЖАЛУЕТСЯ НА ОДЫШКУ, УСТАЛОСТЬ, КОТОРЫЕ ПОСТЕПЕННО ПРОГРЕССИРУЮТ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЛЕГКУЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ. БОЛЬНОЙ ПОКАЗАНЫ
		1) бициллинопрофилактика
		2) антикоагулянты
		3) препараты дигиталиса
		4) митральная комиссуротомия
		5) имплантация искусственного клапана
346.	**ПК-6**	ЩЕЛЧОК ОТКРЫТИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
		1) возникает через 0, 06-0, 12 секунд после закрытия аортальных клапанов
		2) характерен для митральной недостаточности
		3) характерен для аортального стеноза
		4) лучше всего выслушивается в точке Боткина
347.	**ПК-5**	ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ИМЕЕТСЯ МЕЗОСИСТОЛИЧЕСКИЙ ЩЕЛЧОК, ЗА КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ КОРОТКИЙ СИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПОДОЗРИТЬ
		1) митральный стеноз
		2) митральную недостаточность ревматической этиологии
		3) сочетанный митральный порок
		4) пролапс митрального клапана
		5) разрыв сухожильных хорд
348.	**ПК-5**	УКАЖИТЕ R- ПРИЗНАКИ СОЧЕТАННОГО МИТРАЛЬНОГО ПОРОКА СЕРДЦА
		1) талия сердца сглажена
		2) увеличение сердца в поперечнике
		3) талия сердца сглажена, контрастированный пищевод отклоняется по дуге малого радиуса
		4) талия сердца сглажена, контрастированный пищевод отклоняется по дуге большого радиуса
		5) талия сердца сглажена, контрастированный пищевод отклоняется по дуге малого и большого радиуса

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
349.	**ПК-6**	ШУМ ФЛИНТА ОБУСЛОВЛЕН
		1) относительной митральной недостаточностью
		2) относительным митральным стенозом
		3) высокой легочной гипертензией, относительной недостаточностью клапана легочной артерии
350.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) физикальное обследование
		2) эхокардиография
		3) электрокардиография
		4) рентгенологическое исследование
351.	**ПК-6**	РЕФЛЕКС КИТАЕВА (АКТИВНЫЙ СПАЗМ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИОЛ) ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ
		1) митральной регургитации
		2) прогрессирующего роста давления в левом предсердии (более 25 мм рт. ст.) и в легочных венах
		3) снижения градиента давления «левое предсердие - левый желудочек»
		4) увеличения притока крови к сердцу
		5) повышения давления в полости левого желудочка
352.	**ПК-6**	НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПЕРЕГРУЗКЕ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ
		1) эмфиземы легких
		2) поражения миокарда левого предсердия
		3) легочной гипертензии «активного» типа
		4) легочной гипертензии «пассивного» типа
		5) сопутствующего поражения трехстворчатого клапана
353.	**ПК-6**	ПРЕХОДЯЩАЯ ОХРИПЛОСТЬ ГОЛОСА КАК СИМПТОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
		1) аортального стеноза
		2) недостаточности аортального клапана
		3) митрального стеноза
		4) недостаточности митрального клапана
354.	**ПК-6**	ДЛЯ КАКОГО ПОРОКА ХАРАКТЕРНО РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
		1) аортального стеноза
		2) недостаточности аортального клапана
		3) митрального стеноза
		4) недостаточности митрального клапана
355.	**ПК-5**	ДЛЯ КАКОГО ПОРОКА ХАРАКТЕРНО УСИЛЕНИЕ 1 ТОНА НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		1) аортального стеноза
		2) недостаточности аортального клапана
		3) митрального стеноза
		4) недостаточности митрального клапана
356.	**ПК-5**	ПРИ КАКОМ ПОРОКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОЛОСИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА, ИРРАДИИРУЮЩИЙ В ЛЕВУЮ ПОДМЫШЕЧНУЮ ОБЛАСТЬ
		1) аортальный стеноз
		2) недостаточность аортального клапана
		3) митральный стеноз
		4) недостаточность митрального клапана
357.	**ПК-6**	ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТИЕМ
		1) недостаточности аортального клапана
		2) аортального стеноза
		3) недостаточности митрального клапана
		4) митрального стеноза
358.	**ПК-6**	СИМПТОМ КВИНКЕ («ПСЕВДОКАПИЛЛЯРНЫЙ ПУЛЬС») ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
		1) аортального стеноза
		2) недостаточности аортального клапана
		3) митрального стеноза
		4) недостаточности митрального клапана
359.	**ПК-5**	ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ ФЛИНТА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
		1) аортального стеноза
		2) недостаточности аортального клапана
		3) митрального стеноза
		4) недостаточности митрального клапана
360.	**ПК-6**	ШУМ ФЛИНТА ОБУСЛОВЛЕН
		1) относительной митральной недостаточностью
		2) относительным митральным стенозом
		3) высокой легочной гипертензией
		4) относительной недостаточностью клапана легочной артерии
361.	**ПК-5**	ПРИ КАКОМ ПОРОКЕ НА КРУПНЫХ АРТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДВОЙНОЙ ТОН ТРАУБЕ
		1) аортальный стеноз
		2) недостаточность аортального клапана
		3) митральный стеноз
		4) недостаточность митрального клапана
362.	**ПК-5**	ДЛЯ КАКОГО ПОРОКА ХАРАКТЕРЕНPULSUSDIFFERENS
		1) аортального стеноза
		2) недостаточности аортального клапана

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) митрального стеноза
		4) недостаточности митрального клапана
363.	**ПК-5**	ПРИ КАКОМ ПОРОКЕ НАБЛЮДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПУЛЬСОВОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
		1) недостаточность аортального клапана
		2) аортальный стеноз
		3) недостаточность митрального клапана
		4) митральный стеноз
364.	**ПК-6**	ПРИ КАКОМ ПОРОКЕ ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНА
		1) аортальный стеноз
		2) недостаточность аортального клапана
		3) митральный стеноз
		4) недостаточность митрального клапана
365.	**ПК-5**	ДЛЯ КАКОГО ПОРОКА НА ЭКГ ХАРАКТЕРНЫ ПРИЗНАКИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
		1) аортального стеноза
		2) недостаточности аортального клапана
		3) митрального стеноза
		4) недостаточности митрального клапана
366.	**ПК-5**	ДЛЯ КАКОГО ПОРОКА НА ЭКГ ХАРАКТЕРНЫ ПРИЗНАКИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ И ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
		1) недостаточность аортального клапана
		2) аортальный стеноз
		3) недостаточность митрального клапана
		4) митральный стеноз
367.	**ПК-6**	ПРИ КАКОМ ПОРОКЕ ХАРАКТЕРНЫ СИМПТОМЫ МЮССЭ, КВИНКЕ И ШУМ ФЛИНТА
		1) недостаточность аортального клапана
		2) аортальный стеноз
		3) недостаточность митрального клапана
		4) митральный стеноз
368.	**ПК-5**	АУСКУЛЬТАТИВНО ПРИ ТРИКУСПИДАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
		1) систолический шум у мечевидного отростка, усиливающийся на высоте вдоха
		2) систолический шум у мечевидного отростка, усиливающийся на высоте выдоха
		3) систолический шум у мечевидного отростка, усиливающийся на правом боку
		4) систолический шум у мечевидного отростка, усиливающийся на левом боку

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
369.	**ПК-5**	КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ЦВД) ПРИ ТРИКУСПИДАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
		1) не изменяется
		2) понижается
		3) повышается
370.	**ПК-6**	У БОЛЬНОЙ 40 ЛЕТ ОБНАРУЖЕНО СМЕЩЕНИЕ ГРАНИЦ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА ВПРАВО И ВВЕРХ, СИМПТОМ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДРОЖАНИЯ И ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА. КАКОЙ ПОРОК СЕРДЦА ВЕРОЯТЕН У БОЛЬНОЙ
		1) стеноз митрального клапана
		2) недостаточность митрального клапана
		3) стеноз аортального клапана
		4) недостаточность аортального клапана
371.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО 42 ЛЕТ ОБНАРУЖЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ ГРАНИЦ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА ВЛЕВО И ВНИЗ, ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ В ТОЧКЕ БОТКИНА-ЭРБА. КАКОЙ ПОРОК СЕРДЦА ВЕРОЯТЕН У БОЛЬНОГО
		1) стеноз митрального клапана
		2) недостаточность митрального клапана
		3) стеноз аортального клапана
		4) недостаточность аортального клапана
372.	**ПК-5**	ДЛЯ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО
		1) систолический шум на верхушке
		2) диастолический шум на верхушке
		3) систолический шум над аортой
		4) хлопающий первый тон на верхушке
373.	**ПК-5**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА
		1) ослабленный 1-й тон на верхушке
		2) систолический шум на верхушке сердца
		3) протодиастолический шум во 2-м межреберье справа
		4) хлопающий первый тон на верхушке
374.	**ПК-5**	ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
		1) пульсация зрачков
		2) снижение пульсового давления
		3) высокое диастолическое АД
		4) систолический шум над аортой
375.	**ПК-6**	СТЕНОЗ ЛЕВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОТВЕРСТИЯ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
		1) ревматизма
		2) инфаркта миокарда

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) травмы грудной клетки
		4) сифилиса
376.	**ПК-6**	ПРИ МИТРАЛЬНОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА ХАРАКТЕРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
		1) кожные покровы бледные
		2) цвет кожи с оттенком "кофе с молоком”
		3) цвет кожи с оттенком "кофе с молоком”
		4) акроцианоз, цианотический румянец
377.	**ПК-6**	ЧТО НЕВЕРНО В ОТНОШЕНИИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ
		1) этиология b-гемолитический стрептококк группы А
		2) главный признак болезни узелки Ашофф - Талалаева
		3) почти всегда поражаются суставы
		4) преднизолон должен назначаться каждому больному с ревматическим пороком сердца
378.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ СТЕНОЗА ЛЕВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОТВЕРСТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) увеличение левой границы сердца
		2) Faciesmitrales
		3) наличие мерцательной аритмии
		4) наличие "щелчка открытия" митрального клапана
		5) сглаженность талии сердца при рентгенологическом исследовании
379.	**ПК-5**	УСИЛЕНИЕ 1-ГО ТОНА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
		1) недостаточности митрального клапана
		2) недостаточности трехстворчатого клапана
		3) недостаточности аортального клапана
		4) стеноза левого атриовентрикулярного отверстия
		5) аортального стеноза
380.	**ПК-5**	ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ
		1) иррадиирует в левую подмышечную область
		2) лучше выслушивается в положении на правом боку
		3) сопровождается третьим тоном
		4) лучше выслушивается в положении на левом боку в фазе выдоха
		5) лучше выслушивается в вертикальном положении
381.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО 42 ЛЕТ ОБНАРУЖЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ ГРАНИЦ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА ВЛЕВО, УСИЛЕНИЕ ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА, ВЫРАЖЕННЫЙ СИМПТОМ СИСТОЛИЧЕСКОГО ДРОЖАНИЯ ВО 2-М МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА ОТ ГРУДИНЫ И ТАМ ЖЕ ОСЛАБЛЕНИЕ 2-ГО ТОНА. КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ АУСКУЛЬТАТИВНЫХ ФЕНОМЕНОВ НЕПРЕМЕННО ДОЛЖЕН ИМЕТЬ МЕСТО У ДАННОГО БОЛЬНОГО
		1) систолический шум на верхушке

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) диастолический шум на верхушке
		3) систолический шум над аортой
		4) диастолический шум над аортой
		5) систолический шум у мечевидного отростка
382.	**ПК-5**	ДЛЯ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА ХАРАКТЕРНО
		1) хлопающий первый тон на верхушке
		2) систолический шум на верхушке
		3) увеличение границ сердца влево
		4) снижение сердечного выброса
383.	**ПК-5**	ПАЦИЕНТ 19 ЛЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ МИТРАЛЬНОГО ПОРОКА СЕРДЦА. ПРИ ОСМОТРЕ БЫЛ ВЫЯВЛЕН СИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА. КАКОЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДИАГНОЗА ПОРОКА СЕРДЦА
		1) ЭКГ
		2) эхокардиография
		3) рентгеноскопия грудной клетки
		4) исследование крови на титры антистрептококковых антител
		5) ни один из перечисленных методов
384.	**ПК-10**	У БОЛЬНОГО 41 ГОДА С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ ВОЗНИК ПАРОКСИЗМ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ С ЧСС 190 В МИНУТУ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ НАЧАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЗАСТОЯ В ЛЕГКИХ. С ЧЕГО ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ
		1) дигоксин
		2) коринфар
		3) обзидан
		4) лидокаин
		5) электрическая дефибрилляция
385.	**ПК-5**	КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ АД ПРИ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
		1) не изменяется
		2) повышается только систолическое
		3) повышается только диастолическое
		4) повышается систолическое АД и понижается диастолическое
		5) понижается систолическое АД и повышается диастолическое
386.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО 42 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕГО МИТРАЛЬНЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА, ПОЯВИЛИСЬ ПРЕДСЕРДНЫЕ ЭКСТРАСИСТОЛЫ. ЧЕМ ГРОЗИТ ДАННОЕ НАРУШЕНИЕ РИТМА
		1) развитием недостаточности кровообращения
		2) появлением фибрилляции предсердий
		3) появлением коронарной недостаточности
		4) всем вышеперечисленным

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		5) ничем из перечисленного
387.	**ПК-5**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА
		1) систолический шум на верхушке сердца
		2) ослабленный 1-й тон на верхушке
		3) протодиастолический шум во 2-м межреберье справа
		4) диастолический шум на верхушке
		5) ослабленный 2-й тон во 2-м межреберье справа
388.	**ПК-6**	НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА МОЖЕТ РАЗ-ВИВАТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
		1) ревматизма
		2) инфаркта миокарда
		3) травмы грудной клетки
		4) инфекционного эндокардита
		5) всех вышеперечисленных заболеваний
389.	**ПК-6**	КАКОЙ ПРИЗНАК НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АОРТАЛЬНОЙ НЕ-ДОСТАТОЧНОСТИ
		1) пульсация зрачков
		2) снижение пульсового давления
		3) быстрый и высокий пульс
		4) высокое систолическое АД
		5) высокий сердечный выброс
390.	**ПК-6**	СТЕНОЗ ЛЕВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОТВЕРСТИЯ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
		1) ревматизма
		2) инфаркта миокарда
		3) травмы грудной клетки
		4) инфекционного эндокардита
		5) всех вышеперечисленных заболеваний
391.	**ПК-5**	ПЛОЩАДЬ ЛЕВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОТВЕРСТИЯ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ
		1) 1-2 кв. см
		2) 4-6 кв. см
		3) 8-10 кв. см
		4) 8 кв. см
392.	**ПК-6**	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВЕННЫЙ ПУЛЬС БЫВАЕТ
		1) при стенозе устья аорты
		2) при недостаточности митрального клапана
		3) при легочной гипертензии любого происхождения
		4) при недостаточности трикуспидального клапана
		5) при недостаточности клапана аорты
393.	**ПК-6**	МЕХАНИЗМОМ ПОЯВЛЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА ВО

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		II МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ
		1) недостаточности аортального клапана
		2) недостаточности трикуспидального клапана
		3) недостаточности митрального клапана
		4) недостаточности клапана легочной артерии
394.	**ПК-5**	КАКОЙ ШУМ ПРИ АОРТАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ
		1) голосистолический
		2) протосистолический
		3) мезосистолический
		4) пресистолический
		5) протодиастолический
395.	**ПК-5**	ОСОБЕННОСТЬ ПУЛЬСА ПРИ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧ-НОСТИ
		1) брадикардия
		2) мерцательная аритмия
		3) малый медленный
		4) высокий скорый
396.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
		1) S. Aureus
		2) Str. pneumoniae
		3) Kl. pneumonia
		4) H. influensae
397.	**ПК-6**	ПОРАЖЕНИЕ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ ИНФЕК-ЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ
		1) у наркоманов
		2) у детей
		3) у мужчин
		4) у женщин
398.	**ПК-6**	У НАРКОМАНОВ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ПОРАЖАЕТСЯ
		1) митральный клапан
		2) аортальный клапан
		3) клапан легочной артерии
		4) трехстворчатый клапан
399.	**ПК-5**	ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЭХО-КГ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДО-КАРДИТЕ
		1) гипокинез
		2) акинез
		3) вегетации на клапанах
		4) дилатация полостей сердца
400.	**ПК-8**	АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДО-

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		КАРДИТА НЕИЗВЕСТНОЙ ЭТИОЛОГИИ
		1) оксациллин, гентамицин
		2) амоксициллин, кларитромицин
		3) фтивазид, рифампицин
401.	**ПК-5**	К ПАЦИЕНТАМ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ОТНОСЯТСЯ
		1) с врожденными пороками сердца
		2) с ожирением
		3) с сахарным диабетом
		4) с артериальной гипертензией
402.	**ПК-5**	УВЕЛИЧЕНИЮ ЧАСТОТЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА СПОСОБСТВУЕТ
		1) рост наркомании
		2) прием антибиотиков
		3) повышение уровня жизни
		4) гиподинамия
403.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
		1) гиперемия кожных покровов с вишневым оттенком
		2) цвета «кофе с молоком»
		3) диффузный цианоз
		4) желтуха
404.	**ПК-5**	К ХАРАКТЕРНЫМ КОЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ОТНОСИТСЯ
		1) цвет кофе с молоком
		2) диффузный теплый цианоз
		3) акроцианоз
		4) герпетические высыпания
405.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
		1) оперативные вмешательства
		2) длительное курение
		3) тесный контакт с больным туберкулезом легких
		4) психоэмоциональный стресс
406.	**ПК-6**	ХАРАКТЕРНЫЕ КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
		1) кольцевидная эритема
		2) эритема в форме бабочки на лице
		3) узелки Ослера
		4) узелки Гебердена
407.	**ПК-6**	ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ - ЭТО
		1) острое несоответствие коронарного кровотока и потребностей

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		миокарда в кислороде
		2) полипозно-язвенное воспаление эндокарда
		3) системное воспалительное заболевание с поражением клапанов сердца
		4) первичное поражение миокарда с расширением полостей сердца
408.	**ПК-5**	К БОЛЬШИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ ИНФЕКЦИ-ОННОГО ЭНДОКАРДИТА ОТНОСИТСЯ
		1) лихорадка
		2) узелки Ослера
		3) подвижные вегетации на створках клапана
		4) пятна Рота
409.	**ПК-5**	К БОЛЬШИМ КРИТЕРИЯМ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ОТНОСИТСЯ
		1) лихорадка
		2) лейкоцитоз
		3) лейкопения
		4) положительная культура крови
410.	**ПК-6**	ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ
		1) аортальный клапан
		2) митральный клапан
		3) трикуспидальный клапан
		4) клапан легочной артерии
411.	**ПК-8**	ОСНОВА ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
		1) активная иммунокорригирующая терапия
		2) длительная терапия глюкокортикостероидами
		3) хирургическое лечение
		4) непрерывная антибактериальная терапия
412.	**ПК-5**	КРАЕУГОЛЬНЫМ КАМНЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОН-НОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) положительная культура крови
		2) отрицательная культура крови
		3) лейкоцитоз
		4) лейкопения
413.	**ПК-5**	ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) врожденный стеноз аортального клапана
		2) кариозные зубы
		3) внутривенная наркомания
		4) хроническая алкогольная интоксикация
414.	**ПК-8**	КАКОЙ АНТИБИОТИК НАИБОЛЕЕ ВСЕГО ПОКАЗАН БОЛЬНО-МУ ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ, ВЫЗВАННЫМ СТРЕПТОКОККОМ, С АЛЛЕРГИЕЙ К ПЕНИЦИЛЛИНУ

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		1) эритромицин
		2) цефалоспорины
		3) ампициллин
		4) оксациллин
		5) ванкомицин
415.	**ПК-5**	ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) атеросклероз коронарных артерий
		2) спазм коронарных артерий
		3) эритроцитоз
		4) эмболия в коронарные артерии
416.	**ПК-5**	В ПАТОГЕНЕЗЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА НАРЯДУ С БАКТЕРИЕМИЕЙ И ПОРАЖЕНИЕМ ЭНДОТЕЛИЯ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
		1) дефицит железа
		2) снижение общей реактивности организма
		3) дефицит факторов свертывания крови
417.	**ПК-8**	НАЗОВИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ
		1) амоксициллин
		2) флуконазол
		3) цефтриаксон
		4) ванкомицин
418.	**ПК-5**	К ОСНОВНЫМ ЗВЕНЬЯМ ПАТОГЕНЕЗА ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ОТНОСЯТСЯ
		1) бактериемия
		2) атеросклероз
		3) гиперхолестеринемия
		4) активация РААС
419.	**ПК-6**	ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ НА ТРИКУСПИДАЛЬНОМ КЛАПАНЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ
		1) у больных, находящихся на хроническом гемодиализе
		2) после операций на полости рта
		3) после эндоскопических исследований
		4) у наркоманов, пользующихся внутривенными наркотиками
420.	**ПК-6**	К ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА, ОБУСЛОВЛЕННЫМ ВАСКУЛИТОМ ИЛИ ЭМБОЛИЕЙ ОТНОСЯТ
		1) пятна Лукина
		2) пальцы в виде барабанных палочек
		3) ногти в виде часовых стекол

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) подкожные ревматические узелки
421.	**ПК-5**	ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) ожирение
		2) гиподинамия
		3) курение
		4) наличие порока сердца
		5) легочная гипертензия
422.	**ПК-5**	В ОСНОВЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЕЖИТ
		1) нарушение насосной функции сердца
		2) снижение АД
		3) снижение функции автоматизма сердца
		4) гипертрофия левого желудочка
		5) понижение давления в малом круге
423.	**ПК-5**	ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВЕДЕТ К ПЕРЕГРУЗКЕ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА ВСЛЕДСТВИЕ
		1) снижения коронарной перфузии
		2) спазма легочных артериол
		3) ретроградной передачи повышенного давления на сосуды малого круга
		4) снижения периферического сопротивления
		5) повышения легочного сопротивления
424.	**ПК-6**	ОСНОВНЫМ НАЧАЛЬНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ЗАСТОЙНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) периферические отеки нижних конечностей
		2) гипертензия в малом круге кровообращения
		3) выпот в плевральных полостях
		4) увеличение живота
		5) повышение конечного диастолического давления в правом желудочке
425.	**ПК-5**	ОСНОВНЫМ ПУСКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) тканевая гипоксия
		2) снижение систолической или диастолической функции миокарда
		3) гиперактивация симпато-адреналовой системы
		4) спазм артериол
		5) активация местных тканевых РАС
426.	**ПК-8**	УКАЖИТЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
		1) ректальный
		2) сублингвальный

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) внутрь
		4) внутривенный
		5) накожный
427.	**ПК-6**	ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ПО NYHA
		1) I класса
		2) II класса
		3) III класса
		4) IV класса
428.	**ПК-6**	ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) отеки
		2) желтуха
		3) увеличение печени
		4) цианоз
		5) одышка
429.	**ПК-5**	РАЗВИТИЮ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ СПОСОБСТВУЕТ
		1) появление отеков на нижних конечностях
		2) повышение давления в легочных капиллярах
		3) депонирование крови в печени
		4) дилатация правых отделов сердца
		5) уменьшение постнагрузки
430.	**ПК-11**	НАЗНАЧЬТЕ ПРЕПАРАТ ПРИ ОСТРО ВОЗНИКШЕЙ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЕ
		1) введение прессорных аминов
		2) лазикс внутривенно
		3) эуфиллинвнутрь
		4) ингаляция симпатомиметика
431.	**ПК-8**	КАКОЙ ДИУРЕТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
		1) лазикс
		2) верошпирон
		3) диакарб
		4) гипотиазид
432.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) ХОБЛ
		2) тромбоэмболия легочной артерии
		3) кардиомиопатии

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) миокардит
433.	**ПК-6**	ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СЛЕДУЮЩЕГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ
		1) вентрикулография
		2) стресс допплер-эхокардиография
		3) компьютерная томография
		4) допплер-эхокардиография
		5) электрокардиография
434.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ И ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ХСН ЯВЛЯЕТСЯ
		1) электрокардиография
		2) эхокардиография
		3) рентгенография сердца в трех проекциях
		4) фонокардиография
		5) зондирование полостей сердца
435.	**ПК-5**	ОДНИМ ИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ В ПЛАЗМЕ КРОВИ
		1) КФК
		2) аминотрансфераз
		3) креатинина
		4) натрийуретических пептидов
		5) щелочной фосфатазы
436.	**ПК-5**	НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТУЮ ПРИЧИНУ ХСН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
		1) ревматические пороки сердца
		2) ИБС
		3) артериальная гипертензия
		4) кардиомиопатия
		5) миокардиты и миокрдиодистрофия
437.	**ПК-6**	КАКОЙ ПРИЗНАК ПАТОГНОМОНИЧЕН ДЛЯ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
		1) набухание шейных вен
		2) асцит
		3) увеличение печени
		4) ортопноэ
		5) отеки на ногах
438.	**ПК-5**	СИМПТОМОМ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ ЭКГ-ПРИЗНАК
		1) отклонение электрической оси сердца вправо
		2) смещение переходной зоны влево
		3) высокие зубцы R в левых грудных отведениях

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) высокие зубцы R в правых грудных отведениях
		5) глубокие зубцы S в левых грудных отведениях
439.	**ПК-8**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ОТНОСИТСЯ К СЕРДЕЧНЫМ ГЛИКОЗИДАМ
		1) дигоксин
		2) строфантин
		3) изоланид
		4) коргликон
		5) верошпирон
440.	**ПК-8**	ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ β-БЛОКАТОРОВ
		1) синусовая тахикардия
		2) желудочковая тахикардия
		3) пароксизмальная наджелудочковая тахикардия
		4) бронхиальная астма
		5) артериальная гипертония
441.	**ПК-6**	ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЛЯ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) ортопноэ
		2) асцит
		3) увеличение печени
		4) набухание шейных вен
		5) отеки на ногах
442.	**ПК-6**	ДЛЯ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) увеличение печени
		2) кашель
		3) сердечная астма
		4) акроцианоз
		5) отеки
443.	**ПК-5**	ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) активация ренин-ангиотензиновой системы (РАС)
		2) активация симпатико-адреналовой системы
		3) снижение сократительной способности миокарда
		4) активация выработки альдостерона и вазопрессина (АДГ)
		5) развитие ремоделирования миокарда
444.	**ПК-5**	ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ HELICOBACTERPYLORI (HP)
		1) выявление HP в гистологических препаратах слизистой оболочки желудка
		2) выявление HP в мазках-отпечатках биоптатов слизистой оболочки

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		желудка
		3) выделение чистой культуры HP и определение ее чувствительно-сти к антибиотикам
		4) выявление фрагментов ДНК HP методом ПЦР в биоптате СО (зубном налете, кале)
		5) изучение уреазной активности в биоптате слизистой оболочки же-лудка (CLO-тест)
445.	**ПК-5**	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ HELICOBACTERPYLORI (HP)
		1) выявление HP в мазках -отпечатках биоптатов слизистой оболочки желудка
		2) выделение чистой культуры и определение ее чувствительности к антибиотикам
		3) выявление фрагментов ДНК HP методом ПЦР в биоптате СО (зубном налете, кале)
		4) определение в выдыхаемом больным воздухе изотопов ^{14}C или ^{13}C (дыхательный тест)
		5) изучение уреазной активности в биоптате слизистой оболочки же-лудка (CLO-тест)
446.	**ПК-5**	ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ HELICOBACTERPYLORI (HP)
		1) выявление HP в мазках- отпечатках биоптатов слизистой оболочки желудка
		2) выделение чистой культуры HP и определение чувствительности к антибиотикам
		3) выявление антител IgM и IgG к HP в крови с помощью ИФА
		4) выявление фрагментов ДНК HP методом ПЦР в биоптате СО (зубном налете, кале)
		5) изучение уреазной активности в биоптате слизистой оболочки же-лудка (CLO-тест)
447.	**ПК-5**	МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ HELICOBACTERPYLORI (HP)
		1) выявление HP в мазках- отпечатках биоптатов слизистой оболочки желудка
		2) выявление фрагментов ДНК HP в биоптатах слизистой оболочки желудка СО (зубном налете, кале)
		методом ПЦР
		3) выявление антител IgM и IgG к HP в крови с помощью иммуно-ферментного анализа
		5) изучение уреазной активности в биоптате слизистой оболочки же-лудка (CLO-тест)
448.	**ПК-5**	ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ HELICOBACTERPYLORI (HP)
		1) выявление HP в биоптатах слизистой оболочки антрального отде-ла и тела желудка
		2) выявление HP в мазках- отпечатках биоптатов слизистой оболочки

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		желудка
		3) выделение чистой культуры и определение чувствительности к антибиотикам
		4) выявление фрагментов ДНК HP в биоптатах слизистой оболочки желудка СО (зубном налете, кале)
		методом ПЦР
		5) изучение уреазной активности HP в биоптатах слизистой оболочки желудка (CLO-тест)
449.	**ПК-5**	БИОХИМИЧЕСКИЙ ТЕСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HELICOBACTERPY-LORI (HP) ОСНОВАН НА ВЫЯВЛЕНИИ
		1) изучение уреазной активности HP в биоптатах слизистой оболочки желудка (CLO-тест)
		2) выявление антител IgM и IgG к H. pylori в крови с помощью им-муноферментного анализа
		3) выделение чистой культуры HP и определение чувствительности к антибиотикам
		4) выявление фрагментов ДНК HP в биоптатах слизистой оболочки желудка СО (зубном налете, кале)
		методом ПЦР
		5) выявление HP в мазках- отпечатках биоптатов слизистой оболочки желудка
450.	**ПК-8**	КЛАРИТРОМИЦИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕАТРО-ФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ
		1) эрадикации Helicobacterpylori
		2) коррекции нарушений желудочной секреции
		3) устранения нарушений моторной функции желудка
		4) регуляции нарушений кишечного пищеварения
451.	**ПК-8**	ОМЕПРАЗОЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕАТРОФИЧЕ-СКОГО ГАСТРИТА НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ
		1) эрадикации Helicobacterpylori
		2) коррекции нарушений желудочной секреции
		3) устранения нарушений моторной функции желудка
		4) регуляции нарушений кишечного пищеварения
452.	**ПК-8**	МЕТОКЛОПРАМИД ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕАТРО-ФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ
		1) эрадикации Helicobacterpylori
		2) коррекции нарушений желудочной секреции
		3) устранения нарушений моторной функции желудка
		4) регуляции нарушений кишечного пищеварения
453.	**ПК-6**	ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ СНИЖАЕТСЯ СЕКРЕТОРНО - КИ-СЛОТООБРАЗУЮШАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДКА
		1) хронический антральный гастрит (ХГ типа В)
		2) болезнь Менетрие (гипертрофический гастрит)
		3) синдром Золлингера – Эллисона при гастриномах

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) хронический фундальный гастрит (ХГ типа А)
454.	**ПК-6**	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА, АССОЦИИРОВАННОГО С ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
		1) появление антител к обкладочным клеткам
		2) появление антител к гастромукопротеину
		3) появление антител к Helicobacterpylori
		4) развитие B_{12} дефицитной анемии
455.	**ПК-5**	ПРИ pH-МЕТРИИ В ТЕЛЕ ЖЕЛУДКА НОРМАЦИДНЫМИ СЧИТАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ
		1) 0. 9 – 1. 2
		2) 1. 3 – 1. 7
		3) 1. 8 – 3. 0
		4) 3. 0 – 7. 0
456.	**ПК-5**	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ХАРАКТЕРНА АНЕМИЯ
		1) железодефицитная
		2) B_{12}- дефицитная
		3) гипопластическая (апластическая)
		4) гемолитическая
457.	**ПК-8**	ПАНКРЕАТИН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕАТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ
		1) эрадикации Helicobacterpylori
		2) коррекции нарушений желудочной секреции
		3) устранения нарушений моторной функции желудка
		4) регуляции нарушений кишечного пищеварения
458.	**ПК-8**	К МИОТРОПНЫМ СПАЗМОЛИТИКАМ ОТНОСИТСЯ
		1) панкреатин
		2) метоклопрамид
		3) де-нол
		4) дротаверин
459.	**ПК-5**	В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И РАКОМ ЖЕЛУДКА САМЫМ ВАЖНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) рентгеноскопия желудка
		2) исследование желудочной секреции с гистамином
		3) фиброгастроскопия с прицельной биопсией
		4) реакция Грегерсена
		5) цитологическое исследование промывных вод желудка
460.	**ПК-5**	ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ СОСТОЯНИЕ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) повышение базальной и стимулированной секреции
		2) снижение секреторной функции
		3) секреция не изменяется
		4) развивается полная ахлоргидрия
		5) секреция снижается незначительно
461.	**ПК-5**	ПОЯВЛЕНИЕ ШУМА ПЛЕСКА ПРИ ТОЛЧКОВОЙ ПЕРКУССИИ В ЭПИГАСТРИИ СПУСТЯ 5-6 Ч ПОСЛЕ ПРИЕМА ЖИДКОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
		1) о развитии перфорации желудка
		2) о развитии желудочного кровотечения
		3) об обострении хронического гастрита
		4) о развитии стеноза привратника
462.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ ФАМОТИДИН
		1) блокатор н2-гистаминорецепторов
		2) холинолитик общего действия
		3) холинолитик местного действия
		4) антацид
		5) миотоник
463.	**ПК-5**	САМЫМ НАДЕЖНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПРИ ЯБ ЯВЛЯЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ
		1) рентгенологическое
		2) кала на скрытую кровь
		3) желудочной секреции
		4) физикальное (перкуссия, пальпация)
		5) эндоскопическое
464.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ АЛМАГЕЛЬ
		1) блокатор н2-гистаминорецепторов
		2) холинолитик общего действия
		3) антацид
		4) холинолитик местного действия
		5) миотоник
465.	**ПК-8**	ХОЛИНОЛИТИКИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ
		1) через 30 минут после еды
		2) через 1-2 часа после еды
		3) за 30 мин. до еды
		4) только на ночь
		5) во время приема пищи
466.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ МАЛИГ-НИЗАЦИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
		1) рентгенологический
		2) эндоскопический
		3) исследование кала на скрытую кровь

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) желудочный сок с гистамином
		5) эндоскопия с биопсией
467.	**ПК-8**	ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЮТ В КВАДРОСХЕМУ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
		1) панкреатин
		2) де-нол
		3) атропин
		4) платифиллин
468.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО С МНОГОЛЕТНИМ ТЕЧЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ПОЯВИЛИСЬ ИНТЕНСИВНЫЕ БОЛИ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ
		1) стеноз привратника
		2) пенетрация
		3) малигнизация
		4) перфорация
		5) кровотечение
469.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО, СТРАДАЮЩЕГО ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА, ПОЯВИЛИСЬ ЖАЛОБЫ НА ОТРЫЖКУ «ТУХЛЫМ ЯЙЦОМ», РВОТУ ПРИНЯТОЙ НАКАНУНЕ ПИЩЕЙ. ВЕРОЯТНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ
		1) стеноз привратника
		2) пенетрация
		3) малигнизация
		4) перфорация
470.	**ПК-6**	У 30-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ОТМЕЧАЮТСЯ НОЧНЫЕ БОЛИ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, УМЕНЬШАЮЩИЕСЯ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ. ВНЕЗАПНО ПОСЛЕ ПОДЪЕМА ТЯЖЕСТИ ПОЯВИЛИСЬ ОСТРЫЕ БОЛИ. ВЕРОЯТНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ
		1) стеноз привратника
		2) пенетрация
		3) малигнизация
		4) перфорация
471.	**ПК-8**	ПРОТИВОЯЗВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, БЛОКИРУЮЩИЙ Н-2 РЕЦЕПТОРЫ ГИСТАМИНА
		1) энпростил
		2) сукральфат
		3) даларгин
		4) фамотидин
		5) гастал
472.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫСЕВАЕТСЯ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ОБОСТРЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
		1) стафилококк

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) стрептококк
		3) грибы рода candida
		4) helicobacterpylori
		5) энтерококк
473.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ПИЛОРОСТЕНОЗА
		1) рвота кофейной гущей
		2) мелена
		3) рвота к вечеру утренней пищей
		4) похудание, нарастание анемии
		5) интенсивные боли опоясывающего характера
474.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ЯЗВЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
		1) рвота кофейной гущей
		2) рвота к вечеру утренней пищей
		3) похудание, нарастание анемии
		4) интенсивные боли опоясывающего характера
		5) мелена
475.	**ПК-8**	К ИНГИБИТОРАМ ПРОТОНОВОГО НАСОСА ОТНОСИТСЯ
		1) омепразол
		2) зантак
		3) протаб
		4) смекта
		5) энпростил
476.	**ПК-8**	К ГАСТРОЦИТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ
		1) панкреатин
		2) метронидазол
		3) атропин
		4) сукральфат
477.	**ПК-8**	ВЫРАЖЕННЫЙ ПРОТИВОРВОТНЫЙ ЭФФЕКТ ОКАЗЫВАЕТ
		1) панкреатин
		2) метоклопрамид
		3) кларитромицин
		4) дротаверин
478.	**ПК-8**	ОКРАШИВАНИЕ КАЛА В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
		1) панкреатина
		2) метоклопрамида
		3) де-нола
		4) метронидазола
479.	**ПК-6**	ВЕДУЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, ОТЛИЧАЮЩИЙ ЯЗВЕННУЮ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ
		1) особенности болевого синдрома

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) отсутствие сезонности обострений
		3) диагностика Helicobacterpylori
		4) астеноневротический
480.	**ПК-5**	ВЫБЕРИТЕ СИНОНИМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА А
		1) неатрофический
		2) аллергический
		3) атрофический
		4) реактивный рефлюкс-гастрит
481.	**ПК-5**	ВЫБЕРИТЕ СИНОНИМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В
		1) неатрофический
		2) аллергический
		3) атрофический
		4) реактивный рефлюкс-гастрит
482.	**ПК-5**	ВЫБЕРИТЕ СИНОНИМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА С
		1) неатрофический
		2) аллергический
		3) атрофический
		4) реактивный рефлюкс-гастрит
483.	**ПК-5**	ВЕДУЩИМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ НЕАТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) воспаление слизистой оболочки антрального отдела желудка
		2) аутоиммунное поражение фундального отдела желудка
		3) повреждающее действие желчных кислот
		4) выраженная лимфоцитарная инфильтрация эпителия
484.	**ПК-5**	ВЕДУЩИМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) воспаление слизистой оболочки антрального отдела желудка
		2) аутоиммунное поражение фундального отдела желудка
		3) повреждающее действие желчных кислот
		4) выраженная лимфоцитарная инфильтрация эпителия
485.	**ПК-5**	ВЕДУЩИМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ХИМИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) воспаление слизистой оболочки антрального отдела желудка
		2) аутоиммунное поражение фундального отдела желудка
		3) повреждающее действие желчных кислот
		4) выраженная лимфоцитарная инфильтрация эпителия
486.	**ПК-6**	ВЫБЕРИТЕ ВЕДУЩИЙ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА
		1) болевой
		2) желудочной диспепсии
		3) кишечной диспепсии
		4) астеноневротический

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
487.	**ПК-6**	КРИТЕРИИ, НЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ФУНДАЛЬНОГО ГАСТРИТА С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
		1) может быть тип А
		2) ассоциирован с Helicobacterpylori
		3) последствие воздействия эндогенных факторов
		4) аутоиммунный характер поражения
488.	**ПК-10**	У БОЛЬНОГО С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ПОСЛЕ 2-ЛЕТНЕЙ РЕМИССИИ ВОЗНИК РЕЦИДИВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЕЙ. БОЛЬНОМУ НЕОБХОДИМО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С СИЛЬНЫМИ БОЛЯМИ И РВОТОЙ КИСЛЫМ СОДЕРЖИМЫМ. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ВЫ ПРЕДПОЧТЕТЕ, НАРЯДУ С ДИЕТОЙ И РЕЖИМОМ
		1) церукал
		2) промедол
		3) атропин
		4) анальгин
489.	**ПК-6**	КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ПЕРФОРАЦИИ ЯЗВЫ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) тупая, давящая боль в эпигастрии, усиливающаяся при приеме пищи
		2) постоянная боль, не связанная с приемом пищи
		3) острая «кинжальная» боль
		4) боли через 30 мин после еды
490.	**ПК-5**	КАКОВ ХАРАКТЕР БОЛЕЙ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ
		1) тупая, давящая боль в эпигастрии, усиливающаяся при приеме пищи
		2) схваткообразные ноющие боли в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо при приеме жирной пищи
		3) постоянная тупая боль, не связанная с приемом пищи
		4) боли в эпигастрии, возникающие натощак и через 2-3 часа после еды
		5) боли через 30 мин после еды
491.	**ПК-8**	ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ЭРАДИКАЦИОННАЯ СХЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
		1) омепразол+амоксициллин+кларитромицин
		2) омепразол+амоксициллин+де-нол
		3) омепразол+амоксициллин+платифиллин
		4) омепразол+амоксициллин+фамотидин
492.	**ПК-8**	ДЛЯ ПРЕПАРАТА ФАМОТИДИН ПОДБЕРИТЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКУ
		1) блокатор H_2-гистаминорецепторов
		2) холинолитик

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) ингибитор протонной помпы
		4) антацид
		5) спазмолитик
493.	**ПК-8**	ДЛЯ ПРЕПАРАТА АЛЬМАГЕЛЬ ПОДБЕРИТЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКУ
		1) блокатор H_2-гистаминорецепторов
		2) холинолитик
		3) ингибитор протонной помпы
		4) антацид
		5) спазмолитик
494.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО С МНОГОЛЕТНИМ ТЕЧЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ПОЯВИЛИСЬ ПОЧТИ ПОСТОЯННЫЕ БОЛИ С ИРРАДИАЦИЕЙ В СПИНУ. КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ
		1) стеноз привратника
		2) пенетрация
		3) малигнизация
		4) перфорация
		5) демпинг-синдром
495.	**ПК-6**	ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ СЕКРЕТОРНО-КИСЛОТООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА
		1) хронический антрум-гастрит
		2) хронический атрофический гастрит
		3) хронический гипертрофический гастрит
		4) синдром Золлингера - Эллисона
		5) при всех указанных формах
496.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ МАЛИГНИЗАЦИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
		1) рентгенологический
		2) эндоскопический
		3) кал на скрытую кровь
		4) желудочный сок с гистамином
		5) эндоскопия с биопсией
497.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО, СТРАДАЮЩЕГО ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА, В ПЕРИОД ОЧЕРЕДНОГО ОБОСТРЕНИЯ ПОЯВИЛИСЬ ЖАЛОБЫ НА ОТРЫЖКУ "ТУХЛЫМ ЯЙЦОМ", РВОТУ ПРИНЯТОЙ НАКАНУНЕ ПИЩЕЙ. КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВОЗНИКЛО У БОЛЬНОГО
		1) пенетрация
		2) перфорация
		3) кровотечение
		4) стеноз привратника
		5) малигнизация

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
498.	**ПК-5**	СТРЕССОВАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЧАЩЕ
		1) перфорацией
		2) кровотечением
		3) пенетрацией
		4) малигнизацией
		5) ничем из названного
499.	**ПК-6**	К ВАМ НА ПРИЕМ ОБРАТИЛСЯ БОЛЬНОЙ С ЖАЛОБАМИ НА БОЛИ В ЭПИГАСТРИИ, ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЕРЕЗ 1, 5-2 ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ И НАТОЩАК. НА НАЛИЧИЕ КАКОЙ ПАТОЛОГИИ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕТ ЭТОТ СИМПТОМ
		1) хронический гастрит
		2) язвенная болезнь желудка
		3) язвенная болезнь 12-перстной кишки
		4) холецистит
		5) панкреатит
500.	**ПК-8**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОКАЗАН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
		1) атропин
		2) натуральный желудочный сок
		3) альмагель
		4) гастросидин
		5) гистамин
501.	**ПК 8**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ БОЛЬНОМУ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИЕЙ
		1) бетацид
		2) панзинорм
		3) фамотидин
		4) преднизолон
		5) натуральный желудочный сок
502.	**ПК 8**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ БЛОКИРУЕТ H_2-ГИСТАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ
		1) димедрол
		2) метацин
		3) альмагель
		4) атропин
		5) фамотидин
503.	**ПК 6**	НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ОТДАЛЕННЫМ МЕТАСТАЗОМ РАКА ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) регионарные лимфоузлы
		2) печень
		3) вирховская железа
		4) дугласово пространство

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		5) легкие
504.	**ПК 8**	ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
		1) холинолитики
		2) симпатомиметики
		3) полусинтетические пенициллины
		4) H_2-гистаминовые блокаторы
		5) висмутсодержащие препараты (де-нол)
505.	**ПК 5**	ХОЛЕЦИСТОГРАФИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНА БОЛЬНЫМ
		1) с непереносимостью жиров
		2) после вирусного гепатита
		3) аллергией к йоду
		4) с желчнокаменной болезнью
		5) в любом из перечисленных случаев
506.	**ПК 6**	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА В ОТЛИЧИЕ ОТ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ХАРАКТЕРНО
		1) приступы желчной колики
		2) нарушение стула
		3) диспепсический синдром
		4) утолщение стенки желчного пузыря на УЗИ
507.	**ПК 5**	ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ДИСКИНЕЗИИ
		1) схваткообразная боль в правом подреберье при нарушении диеты
		2) постоянная боль в правом подреберье, не связанная с приемом пищи
		3) боли в эпигастрии, возникающие натощак и через 2-3 часа после еды
		4) тупая, давящая боль в эпигастрии, усиливающаяся при приеме пищи
508.	**ПК 8**	ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОТОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
		1) платифиллин
		2) но-шпа
		3) беззондовые тюбажи
		4) хирургическое лечение
509.	**ПК 5**	БОЛЕЗНЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОЕКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ВДОХЕ
		1) симптом Кера
		2) симптом Ортнера
		3) симптом Лепене
		4) симптом Мюсси
		5) симптом Кача
510.	**ПК 8**	У 50-ЛЕТНЕЙ БОЛЬНОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. ВОЗ-

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		НИК ОЧЕРЕДНОЙ ПРИСТУП ЖЕЛЧНОЙ КОЛИКИ. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОКАЗАН ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
		1) аллохол
		2) платифиллин
		3) сульфат магния
		4) урсофальк
511.	**ПК 5**	ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ
		1) тупая, давящая боль в эпигастрии, усиливающаяся при приеме пищи
		2) постоянная боль в правом подреберье, не связанная с приемом пищи
		3) боли в эпигастрии, возникающие натощак и через 2-3 часа после еды
		4) боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку при нарушении диеты
512.	**ПК 5**	БОЛЕЗНЕННОСТЬ ПРИ ПОКОЛАЧИВАНИИ ПО ПРАВОЙ РЕБЕРНОЙ ДУГЕ
		1) симптом Кера
		2) симптом Ортнера
		3) симптом Лепене
		4) симптом Мюсси
513.	**ПК 5**	БОЛЕЗНЕННОСТЬ ПРИ НАДАВЛИВАНИИ НА ДИАФРАГМАЛЬНЫЙ НЕРВ МЕЖДУ НОЖКАМИ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНОЙ МЫЩЦЫ
		1) симптом Кера
		2) симптом Ортнера
		3) симптом Лепене
		4) симптом Мюсси
514.	**ПК 6**	ДЛЯ КАКОГО СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ХАРАКТЕРЕН КОЖНЫЙ ЗУД
		1) воспалительный
		2) диспепсический
		3) болевой
		4) холестатический
515.	**ПК 8**	ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
		1) сорбит
		2) но-шпа
		3) беззондовые тюбажи
		4) хирургическое лечение
516.	**ПК 5**	ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ДИСКИНЕЗИИ

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) схваткообразная боль в правом подреберье при нарушении диеты
		2) постоянная боль в правом подреберье, не связанная с приемом пищи
		3) боли в эпигастрии, возникающие натощак и через 2-3 часа после еды
		4) тупая, давящая боль в эпигастрии, усиливающаяся при приеме пищи
517.	**ПК 8**	В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ
		1) Н2-блокаторы гистамина
		2) спазмолитические средства
		3) беззондовые тюбажи
		4) хирургическое лечение
518.	**ПК 8**	В ЛЕЧЕНИИ ГИПОКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ
		1) холекинетики
		2) спазмолитики
		3) хирургическое лечение
		4) антациды
519.	**ПК 8**	К ХОЛЕКИНЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ
		1) урсофальк
		2) ксилит
		3) аллохол
		4) панкреатин
520.	**ПК 8**	К ХОЛЕРЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ
		1) урсофальк
		2) ксилит
		3) аллохол
		4) панкреатин
521.	**ПК 8**	РАСТВОРЕНИЮ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ СПОСОБСТ-ВУЕТ
		1) урсофальк
		2) ксилит
		3) аллохол
		4) панкреатин
522.	**ПК 5**	РЕШАЮЩИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА
		1) дуоденальное зондирование
		2) УЗИ
		3) холецистография
		4) рентгеноскопия желудка
		5) ретроградная панкреато-холангиография

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
523.	**ПК 6**	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ХАРАКТЕРЕН СЛЕДУЮЩИЙ СИМПТОМ
		1) симптом Мюссэ
		2) симптом Менделя
		3) симптом Щеткина-Блюмберга
		4) симптом Мейо-Робсона
		5) симптом Кера
524.	**ПК 5**	ДЛЯ БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В ФАЗЕ РЕМИССИИ ХАРАКТЕРНО
		1) смена поносов запорами
		2) изжога
		3) боли в левом подреберье
		4) плохая переносимость жирной пищи
		5) ничего из перечисленного
525.	**ПК 8**	У 50-ЛЕТНЕЙ БОЛЬНОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. ВОЗНИК ОЧЕРЕДНОЙ ПРИСТУП ЖЕЛЧНОЙ КОЛИКИ. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ПОКАЗАН ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
		1) атропин
		2) папаверин
		3) нитроглицерин
		4) морфин
		5) анальгин
526.	**ПК 6**	ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ХОЛАНГИТА
		1) боли в правом подреберье после приема жирной пищи, тошнота, рвота
		2) приступ болей в правом подреберье с развитием желтухи, появлением обесцвеченного кала, темной мочи
		3) кратковременная боль в эпигастрии, рвота, понос
		4) фебрильная температура с ознобом, увеличение печени, желтуха, лейкоцитоз
		5) тупые боли в правом подреберье, отрыжка горечью
527.	**ПК 8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
		1) аллохол
		2) платифиллин
		3) сульфат магния
		4) урсофальк
528.	**ПК 8**	БОЛЬНАЯ 60 ЛЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СТРАДАЕТ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ПРИСТУПАМИ ЖЕЛЧНОЙ КОЛИКИ. ПРИ ПЕРОРАЛЬНОЙ ХОЛЕЦИСТОГРАФИИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ МНОЖЕСТВО МЕЛКИХ КОНКРЕМЕНТОВ. КАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		БОЛЬНОЙ
		1) спазмолитики
		2) β-блокаторы
		3) антибиотики
		4) холеретики
		5) холекинетики
529.	**ПК 5**	ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО КАЛЬЦИФИЦИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) желчно-каменная болезнь
		2) псевдокисты поджелудочной железы
		3) злоупотребление алкоголем
		4) алиментарный фактор
530.	**ПК 5**	ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
		1) схваткообразная боль в правом подреберье при нарушении диеты
		2) постоянная боль в правом подреберье, не связанная с приемом пищи
		3) боли в эпигастрии, возникающие натощак и через 2-3 часа после еды
		4) боль носит «опоясывающий» характер
531.	**ПК 5**	ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) желчно-каменная болезнь
		2) псевдокисты поджелудочной железы
		3) злоупотребление алкоголем
		4) алиментарный фактор
532.	**ПК 5**	ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ
		1) панкреозиминовый тест
		2) тест Шиллинга
		3) тест на толерантность к глюкозе
		4) проба Ласуса
533.	**ПК 5**	ОСНОВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) лейкоцитоз
		2) уровень амилазы крови и мочи
		3) уровень щелочной фосфатазы
		3) гипергликемия
534.	**ПК 5**	ХАРАКТЕРНЫМ КОЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) кольцевидная эритема
		2) пятна Лукина
		3) симптом «рубиновых капелек»

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) узелки Ослера
535.	**ПК 6**	СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТ-ВЕННО ПРИ
		1) хроническом панкреатите
		2) хроническом холецистите
		3) хроническом гастрите
		4) хроническом гепатите
536.	**ПК 8**	В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ
		1) бускопана
		2) креона
		3) панкреатина
		4) фестала
537.	**ПК 8**	ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПРОТЕОЛИЗА ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
		1) контрикал
		2) креон
		3) фестал
		4) платифиллин
538.	**ПК 8**	С ЦЕЛЬЮ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ХРО-НИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
		1) кетонал
		2) креон
		3) церукал
		4) фестал
539.	**ПК 8**	ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОНТРИКАЛА ПРИ ОБОСТ-РЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) болевой синдром
		2) диспепсический синдром
		3) гиперферментемия
		4) гипергликемия
540.	**ПК 5**	КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОР-НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
		1) креаторея, стеаторея, снижение массы тела
		2) боли в левом подреберье, лейкоцитоз
		3) гипергликемия
		4) желтуха, гипербилирубинемия
541.	**ПК 5**	КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ ВНУТРИСЕКРЕТОР-НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
		1) креаторея, стеаторея, снижение массы тела
		2) боли в левом подреберье, лейкоцитоз
		3) гипергликемия

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) желтуха, гипербилирубинемия
542.	**ПК 8**	ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ
		1) контрикала
		2) креона
		3) сандостатина
		4) инсулина
543.	**ПК 5**	МЕТОД ОЦЕНКИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
		1) секретин-панкреозиминовый тест
		2) определение радиоиммунного инсулина в крови
		3) эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
		4) ангиография поджелудочной железы
544.	**ПК 5**	КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
		1) лежа на левом боку
		2) лежа на правом боку
		3) коленно-локтевое положение
		4) лежа на спине
545.	**ПК 8**	ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ
		1) фосфалюгель
		2) платифиллин
		3) сандостатин
		4) трасилол
		5) квамател
546.	**ПК 8**	В БОРЬБЕ С БОЛЬЮ ПРИ ХП НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ
		1) кетонал
		2) трамадол
		3) баралгин
		4) морфий
547.	**ПК 5**	ВЫДЕЛИТЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ ТОТ, ПРИ КОТОРОМ РАЗВИВАЕТСЯ ХРОНИЧЕСКАЯ КАЛЬЦИФИЦИРУЮЩАЯ ФОРМА ПАНКРЕАТИТА
		1) наличие кист в поджелудочной железе
		2) злоупотребление алкоголем
		3) желчнокаменная болезнь
		4) тнаследственность
		5) инфицирование вирусом эпидемического паротита
548.	**ПК 6**	НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ СИМПТОМОМ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) рвота
		2) изжога
		3) отрыжка
		4) боль
		5) метеоризм
549.	**ПК 5**	ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ ОБ ОБОСТ-РЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
		1) кальцификация поджелудочной железы при УЗИ
		2) повышение эхогенности поджелудочной железы при УЗИ
		3) нарушение толерантности к глюкозе
		4) гиперамилазурия
550.	**ПК 8**	ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ С НАИБОЛЬШЕЙ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
		1) фестал
		2) панкреатин
		3) креон
		4) мезим
551.	**ПК 6**	СОГЛАСНО МАРСЕЛЬСКО-РИМСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ХП (1988) РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ
		1) кальцифицирующий
		2) обструктивный
		3) фиброзно-индуративный
		4) псевдотуморозный панкреатит
		5) верно 1, 2, 3
552.	**ПК 8**	БЛОКАТОРОМ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ СЕКРЕЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) гастрин
		2) секретин
		3) соматостатин
		4) холецистокинин
		5) инсулин
553.	**ПК 5**	ПУСКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) снижение секреции желудочного сока
		2) повышение кислотности желудочного сока
		3) активация ферментов в ткани поджелудочной железы и аутолиз
		4) повышенная выработка желчи и дуодено-гастральный рефлюкс
554.	**ПК 5**	ИЗ КОЖНЫХ СИМПТОМОВ ДЛЯ ХП ХАРАКТЕРНЫ
		1) сосудистые звездочки
		2) ксантомы
		3) ”рубиновые капельки”
		4) следы расчесов
		5) желтушность

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
555.	**ПК 6**	ПРИЧИНОЙ ПОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕСТАЗА ПРИ ХП ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ
		1) сдавление общего желчного протока увеличенной головкой поджелудочной железы
		2) повышенный гемолиз
		3) дуодено-гастральный рефлюкс желчи
		4) развитие гепатита
		5) развитие холангита
556.	**ПК 8**	НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПОДАВЛЯЮТ СЕКРЕЦИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
		1) антациды
		2) холинолитики
		3) H_2-блокаторы
		4) трасилол, контрикал
		5) октреотид, сандостатин
557.	**ПК 8**	ДИЕТА У БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ ПАНКРЕАТИТА В ПЕРВЫЕ 2 ДНЯ
		1) белковая
		2) углеводная
		3) жировая
		4) голод
558.	**ПК 6**	ПРИЧИНОЙ ПОЯВЛЕНИЯ ЖЕЛТУХИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ ОБЫЧНО ЯВЛЯЕТСЯ
		1) сдавление общего желчного протока головкой поджелудочной железы
		2) повышенный гемолиз
		3) реактивный гепатит
		4) присоединение желчнокаменной болезни
		5) синдром Жильбера
559.	**ПК 5**	НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) лейкоцитоз
		2) уровень аминотрансфераз крови
		3) уровень амилазы крови и мочи
		4) уровень щелочной фосфатазы
		5) гипергликемия
560.	**ПК 8**	КАКОЕ СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
		1) антациды
		2) холинолитики
		3) фамотидин
		4) трасилол

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		5) тразикор
561.	**ПК 8**	СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
		1) альмагель
		2) платифиллин
		3) фестал
		4) трасилол
		5) мезим
562.	**ПК 6**	ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ - ДИФФУЗНЫЙ ПРОЦЕСС В ПЕЧЕНИ, ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ БОЛЕЕ
		1) 3 месяцев
		2) 6 месяцев
		3) 12 месяцев
		4) 3-х лет
563.	**ПК 5**	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ХАРАКТЕРНО
		1) формирование узлов регенерации
		2) нарушение архитектоники печени
		3) образование фиброзных септ
		4) воспалительная инфильтрация портальных полей
564.	**ПК 5**	ПРИЧИНОЙ ЖЕЛТУХИ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) повышенный распад эритроцитов
		2) отек головки поджелудочной железы
		3) обтурация желчного протока камнем
		4) образование преципитатов в протоках поджелудочной железы
565.	**ПК 5**	ПОД ВЛИЯНИЕМ КАКИХ СРЕДСТВ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА УВЕЛИЧИВАЕТ СЕКРЕЦИЮ СОКА И БИКАРБОНАТОВ
		1) холецистокинина
		2) секретина
		3) атропина
		4) молока
		5) аскорбиновой кислоты
566.	**ПК 6**	ХРОНИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ПАНКРЕАТИТ НАБЛЮДАЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО
		1) при язвенной болезни
		2) при желчнокаменной болезни
		3) при постгастрорезекционном синдроме
		4) при хроническом колите
		5) при лямблиозе
567.	**ПК 8**	ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ В ДИЕТЕ
		1) углеводы
		2) белки

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		3) жиры
		4) жидкость
		5) минеральные соли
568.	**ПК 5**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТЕСТОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
		1) секретин-панкреозиминовый тест
		2) сцинтиграфия поджелудочной железы
		3) определение жира в кале
		4) все перечисленные методы
		5) ни один из перечисленных
569.	**ПК 5**	В ФАЗУ ВИРУСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
		1) HBeAg
		2) HBsAg
		3) HBcAg
		4) HCV
570.	**ПК 5**	В ФАЗУ ВИРУСНОЙ РЕПЛИКАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ВМАРКЕРОМ АКТИВНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) HBeAg
		2) HBsAg
		3) HBcAg
		4) HCV
571.	**ПК 5**	АКТИВНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
		1) выраженностью фиброза
		2) уровнем трансаминаз
		3) уровнем билирубина
		4) уровнем СОЭ
572.	**ПК 6**	СПЕЦИФИЧНЫМ СИНДРОМОМ ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) болевой
		2) диспепсический
		3) цитолитический
		4) астено-вегетативный
573.	**ПК 5**	ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ХАРАКТЕРНО
		1) повышение активности АСТ, АЛТ,
		2) повышение уровня g-глобулинов, СРБ, СОЭ
		3) повышение уровня щелочной фосфатазы, g-глютаматтранспептидазы, холестерина
		4) снижение уровня протромбина, общего белка и особенно альбуминов, холестерина
574.		ДЛЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
	ПК 5	ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ХАРАКТЕРНО
		1) повышение активности АСТ, АЛТ,
		2) повышение уровня g-глобулинов, СРБ, СОЭ
		3) повышение уровня щелочной фосфатазы, g-глютаматтранспептидазы, холестерина
		4) снижение уровня протромбина, общего белка и особенно альбуминов, холестерина
575.	**ПК 6**	МАЛОСИМПТОМНОСТЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ
		1) хронического вирусного гепатита В
		2) хронического вирусного гепатита С
		3) хронического вирусного гепатита D
		4) хронического аутоиммунного гепатита
576.	**ПК 8**	КАКОЙ ИЗ УКАЗАННЫХ ПРЕПАРАТОВ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
		1) левамизол
		2) эссенциале
		3) интерферон α
		4) лактулоза
577.	**ПК 6**	РАЗВИТИЕ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ ЧАЩЕ БЫВАЕТ ПРИ
		1) хроническом вирусном гепатите В
		2) хроническом вирусном гепатите С
		3) хроническом вирусном гепатите В+С
		4) хроническом аутоиммунном гепатите
578.	**ПК 8**	КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С ЯВЛЯЕТСЯ
		1) снижение гиперферментемии
		2) уменьшение клинических симптомов
		3) элиминация сывороточнойHDV-ДНК
		4) элиминация сывороточнойHCV-ДНК
579.	**ПК 8**	УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ
		1) гипоаммониемическое
		2) холелитолитическое
		3) противовирусное
		4) детоксицирующее
580.	**ПК 8**	АДЕМЕТИОНИН (ГЕПТРАЛ) ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ
		1) гипоаммониемическое
		2) холелитолитическое
		3) противовирусное
		4) детоксицирующее
581.	**ПК 8**	ЛАКТУЛОЗА (ДЮФАЛАК) ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ
		1) гипоаммониемическое

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) холелитолитическое
		3) противовирусное
		4) детоксицирующее
582.	**ПК 8**	ЛАМИВУДИН ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ
		1) гипоаммониемическое
		2) холелитолитическое
		3) противовирусное
		4) детоксицирующее
583.	**ПК 8**	ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ
		1) гипоаммониемическое
		2) иммуносупрессивное
		3) гепатопротективное
		4) детоксицирующее
584.	**ПК 8**	ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАКОГО ГЕПАТИТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АЗАТИОПРИН
		1) хронического вирусного гепатита В
		2) хронического вирусного гепатита С
		3) хронического вирусного гепатита D
		4) хронического аутоиммунного гепатита
585.	**ПК 8**	КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ ГЕПАТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
		1) метотрексат
		2) преднизолон
		3) интерферон α
		4) лактулоза
586.	**ПК 6**	КАКОЙ СИНДРОМ ОТЛИЧАЕТ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
		1) цитолитический
		2) холестатический
		3) портальной гипертензии
		4) диспепсический
587.	**ПК 6**	ЧТО ОТЛИЧАЕТ ПЕРВИЧНЫЙ БИЛИАРНЫЙ ЦИРРОЗ ОТ ВТОРИЧНОГО БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
		1) цитолитический синдром
		2) холестатический синдром
		3) синдром портальной гипертензии
		4) образование аутоантител к мембране клеток желчных протоков
588.	**ПК 5**	КАКОЙ МЕТОД ПОЗВОЛЯЕТ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ДИАГНОЗ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
		1) биопсия
		2) сканирование

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) компьютерная томография
		4) обследование на маркеры вирусных гепатитов
589.	**ПК 6**	КАКОЙ ИЗ ПРИЗНАКОВ НЕ ОТРАЖАЕТ ПОРТАЛЬНУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ
		1) геморрой
		2) асцит
		3) желтуха
		4) спленомегалия
590.	**ПК 5**	ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ КАКОЙ ЭТИОЛОГИИ В БИОПТАТЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ТЕЛЬЦА МАЛЛОРИ
		1) алкогольной
		2) аутоиммунной
		3) вирусной
		4) лекарственной
591.	**ПК 8**	ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ В ДИЕТЕ НУЖНО ОГРАНИЧИТЬ
		1) жиры
		2) белки
		3) углеводы
		4) минеральные соли
592.	**ПК 6**	К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ОТНОСИТСЯ
		1) асцит, спленгомегалия, «голова медузы»
		2) полиурия, гипотония, брадикардия
		3) инверсия сна, раздражительность
		4) желтуха, кожный зуд, телеангиэктазии
593.	**ПК 5**	ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПО ЧАЙЛД-ПЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
		1) билирубин, ПТИ, альбумин
		2) билирубин, трансаминазы, щелочная фосфатаза
		3) трансаминазы, фибриноген
		4) α-фетопротеин, щелочная фосфатаза
594.	**ПК 6**	КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ТЯЖЕСТИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ПО ЧАЙЛД-ПЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ
		1) спленомегалия, снижение массы тела
		2) желтуха, гепатомегалия
		3) петехии, лихорадка, гепато-спленомегалия
		4) асцит, энцефалопатия
595.	**ПК 6**	КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ГЕПАТО-РЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ
		1) олигурия, азотемия
		2) гематурия, никтурия

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) поллакиурия, полиурия
		4) протеинурия, нефротический синдром
596.	**ПК 5**	ХАРАКТЕРНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ РАКА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) повышение ПТИ
		2) повышение щелочной фосфатазы
		3) повышение γ-глутамилтранспептидазы
		4) повышение α-фетопротеина
597.	**ПК 8**	ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ ОТЕЧНО-АСЦИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА
		1) лапароцентез
		2) ограничение белка, назначение диуретиков
		3) проведение форсированного диуреза
		4) ограничение соли и жидкости, введение альбумина, назначение диуретиков
598.	**ПК 5**	НОРМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА В КРОВИ
		1) 5, 0-20, 5 мкмоль/л
		2) 0, 5-5, 0 мкмоль/л
		3) 10, 0-15, 0 мкмоль/л
		4) 20, 5-40, 1 мкмоль/л
599.	**ПК 6**	ДЛЯ НАДПЕЧЕНОЧНОЙ ЖЕЛТУХИ ХАРАКТЕРНО
		1) желтуха, кожный зуд, снижение массы тела
		2) желтуха, кожный зуд, положительный симптом Курвуазье
		3) желтуха, увеличение печени, увеличение прямого билирубина
		4) желтуха, анемия, ретикулоцитоз в крови
600.	**ПК 6**	ДЛЯ ПОДПЕЧЕНОЧНОЙ ЖЕЛТУХИ ХАРАКТЕРНО
		1) желтуха, спленомегалия, увеличение непрямого билирубина
		2) желтуха, кожный зуд, положительный симптом Курвуазье
		3) желтуха, увеличение печени, увеличение прямого билирубина
		4) желтуха, анемия, ретикулоцитоз в крови
601.	**ПК-6**	ДЛЯ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ХАРАКТЕРНО
		1) повышение активности АСТ, АЛТ, ЛДГ
		2) повышение уровня g-глобулинов, СРБ, СОЭ
		3) повышение уровня щелочной фосфатазы, g-глютаматтранспептидазы, холестерина
		4) снижение уровня протромбина, общего белка и особенно альбуминов, холестерина
602.	**ПК-6**	ДЛЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЖЕЛТУХИ ХАРАКТЕРНО
		1) желтуха, кожный зуд, снижение массы тела
		2) желтуха, кожный зуд, положительный симптом Курвуазье

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) желтуха, увеличение печени, увеличение прямого билирубина
		4) желтуха, анемия, ретикулоцитоз в крови
603.	**ПК-6**	ПРИЧИНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) холедохолитиаз
		2) стриктура Фатерова соска
		3) рак головки поджелудочной железы
		4) ничего из перечисленного
		5) все вышеназванное
604.	**ПК-6**	ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА, РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ И ДРУГИХ ОСТРЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ, ХАРАКТЕРНО
		1) повышение активности АСТ, АЛТ, ЛДГ
		2) повышение уровня ЩФ, g-глютаматтранспептидазы, повышение b-липопротеидов, гиперхолестеринемия, гипербилирубинемия
		3) снижение уровня холинэстеразы, протромбина, общего белка и особенно альбуминов, холестерина, гипербилирубинемия
		4) повышение уровня g-глобулинов, изменение белково-осадочных проб, повышение уровня иммуноглобулинов
		5) повышение уровня щелочной фосфатазы, снижение уровня холинэстеразы, повышение уровня g-глобулинов, гипербилирубинемия
605.	**ПК-6**	ПРИЗНАК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОТЛИЧИТЬ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ
		1) желтуха
		2) бугристая печень
		3) повышение уровня аминотрансфераз
		4) отсутствие в крови а-фетопротеина
		5) повышение уровня билирубина
606.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО ИМЕЕТСЯ ПОРТАЛЬНЫЙ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ СО СПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ. В АНАЛИЗЕ КРОВИ: НВ - 90Г/Л, ЭРИТРОЦИТЫ - 2, 5МЛН, ЛЕЙКОЦИТЫ - 3, 5 ТЫС, ТРОМБОЦИТЫ – 74 ТЫС. ФОРМУЛА БЕЗ ОСОБЕННОСТЕЙ. ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ
		1) гемолизом
		2) кровопотерей из расширенных вен пищевода
		3) гиперспленизмом
		4) нарушением всасывания железа
		5) синдромом холестаза
607.	**ПК-6**	ЖЕНЩИНА 35 ЛЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЖАЛОБЫ НА КОЖНЫЙ ЗУД. БОЛЬНА В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ. ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ВЫЯВЛЕНА ПЛОТНАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ ПЕЧЕНЬ, ВЫСТУПАЮЩАЯ ИЗ-ПОД КРАЯ РЕБЕРНОЙ ДУГИ НА 10СМ. БИЛИРУБИН – 96 МКМОЛЬ/Л, ПРЯМОЙ - 80 МКМОЛЬ/Л, ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА - 400 ЕД, АЛТ - 86 ЕД. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) портальный цирроз печени
		2) хронический активный гепатит

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		3) гемолитическая желтуха
		4) билиарный цирроз печени
		5) острый вирусный гепатит
608.	**ПК-6**	ГЕПАТОМЕГАЛИЯ, СПЛЕНОМЕГАЛИЯ И МЕЛЕНА ВЫЗЫВАЮТ ПОДОЗРЕНИЕ
		1) на кровоточащую язву 12-перстной кишки
		2) на кровоточащие вены пищевода при циррозе печени
		3) на тромбоз мезентериальной артерии
		4) на неспецифический язвенный колит
		5) на кровоточащие язвы желудка
609.	**ПК-6**	ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ СИНДРОМ ЦИТОЛИЗА ВЫРАЖЕН В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
		1) наследственный сфероцитоз
		2) синдром Жильбера
		3) хронический вирусный гепатит с выраженной активностью
		4) желчно-каменная болезнь
		5) цирроз печени
610.	**ПК-6**	У БОЛЬНОГО С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ УХУДШИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ: ПОЯВИЛАСЬ СОНЛИВОСТЬ, СПУТАННОЕ СОЗНАНИЕ, УСИЛИЛАСЬ ЖЕЛТУХА, УМЕНЬШИЛАСЬ В РАЗМЕРАХ ПЕЧЕНЬ, ИЗО РТА СЛАДКОВАТЫЙ ЗАПАХ. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ БОЛЬНОЙ ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ, ДЫХАНИЕ КУСМАУЛЯ, АРЕФЛЕКСИЯ. КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ РАЗВИЛОСЬ У БОЛЬНОГО
		1) холестаз
		2) печеночная кома
		3) желудочно-кишечное кровотечение
		4) портальная гипертензия
		5) гепато-ренальный синдром
611.	**ПК 10**	ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ КЛАССИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИММУНОДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) вторичный билиарный цирроз
		2) хронический высокой активности гепатит
		3) хронический минимальной активности гепатит
		4) новообразование печени
		5) ни одно из перечисленных состояний
612.	**ПК-6**	ДЛЯ СИНДРОМА ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО
		1) повышение активности АСТ, АЛТ
		2) повышение уровня g-глобулинов, СРБ, СОЭ
		3) повышение уровня щелочной фосфатазы, g-глютамилтранспептидазы, холестерина
		4) снижение уровня протромбина, общего белка и особенно альбу-

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		минов, холестерина
613.	**ПК-6**	ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
		1) вирусный гепатит в анамнезе
		2) данные гистологического исследования печени
		3) выявление в сыворотке крови австралийского антигена
		4) периодический субфебрилитет, иктеричность, боли в правом подреберье, умеренная гепатомегалия
		5) выявление в сыворотке α-фетопротеина
614.	**ПК-6**	ПОДБЕРИТЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛЬНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
		1) раннее развитие желтухи и позднее портальной гипертензии
		2) раннее поражение ЦНС
		3) раннее развитие портальной гипертензии и позднее желтухи и печеночной недостаточности
		4) наличие антимитохондриальных антител и увеличение активности ЩФ
		5) пигментация кожи и увеличение уровня железа в крови
615.	**ПК-6**	ДЛЯ КАКОГО ВИДА ЖЕЛТУХИ ХАРАКТЕРНА ТОЛЬКО ПРЯМАЯ (КОНЪЮГИРОВАННАЯ) ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ
		1) гемолитическая
		2) печеночно-клеточная
		3) механическая
		4) при внутрипеченочном холестазе
		5) при нарушении захвата и связывания билирубина
616.	**ПК-6**	ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЯМОГО И НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА
		1) наследственный сфероцитоз
		2) синдром Жильбера
		3) холедохолитиаз
		4) хронический гепатит высокой активности
		5) опухоль pancreas
617.	**ПК-6**	ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ О ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ
		1) бромсульфалеиновой пробы
		2) уровня g-глобулинов
		3) уровня аминотрансфераз
		4) уровня ЩФ
		5) уровня кислой фосфатазы
618.	**ПК-6**	ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ОТЛИЧАЕТСЯ
		1) наличием цитолитического синдрома
		2) наличием холестатического синдрома

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		3) наличием портальной гипертензии
		4) наличием синдрома холемии
		5) наличием паренхиматозной желтухи
619.	**ПК-6**	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ХАРАКТЕРНЫ ЖАЛОБЫ НА
		1) тяжесть в эпигастрии
		2) боли в правом подреберье с иррадиацией в спину
		3) горечь во рту
		4) опоясывающие боли
		5) дисфагию
620.	**ПК-6**	ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА, РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРИ ОСТРЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ, ХАРАКТЕРНО
		1) повышение активности АСТ, АЛТ, ЛДГ
		2) повышение уровня ЩФ
		3) снижение уровня протромбина
		4) изменение белково-осадочных проб
		5) положительная реакция Кумбса
621.	**ПК-6**	ГЛАВНЫМ ОТЛИЧИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТ ПРОЧИХ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) значительное увеличение печеночных ферментов
		2) гистологические изменения
		3) иммунологические показатели
		4) гепатомегалия
		5) желтуха
622.	**ПК-6**	В ДИАГНОСТИКЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ РЕШАЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) уровень альбуминов
		2) уровень билирубина
		3) тимоловая проба
		4) уровень трансаминаз
		5) ни один из перечисленных тестов
623.	**ПК-6**	КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИМПТОМОВ НАИБОЛЕЕ РАНО ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ БИЛИАРНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
		1) кровоточивость десен
		2) увеличение селезенки
		3) кожный зуд
		4) повышение АСТ и АЛТ
		5) снижение уровня холинэстеразы
624.	**ПК-10**	НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ
		1) глюкокортикоиды и липоевая кислота
		2) декарис и интерферон
		3) делагил и витамины группы В

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) глютаминовая кислота и декарис
		5) глюкокортикоиды и азатиоприн
625.	**ПК-6**	ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ О ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
		1) увеличение уровня g-глобулинов
		2) снижение уровня липопротеидов
		3) повышение ЩФ
		4) повышение уровня АСТ и АЛТ
		5) снижение уровня кислой фосфатазы
626.	**ПК-6**	АСЦИТ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ОБРАЗУЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ
		1) вторичного гиперальдостеронизма
		2) гипоальбуминемии
		3) портальной гипертензии
		4) все перечисленное
		5) ничего из перечисленного
627.	**ПК-6**	ПРИ БИЛИАРНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ НАИБОЛЕЕ РАНО ПОЯВЛЯЕТСЯ
		1) диспепсический
		2) астенический
		3) портальная гипертензия
		4) холестаз
		5) печеночная недостаточность
628.	**ПК-6**	ГЕПАТОМЕГАЛИЯ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ
		1) острых гепатитах
		2) хронических гепатитах
		3) циррозах печени
		4) болезнях накопления
		5) болезнях крови
		6) при всех вышеперечисленных состояниях
629.	**ПК-6**	ДЛЯ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА ХАРАКТЕРНО
		1) асцит, спленгомегалия, «голова медузы»
		2) анемия, тромбоцитопения
		3) инверсия сна, раздражительность
		4) желтуха, гипербилирубинемия
630.	**ПК-6**	ДЛЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЖЕЛТУХИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО
		1) повышение уровня только непрямого билирубина
		2) повышение уровня только прямого билирубина
		3) повышение уровня обеих фракций в зависимости от преобладания механизма обмена билирубина в печени
631.	**ПК-10**	НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
		1) азатиоприм

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) эссенциале
		3) интерферон α
		4) гептрал
		5) преднизолон
632.	**ПК-6**	ВИРУС ГЕПАТИТА, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО АССОЦИИРОВАННЫЙ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ
		1) HBV
		2) HCV
		3) HDV+ HBV
		4) HGV
		5) нет четкой закономерности
633.	**ПК-10**	ПРЕПАРАТ СНИЖАЮЩИЙ РЕФЛЮКС
		1) атропин
		2) метацин
		3) мотилиум
		4) гордокс
		5) папаверин
634.	**ПК-10**	В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ГИПЕРАМИЛАЗЕМИЕЙ, НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО ВКЛЮЧАТЬ
		1) баралгин
		2) трасилол (гордокс, контрикал)
		3) блокаторы H_2 -рецепторов гистамина
		4) жидкие антациды
		5) фестал
635.	**ПК-5**	К ИНДИКАТОРНЫМ ФЕРМЕНТАМ ПЕЧЕНИ ОТНОСЯТ
		1) ЛДГ, АСТ, АЛТ
		2) фруктозо-1-6-дифосфатальдолаза
		3) церулоплазмин
		4) холинэстераза
		5) урокиназа
636.	**ПК-6**	БОЛЕЗНЕННОСТЬ ПЕЧЕНИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ПРИ
		1) застойной печени
		2) острых гепатитах, хронических заболеваниях печени в период активности
		3) циррозах печени
		4) хроническом персистирующем гепатите
637.	**ПК-6**	ПРИ КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ИМЕЕТСЯ РИСК ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
		1) HBV
		2) HCV

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) HBV и HCV
638.	**ПК-5**	К МАРКЕРАМ НАРУШЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ОТНОСИТСЯ
		1) АЛТ
		2) АСТ
		3) ЛДГ
		4) щелочная фосфатаза
		5) холинэстераза
639.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ СИМПТОМ, НАБЛЮДАЕМЫЙ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
		1) отёки
		2) лейкоцитурия
		3) артериальная гипертензия
		4) протеинурия
		5) боли в поясничной области
640.	**ПК-6**	РАЗВИТИЕ ОГН ВЫЗЫВАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ, КРОМЕ
		1) сывороток
		2) вакцин
		3) яда насекомых
		4) лекарственных веществ
		5) пищевых продуктов
641.	**ПК-6**	ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА, НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННАЯ ЗАБОЛЕВАНИЮ ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
		1) до 2 лет
		2) с 2-летнего возраста и до 40 лет
		3) климактерический период
		4) период менопаузы
		5) пубертатный период
642.	**ПК-6**	ОСТРЫЙ ДИФФУЗНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ РАЗВИВАЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОСЛЕ
		1) стрептококковых инфекций
		2) острых вирусных инфекций
		3) оперативных вмешательств
		4) перенесённой инфекции мочевых путей
		5) стафилококковых инфекций
643.	**ПК-6**	БОЛИ В ОБЛАСТИ ПОЯСНИЦЫ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ
		1) с наличием конкрементов в мочевыводящей системе
		2) с набуханием почек
		3) с апостематозными изменениями паренхимы почек
		4) с нарушениями уродинамики
		5) с ишемическим инфарктом почек

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
644.	**ПК-6**	ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ
		1) повышение креатинина и мочевины крови
		2) повышение калия плазмы
		3) гиперпротеинемия
		4) повышение натрия плазмы
645.	**ПК-6**	СРЕДИ ЭКЗОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
		1) гиподинамия
		2) травматическое воздействие
		3) охлаждение
		4) лучевое поражение
		5) избыточное употребление поваренной соли с пищей
		6) амилоидоз почек
646.	**ПК-6**	УКАЖИТЕ СРОКИ ЛАТЕНТНОГО ПЕРИОДА, ПОСЛЕ КОТОРОГО ПОЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМЫ НЕФРИТА
		1) 1-2 дня
		2) 2-3 недели
		3) 2-3 месяца
		4) 10-12 часов
		5) 3-4 часа
647.	**ПК -10**	У БОЛЬНОГО, СТРАДАЮЩЕГО ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ В ОЛГИУРИЧЕСКОЙ СТАДИИ, СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ СОСТАВЛЯЕТ 200 МЛ. СКОЛЬКО ЖИДКОСТИ МОЖНО ВВОДИТЬ БОЛЬНОМУ
		1) 1500мл
		2) 200мл
		3) 500мл
		4) 700мл
		5) 2000мл
648.	**ПК-6**	ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОТЁКОВ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИОМ
		1) нижние конечности
		2) живот
		3) область поясницы
		4) лицо
		5) задняя поверхность туловища
649.	**ПК-6**	ВАРИАНТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, ВЫЯВЛЯЕМЫЙ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ
		1) гипертонический
		2) латентный
		3) гематурический

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) нефротический
		5) смешанный
650.	**ПК-6**	ПРОБА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫЯВИТЬ СНИЖЕНИЕ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ХГН
		1) проба по Нечипоренко
		2) проба Зимницкого
		3) проба Реберга-Тареева
		4) проба Аддиса-Каковского
		5) проба Амбурже
651.	**ПК-6**	ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
		1) величины суточной протеинурии
		2) уровня креатинина сыворотки крови
		3) уровня холестерина сыворотки
		4) величины канальцевой реабсорбции
		5) все неверно
652.	**ПК-6**	КЛИНИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ХГН, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЧАСТЫМ
		1) гематурический
		2) латентный
		3) нефротический
		4) гипертонический
		5) смешанный
653.	**ПК-6**	«ТРИАДА СИМПТОМОВ БРАЙТА» ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
		1) отеки, гипертонию, гематурию
		2) отеки, протеинурию, цилиндрурию
		3) протеинурию, цилиндрурию, гематурию
		4) гипертонию, протеинурию, лейкоцитурию
654.	**ПК-6**	ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЧИ
		1) олигурия и гипостенурия
		2) полиурия и гипостенурия
		3) полиурия и высокая относительная плотность мочи
		4) олигурия и высокая относительная плотность мочи
655.	**ПК-5**	«ЛИЦО НЕФРИТИКА» - ЭТО
		1) отеки на лице и цианоз кожи
		2) отеки на лице и желтушность кожи
		3) отеки на лице и бледность кожи
		4) отеки на лице и гиперемия кожи
656.	**ПК -10**	ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНАЯ СХЕМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ВКЛЮЧАЕТ

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		1) глюкокортикостероиды+цитостатики+ антикоагулянты+ дезагреганты
		2) глюкокортикостероиды+диуретики+ антикоагулянты+ фибринолитики
		3) глюкокортикостероиды+диуретики+ антикоагулянты+ гипотензивные
		4) глюкокортикостероиды+цитостатики+ диуретики+гипотензивные
657.	**ПК-6**	ВЕДУЩИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
		1) исследование микроальбуминурии
		2) биопсия почки
		3) компьютерная томография почек
		4) радиоизотопная реография
658.	**ПК-6**	ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНО
		1) оценка СКФ по формуле MDRD
		2) проба Реберга Тереева
		3) оценка протеинурии
		4) проба Зимницкого
659.	**ПК-6**	ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ВЕРНО УТВЕРЖДЕНИЕ
		1) выделяют гипертоническую форму острого гломерулонефрита
		2) синдром артериальной гипертензии связан с задержкой натрия и воды
		3) синдром артериальной гипертензии обусловлен гиперкалиемией
		4) в лечении необходимо назначение индометацина
660.	**ПК-6**	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ВЕРНО УТВЕРЖДЕНИЕ
		1) выделяют гипертоническую форму хронического гломерулонефрита
		2) синдром артериальной гипертензии связан с задержкой натрия и воды
		3) синдром артериальной гипертензии обусловлен гиперкалиемией
		4) в лечении необходимо назначение индометацина
661.	**ПК-6**	СРЕДИ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
		1) курение
		2) гиперлипидемия
		3) переохлаждение
		4) пол
662.	**ПК -10**	НЕФРОПРОТЕКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ
		1) рамиприл
		2) кларитромицин
		3) аспирин

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) цефтриаксон
663.	**ПК -10**	НЕФРОПРОТЕКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ
		1) верапамил
		2) азатиоприн
		3) циклофосфан
		4) гентамицин
664.	**ПК -10**	НАИБОЛЬШИМ НЕФРОТОКСИЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ
		1) гентамицин
		2) кларитромицин
		3) аспирин
		4) ампициллин
665.	**ПК -10**	ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
		1) латентная форма
		2) гипертоническая форма
		3) гематурическая форма
		4) нефротическая форма
666.	**ПК-6**	ПРИЗНАКОМ РАЗВИТИЯ ХПН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕ-РУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) артериальная гипертензия
		2) повышение уровня креатинина крови
		3) олигурия
		4) выраженная протеинурия
667.	**ПК-6**	ПРИЗНАКОМ РАЗВИТИЯ ОПН ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФ-РИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) артериальная гипертензия
		2) отеки
		3) олигурия
		4) выраженная протеинурия
668.	**ПК-6**	СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФ-РИТА
		1) рези при мочеиспускании
		2) моча цвета «мясных помоев»
		3) артериальная гипотензия
		4) гиперлипидемия
669.	**ПК-6**	МОРФОЛОГИЧЕСКИ ПРИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМ (ПО-ДОСТРОМ) ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ХАРАКТЕРНО
		1) мембранозный гломерулонефрит
		2) гломерулонефрит «с полулуниями»
		3) мезангиопролиферативный гломерулонефрит
		4) гломерулонефрит с минимальными изменениями

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
670.	**ПК-6**	КАКАЯ ФОРМА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ БОЛЕЗНИ БЕРЖЕ
		1) нефротическая
		2) гематурическая
		3) гипертоническая
		4) смешанная
671.	**ПК-5**	СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ПРОБЕ РЕБЕРГА-ТАРЕЕВА В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ
		1) 80-120 мл\мин
		2) 60-100 мл\мин
		3) 40-80 мл\мин
		4) 10-20 мл\мин
672.	**ПК-6**	СРЕДИ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
		1) переохлаждение
		2) гиподинамия
		3) избыточное употребление поваренной соли
		4) травматическое повреждение
673.	**ПК -10**	ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
		1) наличие нефротического синдрома без выраженной гематурии и гипертонии
		2) артериальная гипертония
		3) отеки
		4) макрогематурия
674.	**ПК-6**	ХРОНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ОБУСЛОВЛЕНО
		1) наличием хронических очагов инфекции
		2) сенсибилизацией организма к возбудителю
		3) постоянной выработкой аутоантител к антигенам базальной мембраны клубочков
		4) развитием бактериемии
675.	**ПК-5**	ПРОБА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫЯВИТЬ СНИЖЕНИЕ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
		1) проба по Нечипоренко
		2) проба Зимницкого
		3) проба Реберга-Тареева
		4) проба Аддиса-Каковского
676.	**ПК-6**	БЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ ПОЧЕК ОКАЗЫВАЕТ
		1) субтропический влажный климат

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) континентальный климат
		3) муссонный климат
		4) сухой и теплый климат
677.	**ПК -10**	ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК
		1) №7
		2) №9
		3) №5
		4) №10
678.	**ПК-6**	МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ - ЭТО ПОТЕРЯ БЕЛКА С МОЧОЙ В ОБЪЕМЕ
		1) 30-300 мг\сут
		2) 30-300 мг\мл
		3) 0, 1-1, 0 г/сут
		4) 0, 1-1, 0 г/л
679.	**ПК-6**	В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
		1) иммунное воспаление базальной мембраны
		2) отложение комплексов "антиген - антитело" на фильтрующей поверхности клубочка
		3) образование капиллярных микротромбов
		4) ни один из перечисленных признаков
		5) все перечисленные факторы
680.	**ПК-6**	САМЫМ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХГН ЯВЛЯЕТСЯ
		1) артериальная гипертензия
		2) гиперкалиемия
		3) повышение уровня креатинина в крови
		4) олигоурия
		5) протеинурия
681.	**ПК-6**	В КАКОМ ПЕРИОДЕ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ГИПОКАЛИЕМИЯ
		1) начальном
		2) олигурическом
		3) начальном полиурическом
		4) позднем полиурическом
		5) восстановительном
682.	**ПК-6**	У МУЖЧИНЫ 32 ЛЕТ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ОБНАРУЖЕНО: АД - 170/120 ММ РТ. СТ., ОТЕКОВ НЕТ, В МОЧЕ: 2, 5 Г/СУТКИ БЕЛКА, ЭРИТРОЦИТЫ - 6-10 В П/ЗР., МНОГО ЗЕРНИСТЫХ ЦИЛИНДРОВ, КРЕАТИНИН - 88 МКМ/Л. ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ
		1) нефротический синдром
		2) хронический пиелонефрит
		3) хронический гломерулонефрит, латентная форма
		4) хронический гломерулонефрит, гипертоническая форма

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		5) ХПН
683.	**ПК-6**	САМЫМ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХПН ЯВЛЯЕТСЯ
		1) артериальная гипертензия
		2) гиперкалиемия
		3) повышение уровня креатинина крови
		4) олигурия
		5) анемия
684.	**ПК -10**	ОСНОВНОЕ ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
		1) нефротический синдром
		2) артериальная гипертензия
		3) почечная недостаточность
		4) гематурия
		5) профилактика обострений
685.	**ПК-6**	ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ШОКЕ СВЯЗАНА СО СЛЕДУЮЩИМ
		1) гиперволемией
		2) гипотонией
		3) гиперкалиемией
		4) протеинурией
		5) азотемией
686.	**ПК-6**	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО НЕФРИТА В СТАДИИ ХПН ХАРАКТЕРНО
		1) анемия
		2) олигоанурия
		3) артериальная гипертония
		4) изогипостенурия
		5) все перечисленное
687.	**ПК-6**	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАКОГО ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА
		1) величины протеинурии
		2) клубочковой фильтрации
		3) креатинина сыворотки
		4) холестерина сыворотки
		5) канальцевой реабсорбции воды
688.	**ПК-6**	ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ СПРАВЕДЛИВЫ УТВЕРЖДЕНИЯ
		1) в начальном периоде артериальная гипертензия развивается у всех больных
		2) назначение индометацина является обязательным
		3) наиболее частой формой болезни является нефротическая
		4) все перечисленное верно

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		5) все перечисленное неверно
689.	**ПК-6**	ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ
		1) гиперволемия, задержка натрия и воды
		2) гиперренинемия
		3) повышение концентрации простагландинов
		4) спазм сосудов
690.	**ПК -10**	К СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТНОСЯТСЯ
		1) глюкокортикоиды
		2) дезагреганты
		3) цитостатики
		4) антикоагулянты
		5) гипотензивные
691.	**ПК -10**	ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ СРОЧНОГО ГЕМОДИАЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) метаболический ацидоз
		2) анурия
		3) анасарка
		4) высокая гиперкалиемия
		5) тяжелая артериальная гипертензия
692.	**ПК-6**	ЧТО НЕ ВХОДИТ В КЛАССИЧЕСКУЮ ТРИАДУ СИМПТОМОВ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
		1) отеки
		2) одышка
		3) гипертония
		4) гематурия
693.	**ПК -10**	ПРИ КАКОМ МОРФОЛОГИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ХГН НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНЫ КОРТИКОСТЕРОИДЫ
		1) фибропластическом
		2) мезангикпиллярном
		3) фокальном сегментарном гломерулосклерозе
		4) мембранозном
		5) минимальных изменениях клубочков
694.	**ПК -10**	НАЗОВИТЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
		1) отеки
		2) наличие нефротического синдрома без выраженной гематурии и гипертонии
		3) артериальная гипертония
		4) макрогематурия
695.	**ПК-6**	МЕХАНИЗМ, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ИНФЕКЦИ-

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		ОННОГО ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
		1) иммунокомплексный
		2) антительный (антитела к базальной мембране почечных клубочков)
		3) токсическое повреждение почки
		4) дистрофические изменения почек
696.	**ПК-6**	ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
		1) эклампсия
		2) сердечная астма и отёк лёгких
		3) геморрагический инсульт
		4) ничего из перечисленного
		5) все перечисленное
697.	**ПК-6**	ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) лейкоцитурия
		2) протеинурия
		3) гематурия
		4) цилиндрурия
		5) бактериурия
698.	**ПК-6**	ПРОБА РЕБЕРГА-ТАРЕЕВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ВЫЯВЛЯЕТ
		1) мочевой осадок (эритроциты, белок, цилиндры, лейкоциты)
		2) количественное содержание форменных элементов в 1 мл мочи
		3) состояние клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции
		4) иммунологические гуморальные и клеточные нарушения
699.	**ПК-6**	ПРОБА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫЯВИТЬ СНИЖЕНИЕ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ХГН
		1) проба по Нечипоренко
		2) проба Зимницкого
		3) проба Реберга-Тареева
		4) проба Аддиса-Каковского
		5) проба Амбурже
700.	**ПК-6**	ХРОНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ОБУСЛОВЛЕНО
		1) наличием хронических очагов инфекции
		2) сенсибилизацией организма к возбудителю
		3) подавлением иммунной системы
		4) постоянной выработкой аутоантител к антигенам базальной мембраны клубочков
		5) развитием бактериемии
701.	**ПК-6**	ВАРИАНТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ САМЫМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ И БЫСТРО ПРИВОДЯЩИЙ К РАЗВИТИЮ ХПН

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) гематурический
		2) латентный
		3) смешанный
		4) гипертонический
		5) нефротический
702.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА - ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФ-РИТ
		1) исследование мочи
		2) изотопная ренография
		3) экскреторная урография
		4) сцинтиграфия
		5) пункционная биопсия почки
703.	**ПК -10**	ПРИ «ПУЛЬС-ТЕРАПИИ» ПРИМЕНЯЕТСЯ
		1) индометацин
		2) преднизолон
		3) азатиоприн
		4) делагил
		5) дипиридамол
704.	**ПК -10**	ПУЛЬС-ТЕРАПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ
		1) впервые выявленном ХГН
		2) протеинурии, превышающей 3 г/сут.
		3) высокой активности ГН
		4) начинающейся ХПН
		5) высоком уровне холестерина в крови
705.	**ПК-6**	ВАРИАНТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, КОТОРЫЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ И БЫСТРО ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ХПН
		1) мембранозный
		2) мезангиопролиферативный
		3) фокально-сегментарный
		4) экстракапиллярный с полулуниями
706.	**ПК-6**	В КАКОЙ СРОК ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ РАЗВИ-ВАЕТСЯ ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
		1) 10-12 дней
		2) 3-4 дня
		3) 1 неделя
		4) 1месяц
		5) 2 месяца
707.	**ПК-6**	ИЗМЕНЕНИЯ МОЧИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕ-РУЛОНЕФРИТА
		1) пиурия
		2) дизурия

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) лейкоцитурия
		4) протеинурия
708.	**ПК-6**	ЛАТЕНТНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ КЛИНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
		1) артериальной гипертензией
		2) отеками
		3) протеинурией
		4) выраженной гематурией
709.	**ПК -10**	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СВОДЯТСЯ
		1) к своевременному переливанию цельной крови
		2) к длительному и аккуратному введению препаратов железа внутривенно
		3) к ликвидации причины железодефицита, т. е. источника кровотечения - язвы, опухоли, воспаления, если это возможно
		4) к назначению препаратов железа перорально на длительный срок
		5) верно 3) и 4)
		6) верно все
710.	**ПК -10**	БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ С ХРОНИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ СЛЕДУЕТ
		1) принимать внутрь препарат железа до родов и весь период кормления грудью
		2) включить в диету красную рыбу, гранаты и морковь
		3) перелить эритроцитарную массу перед родами
		4) сделать 10 внутривенных инъекций FerrumLek
		5) верно все
711.	**ПК-6**	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОЗРЕВАТЬ НАЛИЧИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
		1) мишеневидные эритроциты
		2) микросфероцитоз
		3) снижение цветового показателя
		4) макроцитоз
		5) отсутствие ретикулоцитов
712.	**ПК-6**	ДЛЯ ЖДА ХАРАКТЕРЕН СЛЕДУЮЩИЙ СИНДРОМ
		1) геморрагический
		2) синдром недостаточности антител
		3) синдром гиперспленизма
		4) сидеропенический
		5) нейтропенический
713.	**ПК -10**	ПРИ ЖДА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
		1) цитостатиками
		2) гормонами
		3) препаратами железа

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		4) переливания эритроцитарной массы
		5) стимуляторами гемопоэза (вит. B_{12})
714.	**ПК-6**	ВЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА
		1) запасы железа одинаково легко восполняются при назначении препаратов железа парентерально и внутрь
		2) в состав гемоглобина входит менее трети общего количества железа в организме
		3) освобождающееся из разрушенных эритроцитов железо главным образом выделяется с мочой
		4) за сутки всасывается в среднем 10 - 15 мг железа
		5) при беременности суточная потребность в железе возрастает
715.	**ПК-6**	ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО
		1) гипохромия, микроцитоз, сидеробласты в стернальном пунктате
		2) гипохромия, микроцитоз, мишеневидные эритроциты
		3) гипохромия, микроцитоз, повышение железосвязывающей способности сыворотки
		4) гипохромия, микроцитоз, положительная десфераловая
716.	**ПК-6**	ДЛЯ ДИАГНОЗА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАТИВНЫМ
		1) снижение гематокрита
		2) снижение цветового показателя
		3) снижение гемоглобина
		4) снижение количества лейкоцитов
		5) гипербилирубинемия
717.	**ПК-6**	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
		1) цветовой показатель 0, 7
		2) гипохромия эритроцитов
		3) микроцитоз
		4) анизо-пойкилоцитоз
		5) гиперсегментация ядер нейтрофилов
718.	**ПК-6**	НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) кровопотеря
		2) глистная инвазия
		3) врожденный дефицит железа
		4) авитаминоз
		5) недостаточное поступление железа с пищей
719.	**ПК-6**	НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛЕЗА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОРГАНИЗМОМ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА, СОДЕРЖИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПРОДУКТЕ
		1) печени
		2) гранатах

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		3) рыбе
		4) телятине
		5) орехах
720.	**ПК-6**	ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
		1) имеется сидеробластоз костного мозга
		2) осмотическая резистентность эритроцитов снижена
		3) лечебный эффект дает назначение сырой печени
		4) снижен цветовой показатель, что сочетается с микроцитозом
		5) все перечисленное верно
721.	**ПК -10**	ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА В ДОСТАТОЧНОЙ ДОЗЕ НА 7 - 10 ДНЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ
		1) нормализация Нв
		2) восстановление содержания сывороточного железа
		3) исчезновение бледности и сухости кожи
		4) ретикулоцитарный криз
		5) улучшение аппетита
722.	**ПК-6**	ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО
		1) тошнота, рвота
		2) жжение в языке
		3) афтозный стоматит
		4) тяга к острой пище
723.	**ПК-6**	ОСНОВНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ВСАСЫВАЕТСЯ
		1) в желудке
		2) в нисходящем отделе ободочной кишки
		3) в двенадцатиперстной и тощей кишках
		4) в подвздошной кишке
		5) верно: 1) и 3)
724.	**ПК-5**	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИНДРОМА АНЕМИИ
		1) количество эритроцитов
		2) количество ретикулоцитов
		3) цветовой показатель
		4) уровень гемоглобина
		5) показатель гематокрита
725.	**ПК -10**	ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА ПАРЕНТЕРАЛЬНО ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЕ
		1) синдрома нарушенного всасывания
		2) беременности
		3) уровне гемоглобина менее 90 г/л
		4) интенсивных занятий спортом

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
726.	**ПК -10**	ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА
		1) малоэффективны
		2) плохо всасываются
		3) окрашивают кал в черный цвет
		4) высокоаллергенны
727.	**ПК -10**	ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА
		1) малоэффективны
		2) плохо всасываются
		3) окрашивают кал в черный цвет
		4) высокоаллергенны
728.	**ПК -10**	ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
		1) сорбифер дурулес
		2) венофер
		3) тотема
		4) рекомбинантный эритропоэтин
729.	**ПК -10**	ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН
		1) сорбифер дурулес
		2) венофер
		3) тотема
		4) рекомбинантный эритропоэтин
730.	**ПК-5**	СОДЕРЖАНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО ЖЕЛЕЗА В НОРМЕ
		1) 100-120 г/л
		2) 120-140 г/л
		3) 12, 5-30, 4 мкмоль/л
		4) 20, 5-50, 5 мкмоль/л
731.	**ПК-6**	ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРЕН УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА
		1) 50-70г/л
		2) 70-90 г/л
		3) 90-110 г/л
		4) 110-130 г/л
732.	**ПК-6**	ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРЕН УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА
		1) 50-70г/л
		2) 70-90 г/л
		3) 90-110 г/л
		4) 110-130 г/л
733.	**ПК-6**	ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРЕН УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА
		1) 50-70г/л

№ П/П	Код компетенций	Тестовые вопросы
		2) 70-90 г/л
		3) 90-110 г/л
		4) 110-130 г/л
734.	**ПК-6**	УКАЖИТЕ СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА
		1) извращение вкуса и обоняния
		2) головокружение
		3) «ватность ног»
		4) ангулярный стоматит
735.	**ПК-6**	УКАЖИТЕ СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
		1) извращение вкуса и обоняния
		2) головокружение
		3) «ватность ног»
		4) мелькание мушек перед глазами
736.	**ПК-6**	СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
		1) всех видов анемий
		2) железодефицитной анемии
		3) мегалобластной анемии
		4) гемолитической анемии
737.	**ПК-6**	ДЛЯ ЖДА ХАРАКТЕРЕН СЛЕДУЮЩИЙ СИНДРОМ
		1) геморрагический
		2) синдром недостаточности антител
		3) синдром гиперспленизма
		4) сидеропенический
		5) нейтропенический
738.	**ПК-5**	ЖЕЛЕЗО ЗАПАСОВ НАХОДИТСЯ В ОРГАНИЗМЕ В ВИДЕ
		1) трансферрина
		2) ферритина
		3) миоглобина
		4) гемоглобина
739.	**ПК-5**	НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ
		1) определение уровня ферритина
		2) определение уровня гемоглобина
		3) расчет цветового показателя
		4) определение морфологии эритроцитов
740.	**ПК-6**	ПРИЧИНОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ АЛИМЕНТАРНОГО ГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ
		1) недостаточное употребление молочных продуктов
		2) недостаточное употребление овощей и фруктов
		3) вегетарианство

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		4) высокая физическая активность
741.	**ПК-6**	К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОТНОСИТСЯ
		1) макроцитоз
		2) мишеневидные эритроциты
		3) гипохромия
		4) тени Боткина-Гумпрехта
742.	**ПК-6**	ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПОКАЗАНО
		1) стернальная пункция
		2) проба Кумбса
		3) определение «филадельфийской хромосомы»
		4) определение общей железосвязывающей способности сыворотки
743.	**ПК-6**	СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОБУСЛОВЛЕН
		1) дефицитом тканевых ферментов (цитохромов)
		2) уменьшением синтеза миоглобина
		3) снижением гемоглобина
		4) снижением эритроцитов
744.	**ПК-6**	СПЕЦИФИЧНЫМ СИМПТОМОМ СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ
		1) обмороки
		2) мелькание мушек перед глазами
		3) дисфагия
		4) фуникулярный миелоз
745.	**ПК -10**	К ПРЕПАРАТАМ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ОТНОСИТСЯ
		1) сорбифер дурулес
		2) фенюльс
		3) рекомбинантный эритропоэтин
		4) мальтофер
746.	**ПК -10**	К ПРЕПАРАТАМ ДВУХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ОТНОСИТСЯ
		1) сорбифер дурулес
		2) феррум лек
		3) рекомбинантный эритропоэтин
		4) мальтофер
747.	**ПК-6**	НА ЭКГ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НАБЛЮДАЕТСЯ
		1) появление зубца Q
		2) депрессия сегмента ST
		3) отрицательный зубец Т
		4) высокоамплитудный зубец Т
748.	**ПК -10**	ВСАСЫВАНИЕ ЖЕЛЕЗА УСКОРЯЕТ

№ П/П	Код компе-тенций	Тестовые вопросы
		1) кальций
		2) холестерин
		3) фосфорная кислота
		4) аскорбиновая кислота
749.	**ПК-6**	К СИМПТОМАМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОТНОСИТ-СЯ
		1) бледно- желтушный оттенок кожных покровов
		2) спленомегалия
		3) ангулярный стоматит
		4) пятна Рота
750.	**ПК -10**	СОРБИФЕР-ДУРУЛЕС СОДЕРЖИТ В СОСТАВЕ 1 ТАБЛЕТКИ
		1) 100 мг железа (II)
		2) 50 мг железа (II)
		3) 10 мг железа (III)
		4) 100 мг железа (III)

3.2 Эталоны ответов к тестовым вопросам по модулю «Факультетская терапия»

№ п/п	ответ
1.	4
2.	3
3.	1
4.	4
5.	1
6.	2
7.	1
8.	2
9.	1
10.	1
11.	3
12.	2
13.	4
14.	4
15.	4
16.	3
17.	3
18.	2
19.	1
20.	2
21.	3
22.	3
23.	2
24.	1
25.	3
26.	2
27.	4
28.	1
29.	1
30.	5
31.	4
32.	2
33.	3
34.	1
35.	2
36.	2
37.	3
38.	4
39.	3
40.	3
41.	5
42.	1
43.	4
44.	2
45.	4
46.	2
47.	1
48.	4

№ п/п	ответ
49.	2
50.	3
51.	4
52.	3
53.	2
54.	4
55.	4
56.	5
57.	3
58.	3
59.	2
60.	3
61.	4
62.	4
63.	2
64.	4
65.	4
66.	3
67.	4
68.	1
69.	1
70.	4
71.	1
72.	1
73.	2
74.	2
75.	1
76.	4
77.	2
78.	3
79.	4
80.	1
81.	1
82.	2
83.	3
84.	2
85.	4
86.	3
87.	1
88.	4
89.	3
90.	4
91.	4
92.	1
93.	3
94.	2
95.	2
96.	4

№ п/п	ответ
97.	3
98.	1
99.	2
100.	1
101.	3
102.	4
103.	3
104.	5
105.	3
106.	1
107.	2
108.	3
109.	1
110.	3
111.	3
112.	2
113.	1
114.	3
115.	4
116.	3
117.	1
118.	3
119.	2
120.	4
121.	1
122.	3
123.	3
124.	2
125.	5
126.	4
127.	2
128.	2
129.	5
130.	3
131.	2
132.	2
133.	2
134.	3
135.	2
136.	1
137.	3
138.	3
139.	5
140.	4
141.	2
142.	1
143.	2
144.	3

№ п/п	ответ
145.	2
146.	1
147.	4
148.	4
149.	1
150.	2
151.	4
152.	4
153.	2
154.	3
155.	1
156.	3
157.	4
158.	2
159.	3
160.	2
161.	1
162.	4
163.	3
164.	3
165.	1
166.	2
167.	3
168.	1
169.	1
170.	2
171.	2
172.	3
173.	4
174.	2
175.	2
176.	1
177.	2
178.	1
179.	1
180.	3
181.	2
182.	2
183.	3
184.	1
185.	3
186.	2
187.	2
188.	1
189.	3
190.	4
191.	2
192.	1

3.2 Эталоны ответов к тестовым вопросам по модулю «Факультетская терапия»

№ п/п	ответ
193.	2
194.	1
195.	4
196.	3
197.	2
198.	1
199.	3
200.	4
201.	5
202.	3
203.	4
204.	5
205.	3
206.	1
207.	1
208.	3
209.	1
210.	3
211.	1
212.	1
213.	4
214.	2
215.	5
216.	2
217.	2
218.	5
219.	3
220.	5
221.	4
222.	3
223.	5
224.	2
225.	1
226.	3
227.	2
228.	5
229.	2
230.	4
231.	5
232.	4
233.	2
234.	1
235.	4
236.	5
237.	4
238.	3
239.	2
240.	2

№ п/п	ответ
241.	3
242.	1
243.	3
244.	2
245.	4
246.	2
247.	4
248.	1
249.	3
250.	1
251.	1
252.	3
253.	3
254.	3
255.	1
256.	3
257.	4
258.	2
259.	3
260.	5
261.	1
262.	2
263.	4
264.	2
265.	3
266.	4
267.	5
268.	5
269.	4
270.	3
271.	4
272.	2
273.	2
274.	4
275.	3
276.	2
277.	1
278.	3
279.	3
280.	4
281.	2
282.	4
283.	3
284.	2
285.	3
286.	3
287.	4
288.	3

№ п/п	ответ
289.	5
290.	4
291.	3
292.	3
293.	4
294.	2
295.	3
296.	1
297.	1
298.	2
299.	1
300.	3
301.	4
302.	1
303.	2
304.	1
305.	2
306.	1
307.	1
308.	4
309.	1
310.	2
311.	4
312.	3
313.	2
314.	2
315.	4
316.	4
317.	2
318.	2
319.	3
320.	2
321.	2
322.	5
323.	5
324.	2
325.	2
326.	2
327.	4
328.	1
329.	4
330.	2
331.	2
332.	1
333.	2
334.	2
335.	4
336.	4

№ п/п	ответ
337.	5
338.	2
339.	2
340.	2
341.	4
342.	2
343.	3
344.	4
345.	4
346.	1
347.	4
348.	5
349.	2
350.	2
351.	2
352.	4
353.	3
354.	3
355.	3
356.	4
357.	3
358.	2
359.	2
360.	2
361.	2
362.	3
363.	1
364.	1
365.	3
366.	3
367.	1
368.	1
369.	3
370.	1
371.	4
372.	1
373.	4
374.	1
375.	1
376.	4
377.	4
378.	4
379.	4
380.	4
381.	3
382.	1
383.	2
384.	1

3.2 Эталоны ответов к тестовым вопросам по модулю «Факультетская терапия»

№ п/п	ответ
385.	4
386.	2
387.	4
388.	5
389.	2
390.	1
391.	2
392.	4
393.	1
394.	3
395.	4
396.	1
397.	1
398.	4
399.	3
400.	1
401.	1
402.	1
403.	2
404.	1
405.	1
406.	3
407.	2
408.	3
409.	4
410.	1
411.	4
412.	1
413.	3
414.	5
415.	4
416.	2
417.	2
418.	1
419.	4
420.	1
421.	4
422.	1
423.	3
424.	1
425.	2
426.	4
427.	3
428.	5
429.	2
430.	2
431.	2
432.	1

№ п/п	ответ
433.	4
434.	2
435.	4
436.	2
437.	4
438.	3
439.	5
440.	4
441.	1
442.	1
443.	3
444.	2
445.	2
446.	3
447.	2
448.	1
449.	1
450.	1
451.	2
452.	3
453.	4
454.	3
455.	2
456.	2
457.	4
458.	4
459.	3
460.	1
461.	4
462.	1
463.	5
464.	3
465.	2
466.	5
467.	2
468.	2
469.	1
470.	4
471.	4
472.	4
473.	3
474.	1
475.	1
476.	4
477.	2
478.	3
479.	1
480.	3

№ п/п	ответ
481.	1
482.	4
483.	1
484.	2
485.	3
486.	2
487.	2
488.	1
489.	3
490.	4
491.	1
492.	1
493.	4
494.	2
495.	2
496.	5
497.	4
498.	2
499.	3
500.	2
501.	3
502.	5
503.	3
504.	2
505.	3
506.	4
507.	1
508.	3
509.	1
510.	2
511.	4
512.	2
513.	4
514.	4
515.	2
516.	2
517.	2
518.	1
519.	2
520.	3
521.	1
522.	2
523.	5
524.	4
525.	4
526.	4
527.	4
528.	5

№ п/п	ответ
529.	3
530.	4
531.	1
532.	3
533.	2
534.	3
535.	1
536.	4
537.	1
538.	1
539.	3
540.	1
541.	3
542.	2
543.	1
544.	3
545.	4
546.	4
547.	2
548.	4
549.	4
550.	3
551.	5
552.	3
553.	3
554.	3
555.	1
556.	5
557.	4
558.	1
559.	3
560.	4
561.	4
562.	2
563.	4
564.	2
565.	2
566.	2
567.	2
568.	5
569.	2
570.	1
571.	2
572.	3
573.	1
574.	2
575.	2
576.	3

3.2 Эталоны ответов к тестовым вопросам по модулю «Факультетская терапия»

№ п/п	ответ
577.	3
578.	4
579.	2
580.	4
581.	1
582.	3
583.	3
584.	4
585.	1
586.	3
587.	4
588.	1
589.	3
590.	1
591.	2
592.	3
593.	1
594.	4
595.	1
596.	4
597.	4
598.	1
599.	4
600.	2
601.	3
602.	3
603.	5
604.	1
605.	4
606.	3
607.	4
608.	2
609.	3
610.	2
611.	2
612.	4
613.	2
614.	3
615.	3
616.	4
617.	4
618.	3
619.	4
620.	1
621.	2
622.	5
623.	3
624.	5

№ п/п	ответ
625.	3
626.	4
627.	4
628.	6
629.	2
630.	3
631.	3
632.	2
633.	3
634.	5
635.	1
636.	2
637.	3
638.	5
639.	4
640.	5
641.	2
642.	1
643.	2
644.	1
645.	3
646.	2
647.	4
648.	4
649.	2
650.	3
651.	1
652.	2
653.	1
654.	4
655.	3
656.	1
657.	2
658.	3
659.	2
660.	1
661.	3
662.	1
663.	1
664.	1
665.	4
666.	2
667.	3
668.	2
669.	2
670.	2
671.	1
672.	1

№ п/п	ответ
673.	1
674.	3
675.	3
676.	4
677.	1
678.	1
679.	5
680.	3
681.	4
682.	4
683.	3
684.	1
685.	2
686.	5
687.	1
688.	5
689.	1
690.	5
691.	4
692.	2
693.	5
694.	2
695.	1
696.	5
697.	2
698.	3
699.	3
700.	4
701.	3
702.	5
703.	2
704.	3
705.	4
706.	1
707.	4
708.	3
709.	3
710.	1
711.	3
712.	4
713.	3
714.	5
715.	3
716.	2
717.	5
718.	1
719.	4
720.	4

№ п/п	ответ
721.	4
722.	3
723.	3
724.	4
725.	1
726.	3
727.	4
728.	2
729.	4
730.	3
731.	2
732.	1
733.	3
734.	2
735.	1
736.	2
737.	4
738.	2
739.	1
740.	3
741.	3
742.	4
743.	1
744.	3
745.	4
746.	1
747.	3
748.	4
749.	3
750.	1

3.3 Тестовые вопросы по модулю «Профессиональные болезни»

Код компетенции	**Вопрос: Укажите один правильный ответ**
ПК-2	1. СУБЪЕКТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ, КРОМЕ 1) фонда медицинского страхования 2) страховой организации 3) органа управления здравоохранением 4) медицинского учреждения 5) гражданина
ПК-2	2. СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ФОРМИРУЮТСЯ ЗА СЧЕТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ, КРОМЕ 1) средств местной администрации 2) средств государственных предприятий и учреждений 3) средств частных и коммерческих предприятий и учреждений 4) средств граждан 5) все перечисленное
ПК-2	3. ПРАВОВОЙ БАЗОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КРОМЕ 1) закона РФ "О медицинском страховании граждан" 2) дополнения и изменения к закону "О медицинском страховании" 3) закона "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" 4) основ законодательства об охране здоровья граждан 5) все перечисленное
ПК-2	4. В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВХОДЯТ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КРОМЕ 1) перечня, видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет средств ОМС 2) стоимости различных видов медицинской помощи 3) организаций добровольного медицинского страхования 4) видов платных медицинских услуг 5) дифференциации подушевой стоимости медицинской помощи в зависимости от пола и возраста
ПК-2	5. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 1) медицинской помощи больным на дому 2) лечебно-диагностического обслуживания населения 3) организации работы по пропаганде здорового образа жизни 4) профилактической работы 5) экспертизы временной нетрудоспособности
ПК-2	6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ ПАЦИЕНТОВ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КРОМЕ 1) анализа интенсивности потока больных по времени 2) нормирования деятельности врачей 3) правильной организации графика приема врачей 4) четкой работы регистратуры 5) дисциплины персонала

ПК-2	7. К НЕОБХОДИМЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ РАБОЧИХ, СОСТОЯЩИХ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 1) предварительных (при поступлении на работу) 2) периодических (в период работы) 3) целевых (на выявление заболеваний определенной нозологии) 4) после снятия с соответствующей группы инвалидности 5) все перечисленное
ПК-2	8. ОСНОВАНИЕМ ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КРОМЕ 1) диплома об окончании высшего или среднего (фармацевтического) заведения 2) сертификата 3) лицензии 4) свидетельства об окончании курсов усовершенствования 5) все перечисленное
ПК-2	9. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА (ИЛИ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ) ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 1) всегда 2) в особых случаях 3) не всегда 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ПК-2	10. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЦЕНТРА ПРОФПАТОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ 1) установление связи заболеваний с профессией 2) оздоровление больных, инвалидов вследствие профзаболеваний 3) оздоровление лиц из группы риска 4) разработка и проведение мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости и трудопотерь по болезни и инвалидности 5) все перечисленное
ПК-2	11. В ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ПРОФПАТОЛОГИИ ВХОДЯТ 1) диагностика профзаболеваний, лечение, реабилитация и наблюдение больных профессиональными заболеваниями и инвалидов вследствие профзаболеваний 2) контроль за качеством предварительных и периодических медицинских осмотров и реализацией профилактических и оздоровительных рекомендаций в соответствии с актом заключительной комиссии, а также проведение периодического медицинского осмотра в условиях стационара по расширенной программе с выдачей рекомендаций лечебно-профилактического характера 3) организационно-методическое руководство по вопросам профпатологии в территории, разработка методических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных с профессиональными заболеваниями и инвалидов вследствие профзаболеваний 4) учет и углубленный анализ профессиональной заболеваемости и инвалидности вследствие профзаболеваний, разработка совместно с администрацией территории и органами санэпиднадзора мероприятий

	по их профилактике и снижению 5) все перечисленное
ПК-2	12. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРОФПАТОЛОГИИ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ЯВЛЯЮТСЯ 1) подготовка предложений по формированию базовой инфраструктуры системы оказания медицинской помощи работающему населению и экспертизе связи заболевания с профессией 2) проведение научных исследований по совершенствованию методов для создания информативного комплекса показателей диагностики, эффективности реабилитации и профилактики профессиональной патологии 3) совершенствование медицинской статистической учетной и отчетной документации по профессиональным заболеваниям, трудопотерям вследствие временной и стойкой утраты трудоспособности с использованием компьютерного программного обеспечения, анализ деятельности профессиональной заболеваемости, инвалидности и смертности вследствие профессиональной патологии и несчастных случаев на производстве 4) рассмотрение особо сложных случаев профессиональных заболеваний 5) все перечисленное
ПК-2	13. ЦЕЛЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ, МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ – 1) определение соответствия состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе 2) предупреждение общих заболеваний 3) предупреждение профессиональных заболеваний 4) все перечисленное 5) ничего из перечисленного
ПК-2	14. ЦЕЛЬЮ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ 1) динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами профессиональных вредностей и неблагоприятных условий труда 2) своевременное выявление начальных признаков профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска 3) выявление общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов 4) своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников 5) все перечисленное

ПК-2	15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА РАБОТУ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ВЫДАЕТ 1) санитарный врач по гигиене труда ТО Роспотребнадзора 2) работодатель 3) узкие специалисты 4) профпатолог 5) все перечисленное
ПК-2	16. СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПМО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 1) врач ТО роспотребнадзора 2) участковый терапевт 3) инженер по технике безопасности 4) главный инженер предприятия 5) главный врач ЛПО
ПК-2	17. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА О ПРОВЕДЕНИИ ПМО ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 1) ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ; 2) ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ; 3) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА; 4) ВРАЧ ТО РОСПОТРЕБНАДЗОРА; 5) ЦЕХОВОЙ ВРАЧ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 2 и 3 3) если верно 3 и 4 4) если верно 4 и 5 5) если верно 1 и 5
ПК-2	18. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВХОДЯТ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 1) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, представленная ТО Роспотребнадзора 2) копия трудовой книжки 3) выписка из амбулаторной карты с указанием обращаемости за период работы 4) данные периодических медицинских осмотров 5) все перечисленное
ПК-2	19. СПЕЦИАЛИСТАМ КАКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДАНО ПРАВО ПЕРВИЧНОЙ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ С ПРОФЕССИЕЙ 1) пульмонолог территориальной поликлиники, семейный врач 2) федеральный и территориальные центры профпатологии 3) территориальный врач профпатолог 4) участковый терапевт 5) кандидаты и доктора медицинских наук, работающие в высших учебных заведениях медицинского профиля
ПК-2	20. КАКИМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ 1) приказом № 275 2) приказом № 286 3) приказом № 83 4) приказом № 320н 5) верно 3) и 4)

ПК-2	21. КАКИМ ДОКУМЕНТОМ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ, ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ 1) приказом № 286 2) приказом № 280 3) приказом № 320н 4) приказом № 83 5) верно 3) и 4)
ПК-2 ПК-5	22. ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ 1) флюорография органов грудной клетки 2) рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции 3) рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ПК-2	23. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ ВРЕДНЫХ ПРОФЕССИЙ В ЦЕНТРАХ ПРОФПАТОЛОГИИ 1) один раз в пять лет 2) один раз в три года 3) один раз в год 4) по показаниям 5) все вышеперечисленное
ПК-2	24. КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ И ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ 1) ТО Роспотребнадзора 2) работодатель 3) профсоюзная организация предприятия 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ПК-2 ПК-5 ПК-6	25. ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМ ИЛИ ПАРАЗИТАРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЛУЖИТ 1) трудовая книжка 2) выписка из истории болезни 3) карта эпидемиологического обследования 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ПК-2	26. ВСЕ ЛИЦА С ВЫЯВЛЕННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ У 1) лечащего врача 2) врача-специалиста по профилю заболевания 3) врача-профпатолога 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное

ПК-2	27. КТО НЕСЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ОБОСНОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 1) работодатель 2) лечебно-профилактическая организация 3) лечащий врач 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ПК-2	28. ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОФПАТОЛОГИИ КАК КЛИНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ 1) тесная связь с гигиеной труда 2) тесная связь с коммунальной гигиеной, гигиеной питания, атмосферного воздуха, экологией 3) связь с общей патологией 4) интегрирующий характер дисциплины 5) все перечисленное
ПК-2	29. К ГРУППЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 1) развившиеся у лиц, проживающих вблизи промышленных предприятий, загрязняющих атмосферный воздух 2) перечисленные в Перечне профессиональных заболеваний, утвержденном МЗ и СР РФ 3) развившиеся по пути на работу или с работы 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ПК-2	30. К ФАКТОРАМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ 1) химические и биологические 2) промышленные аэрозоли 3) физические 4) перенапряжение отдельных органов и систем 5) все перечисленное
ПК-2 ПК-6	31. К ФАКТОРАМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ: 1) ХИМИЧЕСКИЕ; 2) КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ; 3) ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ; 4) СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ; 5) ФИЗИЧЕСКИЕ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 3 и 4 5) если верно 1, 3 и 5
ПК-2 ПК-6	32. К КАТЕГОРИИ СОБСТВЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ: 1) АНТРАКОЗ; 2) ЭКЗЕМА; 3) ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ; 4) ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ; 5) ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 3, 4 4) если верно 4, 5 5) если верно 1, 4

ПК-2 ПК-5 ПК-6	33. К КАТЕГОРИИ ОБЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 1) бронхиальной астмы 2) дерматита 3) полиневропатии 4) силикоза 5) нейросенсорной тугоухости
ПК-2	34. ДИАГНОЗ ОСТРОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕЮТ ПРАВО УСТАНОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 1) поликлиника 2) медико-санитарная часть 3) городская больница 4) центр профпатологии 5) все перечисленное
ПК-2	35. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ УСЛОВИЙ ТРУДА СОСТАВЛЯЕТ 1) администрация предприятия 2) представитель профкома предприятия 3) инспектор по технике безопасности 4) санитарный врач по гигиене труда ТО Роспотребнадзора 5) участковый терапевт
ПК-2	36. ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ВРАЧОМ, ВЫЯВИВШИМ ИЛИ ЗАПОДОЗРИВШИМ ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (ОТРАВЛЕНИЕ), ОТСЫЛАЕТСЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОР В ТЕЧЕНИЕ 1) 6 часов: 2) 12 часов 3) 24 часа 4) 48 часов 5) 72 часа
ПК-2	37. ИЗВЕЩЕНИЕ О ХРОНИЧЕСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ (ОТРАВЛЕНИИ) ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТСЫЛАЕТСЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОР В ТЕЧЕНИЕ 1) 24 часа 2) 48 часов 3) 72 часа 4) 7 дней 5) 1 месяца
ПК-2	38. КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ИЛИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ) ДОЛЖЕН РАССЛЕДОВАТЬСЯ 1) администрацией предприятия 2) комиссией по расследованию профессионального заболевания 3) инспектором по технике безопасности 4) участковым терапевтом 5) санитарным врачом по гигиене труда

ПК-2	39. КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ) ПОДЛЕЖИТ РАССЛЕДОВАНИЮ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1) 24 часа 2) 48 часов 3) 72 часа 4) 7 дней 5) 1 месяца
ПК-2	40. КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ) ПОДЛЕЖИТ РАССЛЕДОВАНИЮ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1) 24 часа 2) 48 часов 3) 72 часа 4) 10 дней 5) 1 месяца
ПК-2	41. ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ТЕРАПИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 1) этиологический 2) патогенетический 3) симптоматический 4) все перечисленные 5) ни один из перечисленных
ПК-2	42. К МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ 1) инженерно-технические 2) санитарно-гигиенические 3) медико-биологические 4) организационные 5) все перечисленные
ПК-2	43. ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ УЧИТЫВАЮТСЯ 1) нозологическая форма заболевания 2) степень функциональных нарушений 3) характер течения и прогноз 4) профессия больного, его возраст, стаж по вредности, образование, квалификация, наличие второй профессии, установка больного на продолжение работы 5) все перечисленное
ПК-2	44. ФОРМАМИ ЭКСПЕРТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ 1) процент утраты профессиональной трудоспособности 2) группа инвалидности 3) временной нетрудоспособности 4) реабилитационные мероприятия 5) лечебные мероприятия

ПК-2 ОПК-9 ПК-5 ПК-6	45. БРОНХИОЛИТ ВЫЗЫВАЕТ 1) фторокись бериллия 2) сернистый газ 3) хлористый водород 4) селен 5) хромовый ангидрид
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	46. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ЧЕРТАМИ ТОКСИЧЕСКОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ЭНДОБРОНХИТ; 2) ПЕРИОДИЧНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ; 3) ГИПОКСЕМИЯ; 4) ГИПЕРКАПНИЯ; 5) РАЗВИТИЕ НА ФОНЕ ПОЛНОГО ЗДОРОВЬЯ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 1 и 3 3) если верно 2 и 3 4) если верно 2 и 4 5) если верно 2 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	47. ЛЕЧЕБНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ; 2) СОСУДОУКРЕПЛЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ; 3) ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ; 4) НЕЙРОЛЕПТИКИ; 5) ХОЛИНОЛИТИКИ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 1 и 3 3) если верно 2 и 3 4) если верно 3 и 4 5) если верно 4 и 5]
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	48. К ФОРМАМ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) отдаленных последствий острой интоксикации 2) осложнения острой вирусной пневмонии 3) истинной хронической интоксикации 4) токсический альвеолит 5) токсико-пылевой бронхит
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	49. ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ВЕЩЕСТВАМИ УДУШАЮЩЕ-РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ВАЗОМОТОРНЫЙ РИНИТ; 2) ХРОНИЧЕСКАЯ ГИПОПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ; 3) ПОЛИКИСТОЗ ЛЕГКИХ; 4) ХРОНИЧЕСКИЙ ТОКСИЧЕСКИЙ БРОНХИТ; 5) ТОКСИЧЕСКИЙ ПНЕВМОСКЛЕРОЗ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 2 и 3 3) если верно 3 и 4 4) если верно 3 и 5 5) если верно 4 и 5

ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	50. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ТИПАМИ НАРУШЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ 1) рестриктивный тип 2) обструктивный тип 3) смешанный тип нарушений 4) не один из перечисленных 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	51. ХРОМ ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, КРОМЕ 1) первичного раздражающего 2) сенсибилизирующего 3) гемолитического 4) канцерогенного 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	52. ПОРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА ОТ ДЕЙСТВИЯ ХРОМА ПРОХОДИТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СТАДИИ, КРОМЕ 1) воспаления и ожога 2) поверхностного изъязвления 3) глубокой язвы 4) перфорации носовой перегородки 5) рубцевания перфоративного отверстия
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	53. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ФЛЮОРОЗА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЖАЛОБЫ, КРОМЕ 1) болей в костях 2) диспепсических расстройств 3) резей при мочеиспускании 4) кашля 5) слабости, недомогания
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	54. ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ФЛЮОРОЗА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ В КОНТАКТЕ С ФТОРИСТЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 1) да, возможно 2) нет, невозможно 3) отмечается регрессия 4) отмечается прогрессия 5) верно 1, 4
ПК-2	55. ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПУТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГОВ 1) индивидуальный 2) коллективный 3) и тот, и другой 4) по данным аналогичных отраслей 5) семейный

ПК-2 ОПК-9 ПК-5 ПК-6	56. К НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННОМУ УМЕНЬШЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА У ЖЕНЩИН ОТНОСИТСЯ 1) 114-116 г/л 2) 117-120 г/л 3) 121-124 г/л 4) 125-142 г 5) все перечисленное
ОПК-9	57. АНЕМИЯ У ЖЕНЩИН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЭРИТРОЦИТОВ И ГЕМОГЛОБИНА 1) эритроциты – 3, 9х10^{12}/л, гемоглобин - 108 г/л 2) эритроциты – 4, 0х10^{12}/л, гемоглобин - 130 г/л 3) эритроциты – 3, 9х10^{12}/л, гемоглобин - 120 г/л 4) эритроциты – 3, 9х$10^{12/}$л, гемоглобин - 110г/л 5) эритроциты – 3, 9х10^{12}/л, гемоглобин - 115 г/л
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	58. СНИЖЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ТРОМБОЦИТОВ СЧИТАЕТСЯ 1) 300х10^{9}/л 2) 200х10^{9}/л 3) 190х10^{9}/л 4) 150х10^{9}/л 5) все перечисленное
ОПК-9	59. ПРИ ПРИЕМЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ ПРОИСХОДИТ 1) снижение количества эритроцитов 2) увеличение количества эритроцитов 3) количество эритроцитов не изменяется 4) возникает физиологическая эритроэмия 5) верно 1, 4
ОПК-9	60. ЛЕЙКОПЕНИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ 1) хронической интоксикации свинцом 2) хронической интоксикации сернистым газом 3) хронической интоксикации бензолом 4) хронической интоксикации оксидом углерода 5) хронической интоксикации ртутью
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	61. ЛЕЙКОПЕНИЯ НЕРЕДКО НАБЛЮДАЕТСЯ 1) при тиреотоксикозе 2) при неврозе 3) при постгеморрагической анемии 4) верно 1, 2 5) верно 1, 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	62. ПРИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ НАБЛЮДАЕТСЯ 1) гемоцитопения 2) лейкоцитоз 3) тромбоцитоз 4) эозинофилия 5) тромбоцитопения

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	63. К ПАТОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ, ОТНОСЯТСЯ: 1) СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ КРОВИ;2) ГЕМОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС;3) ХРОНИЧЕСКАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ СВИНЦОМ;4) ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ НАГНОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРОТЕКАЮЩИЙ С ЛИХОРАДКОЙ; 5) РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 1) если верно 1 и 2 2) если верно 1 и 3 3) если верно 1 и 4 4) если верно 1 и 5 5) если верно 2 и 4]
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	64. ЭКЗОЭРИТРОЦИТАРНЫМИ ФАКТОРАМИ ВЫЗЫВАЮЩИМИ ГЕМОЛИЗ, МОГУТ БЫТЬ: 1) ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ; 2) ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ, НЕСОВМЕСТИМОЙ ПО РЕЗУС-ФАКТОРУ; 3) ГЕМОГЛОБИНОПАТИИ; 4) ДЕФИЦИТ ПИРУВАТКИНАЗЫ; 5) НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 2 и 3 3) если верно 3 и 4 4) если верно 4 и 5 5) если верно 1 и 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	65. СУБЪЕКТИВНЫМИ СИМПТОМАМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ПИКАХЛОРОТИКА; 2) ЗУД КОЖНЫХ ПОКРОВОВ; 3) ЛОМКОСТЬ НОГТЕЙ, ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС; 4) ЗАЕДЫ; 5) БОЛИ В ПРАВОЙ ПОДВЗДОШНОЙ ОБЛАСТИ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 1, 3 и 4 3) если верно 2, 3 и 4 4) если верно 3, 4 и 5 5) если верно 1, 2 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	66. ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЖЕЛЕЗО, ЦЕЛЕСООБРАЗЕН 1) до приема пищи 2) во время приема пищи 3) после еды 4) независимо от времени приема пищи 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	67. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ОСТРЫЙ МИЕЛОБЛАСТОЗ; 2) АНЕМИЯ; 3) ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТОЗ; 4) ГЕМОФИЛИЯ; 5) ТАЛАССЕМИЯ 1) если верно 1, 2 2) если верно 1, 3 3) если верно 2, 3] 4) если верно 3, 4 5) если верно 4, 5

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	68. САМЫМ ТИПИЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГРУППЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЯДОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ РАССТРОЙСТВА БИОСИНТЕЗА ПОРФИРИНОВ И ГЕМА, ЯВЛЯЕТСЯ 1) бензол 2) окись углерода 3) свинец 4) анилин 5) мышьяковистый водород
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	69. ОСТРЫЙ ГЕМОЛИЗ ВЫЗЫВАЕТ 1) хлорбензол 2) фенилгидразин 3) хлорорганические пестициды 4) свинец 5) хром
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	70. ХРОНИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КРОВИ ВЫЗЫВАЮТ 1) свинец 2) мышьяковистый водород 3) бензол и его гомологи 4) верно 1, 3 5) верно 1, 2
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	71. К ТИПУ "СПИРТА" ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ: 1) ХЛОРОФОРМ; 2) МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ; 3) АЦЕТОН; 4) БЕНЗОЛ; 5) ТОЛУОЛ 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 3, 4 4) если верно 4, 5 5) если верно 1, 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	72. ОСНОВНЫМИ СИСТЕМАМИ, ПОРАЖАЕМЫМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ АРОМАТИЧЕСКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ: 1) КРОВЬ; 2) ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ; 3) НЕРВНАЯ СИСТЕМА; 4) ПОЧКИ; 5) ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН 1) если верно 1, 2 2) если верно 1, 3 3) если верно 2, 3 4) если верно 2, 4 5) если верно 2, 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	73. ВЫСОКОЙ ЛЕТУЧЕСТЬЮ ОБЛАДАЮТ: 1) ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ; 2) БУТИЛОВЫЙ СПИРТ; 3) ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ; 4) БЕНЗИН; 5) НИТРОПАРАФИНЫ 1) если верно 1, 2 2) если верно 1, 3 3) если верно 2, 3 4) если верно 3, 4 5) все перечисленное

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	74. К ТИПУ "БЕНЗОЛА И ХЛОРОФОРМА" ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАСТВОРИТЕЛИ: 1) ДИХЛОРЭТАН; 2) ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД; 3) АЦЕТОН; 4) БУТИЛОВЫЙ СПИРТ; 5) ТОЛУОЛ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 1, 2 и 4 3) если верно 1, 2 и 5 4) если верно 2, 3 и 4 5) если верно 2, 3 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	75. ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПОРАЖЕНИЕ КРОВИ, ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ТОЛУОЛ; 2) ДИХЛОРЭТАН; 3) ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ; 4) ТРИХЛОРЭТИЛЕН; 5) ХЛОРБЕНЗОЛ 1) если верно 1, 2 2) если верно 1, 3 3) если верно 1, 4 4) если верно 1, 5 5) если верно 2, 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	76. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ДЕПРЕССИЮ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ 1) хлорбензол 2) мышьяковистый водород 3) свинец 4) монооксид углерода 5) гидроперекись изопропилбензола
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	77. К ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ОСТРОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ 1) удушающее 2) наркотическое 3) миелотоксическое 4) гипоксическое 5) гемолитическое
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	78. ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ТОЛУОЛОМ НАБЛЮДАЮТСЯ: 1) ЭРИТРОЦИТОПЕНИЯ; 2) ЛЕЙКОПЕНИЯ; 3) РЕТИКУЛОЦИТОЗ; 4) УСКОРЕНИЕ СОЭ; 5) ЛЕЙКОЦИТОЗ 1) если верно 1, 2 2) если верно 1, 3 3) если верно 2, 3 4) если верно 3, 4 v 5) если верно 4, 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	79. ОПТИМАЛЬНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ЛЕГКИХ ФОРМ ИНТОКСИКАЦИИ БЕНЗОЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ: 1) ГЕМОСТИМУЛЯТОРОВ; 2) ПОДВОДНОГО МАССАЖА; 3) САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ; 4) ВИТАМИНОТЕРАПИИ; 5) СОСУДОУКРЕПЛЯЮЩИХ СРЕДСТВ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 4 и 5 5) если верно 1, 2 и 4

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	80. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ БЕНЗОЛОМ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ГОЛОВНАЯ БОЛЬ; 2) КАШЕЛЬ С МОКРОТОЙ; 3) ПРИСТУПЫ ОСТРЫХ БОЛЕЙ В ЖИВОТЕ; 4) АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ; 5) АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТОНИЯ 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 1, 4 4) если верно 1, 5 5) если верно 3, 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	81. К ПРОМЫШЛЕННЫМ ЯДАМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ЛЕЙКОЗ, ОТНОСЯТСЯ 1) бериллий 2) свинец 3) бензол 4) ртуть 5) марганец
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	82. ХАРАКТЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОСТРЫХ БЕНЗОЛЬНЫХ ЛЕЙКОЗОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ЛИХОРАДКА; 2) ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 3) ИНТАКТНОСТЬ ОРГАНОВ ЛИМФОПОЭЗА; 4) ЛЕЙКОПЕНИЧЕСКАЯ ИЛИ АЛЕЙКЕМИЧЕСКАЯ КАРТИНА КРОВИ; 5) АНЕМИЯ 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 3, 4 4) если верно 3, 5 5) если верно 4, 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	83. ПРИМЕРНЫМИ СРОКАМИ КОНТАКТА С БЕНЗОЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЮТСЯ 1) 6 месяцев 2) 1-3 года 3) 3-5 лет 4) более 5 лет 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	84. К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА, ОТНОСЯТСЯ: 1) ГЛЮКОЗА С ВИТАМИНОМ С; 2) СЕРНОКИСЛАЯ МАГНЕЗИЯ; 3) ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ; 4) МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ; 5) ЦИТОХРОМ С 1) если верно 1 и 2 2) если верно 2 и 3 3) если верно 3 и 4 4) если верно 4 и 5 5) если верно 3 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	85. СТЕПЕНЬ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА (ЛЕГКАЯ, СРЕДНЯЯ, ТЯЖЕЛАЯ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 1) процентным содержанием карбоксигемоглобина в крови 2) выраженностью изменений окраски кожных покровов 3) сохранностью сознания 4) уровнем артериального давления 5) частотой пульса

ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	86. ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА ПОРАЖАЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 1) системы крови 2) центральной нервной системы 3) сердечно-сосудистой системы 4) эндокринной системы 5) системы дыхания
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	87. К ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РЕЦИДИВУ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАТЕЛЯМИ, ОТНОСЯТСЯ: 1) ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ; 2) КУРЕНИЕ; 3) ГОРЯЧАЯ ВАННА ИЛИ ДУШ; 4) ТРАВМА; 5) ОХЛАЖДЕНИЕ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 2 и 3 3) если верно 3 и 4 4) если верно 4 и 5 5) если верно 1 и 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	88. ИНТОКСИКАЦИИ МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАТЕЛЯМИ ПРОТЕКАЮТ В ВИДЕ 1) острой формы 2) хронической формы 3) и того, и другого 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	89. ОСНОВНЫМИ ПУТЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ 1) органы дыхания 2) органы пищеварения 3) кожа 4) верно 1, 2 5) верно 1, 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	90. ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАТЕЛЯМИ ПОРАЖАЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ, КРОМЕ 1) системы крови 2) центральной нервной системы 3) гепатобилиарной системы 4) эндокринной системы 5) мочевыделительной системы
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	91. ОСНОВНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ РАКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕКОТОРЫХ МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ (АМИНОСОЕДИНЕНИЙ БЕНЗОЛА: БЕНЗИДИНА, А- И В-НАФТИЛАМИН 1), ЯВЛЯЮТСЯ 1) легкие 2) печень 3) желудок 4) кишечник 5) мочевой пузырь

ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	92. К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ЛЕЧЕБНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МЕТГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАТЕЛЯМИ ОТНОСЯТСЯ 1) оксигенотерапия 2) карбоген 3) метиленовый синий 4) глюкоза с аскорбиновой кислотой 5) все перечисленное
ОПК-9	93. ПРИ КОМПЕНСИРОВАННОМ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 1) лейкопения 2) лейкоцитоз 3) эритроцитоз 4) ретикулоцитоз 5) тромбоцитопения
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	94. ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МЫШЬЯКОВИСТЫМ ВОДОРОДОМ ПОРАЖАЮТСЯ: 1) ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ; 2) КРОВЬ; 3) КОСТНО-СУСТАВНАЯ СИСТЕМА; 4) ОРГАН ЗРЕНИЯ; 5) ПЕЧЕНЬ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 1 и 3 3) если верно 1 и 4 4) если верно 2 и 4 5) если верно 2 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	95. ОСТРУЮ ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ АНЕМИЮ ВЫЗЫВАЕТ 1) мышьяковистый водород 2) свинец 3) бензол 4) монооксид углерода 5) анилин
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	96. ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ХЛОРИРОВАННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 1) миелотоксическое 2) гипоксическое 3) гепатотропное 4) удушающее 5) гемолитическое
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	97. ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ МЫШЬЯКОВИСТЫМ ВОДОРОДОМ НЕ ПОРАЖАЮТСЯ 1) кровь 2) нервная система 3) печень 4) органы дыхания 5) почки

ОПК-9 ПК-2	98. ПРАВИЛЬНЫМ ЭКСПЕРТНЫМ РЕШЕНИЕМ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МЫШЬЯКОВИСТЫМ ВОДОРОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ 1) заболевание профессиональное. Подлежит направлению во МСЭ для установления группы инвалидности по профессиональному заболеванию 2) заболевание профессиональное. На своей прежней работе трудоспособен. 3) заболевание профессиональное. Может приступать к прежней работе. Нуждается в динамическом наблюдении. 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	99. ПРОЯВЛЕНИЕМ ОБЩЕТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЫШЬЯКОВИСТОГО ВОДОРОДА ЯВЛЯЮТСЯ: 1) РЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ; 2) ТОКСИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ; 3) ОБЩЕКАПИЛЛЯРНЫЙ ПАРАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС; 4) ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ; 5) ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ПОЛИНЕВРОПАТИЯ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 2, 3 и 5 4) если верно 3, 4 и 5 5) если верно 1, 3 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	100. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ 1) дискинезия желчевыводящих путей 2) бескаменный холецистит 3) желчнокаменная болезнь 4) холестатический гепатоз 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	101. О СИНДРОМЕ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГЕПАТОТРОПНЫХ ЯДОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 1) повышение активности сывороточных трансаминаз 2) повышение уровня непрямой фракции билирубина 3) изменение показателей осадочных проб 4) повышение холестерина 5) снижение альбуминов
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	102. О НАЧАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ХОЛЕСТАЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 1) повышение уровня прямой фракции билирубина 2) увеличение активности фермента щелочной фосфатазы 3) повышение активности фермента АЛТ 4) не один из перечисленных 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	103. СОЧЕТАНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С КАТАРАКТОЙ ВОЗМОЖНО ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ 1) свинцом 2) тринитротолуолом 3) фосфором 4) анилином 5) четыреххлористым углеродом

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	104. ТОКСИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ВОЗНИКАЕТ НА ФОНЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ КРОВИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 1) дихлорэтана 2) фосфора 3) бензола 4) фосфороорганических пестицидов 5) метилметакрилата
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	105. К ПРОИЗВОДСТВАМ, НА КОТОРЫХ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВРЕДНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РТУТЬ, ОТНОСЯТСЯ: 1) ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД; 2) ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; 3) МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ; 4) ТЕРМОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД; 5) МАСТЕРСКАЯ КИП 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 1, 3 и 4 3) если верно 1, 4 и 5 4) если верно 3, 4 и 5 5) если верно 1, 3 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	106. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ПУТЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ РТУТИ В ОРГАНИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ 1) ингаляционный 2) пищеварительный тракт 3) кожные покровы 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	107. ОСНОВНЫМ "ДЕПО" РТУТИ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 1) ПОЧКИ; 2) ЛЕГКИЕ; 3) ВОЛОСЫ; 4) ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ; 5) ПЕЧЕНЬ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 1 и 3 3) если верно 1 и 5 4) если верно 3 и 5 5) если верно 2 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	108. РТУТЬ ВЫВОДИТСЯ ИЗ ОРГАНИЗМА 1) почками 2) кишечником 3) слюнными железами 4) потом 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	109. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ РТУТЬЮ ВКЛЮЧАЕТ: 1) ТЕТАЦИН КАЛЬЦИЯ; 2) УНИТИОЛ; 3) ГЕКСЕНАЛ; 4) ГИПОСУЛЬФИТ НАТРИЯ; 5) ХРОМОСМОН 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 3, 4 4) если верно 4, 5 5) если верно 2, 4

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	110. ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ РТУТЬЮ ОТМЕЧАЕТСЯ 1) гипофункция щитовидной железы 2) гиперфункция щитовидной железы 3) функция щитовидной железы не нарушается 4) ни один из перечисленных 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	111. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ РТУТЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ; 2) ТРЕМОР; 3) НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ; 4) КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН; 5) АТРОФИЯ МЫШЦ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 2 и 4 5) если верно 1, 2 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	112. К ПРОИЗВОДСТВАМ, В КОТОРЫХ МАРГАНЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВРЕДНОСТЬЮ, НЕ ОТНОСЯТСЯ 1) электродный завод 2) элементный завод 3) ферросплавный завод 4) электроламповый завод 5) сталелитейный завод
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	113. ПРИ СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ МАРГАНЕЦ НАХОДИТСЯ В ВИДЕ 1) пыли 2) газа 3) аэрозоля 4) в любом из перечисленных состояний 5) ни один из перечисленных
ОПК-9 ПК-5	114. К ТОКСИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ МАРГАНЦА ОТНОСЯТСЯ 1) гепатотропное 2) гематотропное 3) нейротропное 4) остеотропное 5) нефротропное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	115. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, С КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ МАРГАНЦЕВЫЙ ПАРКИНСОНИЗМ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) атеросклероза сосудов головного мозга 2) бокового амиотрофического склероза 3) энцефалита в отдаленном периоде 4) состояния после острой интоксикации монооксидом углерода 5) все перечисленное

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	116. НАИБОЛЕЕ АДЕКВАТНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ МАРГАНЦЕВОГО ПАРКИНСОНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ 1) реовазография 2) электромиография 3) электроэнцефалография 4) верно 1, 2 5) все перечисленное
ПК-2 ПК-5 ПК-6	117. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ РАБОТЕ В КОНТАКТЕ С МАРГАНЦЕМ ПОМИМО МАРГАНОТОКСИКОЗА, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) литейной лихорадки 2) хронического бронхита 3) пневмокониоза 4) бронхиальной астмы 5) все перечисленное
ПК-5 ПК-6	118. К ПРОИЗВОДСТВАМ, НА КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЕТСЯ ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ, ЭТИЛОВАЯ ЖИДКОСТЬ И ЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН, НЕ ОТНОСЯТСЯ 1) бензосмесительные станции 2) литейные цеха 3) нефтебазы 4) автозаправочные станции 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	119. ПУТЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА В ОРГАНИЗМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) ингаляционного 2) через кожные покровы 3) через желудочно-кишечный тракт 4) через слизистую оболочку глаз 5) верно 1, 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	120. КЛИНИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦОМ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) НЕВРАСТЕНИЧЕСКИЙ; 2) ПОЛИНЕВРОПАТИИ; 3) ЭКСТРАПИРАМИДНЫЙ; 4) ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ; 5) АСТЕНО-ВЕГЕТАТИВНЫЙ 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 3, 4 4) если верно 4, 5 5) если верно 1, 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	121. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗОВ ЯВЛЯЮТСЯ 1) психо-эмоциональные факторы 2) химические вещества 3) физические факторы 4) инфекционные агенты 5) одинаково часто все перечисленные

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	122. К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ, ОТНОСЯТСЯ 1) механическое воздействие 2) воздействие низких и высоких температур 3) различные виды лучистой энергии (проникающие и непроникающие излучения) 4) воздействие электрическим током 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	123. К ИНФЕКЦИОННЫМ АГЕНТАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ, ОТНОСЯТСЯ 1) бактерии 2) грибы 3) вирусы 4) простейшие 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	124. ОБЛИГАТНЫМИ РАЗДРАЖИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 1) концентрированные растворы минеральных кислот 2) органические кислоты 3) щелочи 4) соли тяжелых и щелочных металлов 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	125. ФАКУЛЬТАТИВНЫМИ РАЗДРАЖИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 1) слабые растворы кислот и щелочей 2) органические растворители 3) смазочные масла и охлаждающие эмульсии 4) цианистые соединения 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	126. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕРМАТОЗ ОТ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ ВОЗНИКАЕТ 1) немедленно после контакта 2) вскоре после контакта 3) через некоторое время после однократного контакта 4) после продолжительного контакта в процессе работы 5) в любые сроки
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	127. К НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ 1) полимеры 2) соли тяжелых металлов 3) медикаменты 4) фосфорорганические и хлорорганические пестициды 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	128. ВЕЩЕСТВА СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ВЫЗЫВАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 1) контактного дерматита 2) аллергического дерматита] 3) экземы 4) крапивницы 5) токсидермии

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	129. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗОВ НЕ ХАРАКТЕРНА СЛЕДУЮЩАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ ОЧАГОВ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ 1) участки кожи, непосредственно соприкасающиеся с раздражителем 2) кисти, предплечья 3) лицо, шея 4) крупные складки кожи 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	130. ТЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗОВ ОБЫЧНО 1) прогрессирующее 2) регрессирующее 3) волнообразное 4) ремиссии после прекращения контакта 5) рецидивы в период отсутствия контакта
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	131. ОЖОГ, ВЫЗВАННЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КИСЛОТОЙ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 1) СУХИМ СТРУПОМ; 2) ЧЕТКОЙ ГРАНИЦЕЙ; 3) ОТСУТСТВИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ПЕРИФЕРИИ И В ГЛУБИНУ; 4) МЯГКИМ СТРУПОМ; 5) НЕЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 3 и 5 5) если верно 2, 3 и 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	132. ОЖОГ, ВЫЗВАННЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ЩЕЛОЧЬЮ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 1) СУХИМ СТРУПОМ; 2) МЯГКИМ РЫХЛЫМ СТРУПОМ; 3) ЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ; 4) НЕЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ; 5) ПОСТЕПЕННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НЕКРОЗА ВГЛУБЬ И ПО ПЕРИФЕРИИ 1) если верно 1, 3 и 5 2) если верно 2, 3 и 5 3) если верно 2, 4 и 5 4) если верно 1, 4 и 5 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	133. ТОКСИДЕРМИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПОПАДАНИИ АЛЛЕРГЕНА: 1) НА БОЛЬШИЕ УЧАСТКИ КОЖНОГО ПОКРОВА; 2) ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ; 3) ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ; 4) ВАЖНО КОЛИЧЕСТВО АЛЛЕРГЕНА, А НЕ ПУТЬ ЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ОРГАНИЗМ; 5) ВАЖНА СТЕПЕНЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ, А НЕ КОЛИЧЕСТВО И ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ АЛЛЕРГЕНА 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 1, 3 4) если верно 1, 4 5) если верно 1, 5

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	134. ТОКСИДЕРМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 1) бурной воспалительной реакцией кожи 2) большой распространенностью 3) быстрым регрессом после прекращения контакта с аллергеном и рецидивом при возобновлении его 4) нарушением общего состояния 5) всем перечисленным
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	135. МАСЛЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ ВОЗНИКАЮТ ЧАЩЕ 1) у мужчин 2) у женщин 3) одинаково часто у мужчин и у женщин 4) все перечисленное 5) ни одно из перечисленных
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	136. МАСЛЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ 1) на лице 2) на местах контакта со смазочными маслами 3) избирательной локализации нет 4) а и б 5) ни одно из перечисленных
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	137. СОЛНЕЧНЫЙ ДЕРМАТИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 1) скрытого периода продолжительностью несколько часов 2) скрытого периода в 1-2 дня 3) локализации на открытых участках, подвергшихся воздействию солнечных лучей 4) воспалительных изменений кожи 5) нарушения общего состояния в виде повышения температуры, головной боли, тошноты, слабости, нарушения сна и аппетита
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	138. ПОВЕРХНОСТНАЯ ТРИХОФИТИЯ И МИКРОСПОРА МОГУТ ТРАКТОВАТЬСЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 1) у медицинских работников и лаборантов, обслуживающих больных этими микозами 2) у парикмахеров 3) у работников вивариев, зоопарков 4) у животноводов 5) верно 1, 2
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	139. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ У ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ, КРОМЕ 1) работников производства антибиотиков 2) работников кондитерских пищевых предприятий 3) работников фруктово-консервных предприятий 4) зубных врачей 5) лаборантов медицинских лабораторий, производящих исследования на кандидоз

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	140. ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗОВ ВКЛЮЧАЕТ 1) технологические мероприятия 2) санитарно-технические мероприятия 3) санитарно-гигиенические мероприятия 4) индивидуальные средства защиты 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	141. ОПАСНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИНКА ВОЗМОЖНО 1) при добыче цинка 2) при резке (электро- и газосваркой) оцинкованных труб 3) при использовании оцинкованной посуды 4) при использовании цинка как строительного материала 5) при электросварочных работах со стальными конструкциями
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	142. ДЕЙСТВИЕ ЦИНКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 1) острую интоксикацию 2) хроническую интоксикацию 3) подострую интоксикацию 4) верно 2, 3 5) верно 1, 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	143. КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ (ЦИНКОВОЙ) ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЮТСЯ 1) озноб и резкий подъем температуры 2) сладковатый металлический вкус во рту 3) недомогание 4) головная боль 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	144. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, С КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ЦИНКОВУЮ ЛИХОРАДКУ, ОТНОСЯТСЯ 1) ОРВИ 2) грипп 3) малярия 4) все перечисленные 5) ни одно из перечисленных
ПК-5 ПК-6	145. К СИНТЕТИЧЕСКИМ ПОЛИМЕРАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 1) смол 2) пластмасс 3) синтетических волокон 4) растворимых соединений металлов 5) каучука
ПК-5 ПК-6	146. В СОСТАВ ПЛАСТМАСС ВХОДЯТ ВСЕ, КРОМЕ 1) смол 2) наполнителей 3) соединений свинца 4) пластификаторов 5) отвердителей

ПК-5 ПК-6	147. В СОСТАВ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ ВХОДЯТ ВСЕ, КРОМЕ 1) эпихлоргидрина 2) резорцина 3) дифенилолпропана 4) хлорпрена 5) отвердителей
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	148. К ДЕЙСТВИЯМ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 1) общетоксического 2) кожно-резорбтивного 3) раздражающего 4) мутогенного 5) сенсибилизирующего
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	149. ОСНОВНЫМИ ПУТЯМИ ВОЗМОЖНОГО ПОПАДАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ОРГАНИЗМ ЯВЛЯЮТСЯ 1) кожа 2) органы дыхания 3) желудочно-кишечный тракт 4) верно 1, 2, 3 5) верно 1, 2
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	150. ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ В ГРУППУ ПЕСТИЦИДОВ ВХОДЯТ 1) хлорорганические соединения 2) фосфорорганические соединения 3) ртутьорганические соединения 4) перитроиды 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	151. НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ ОСТРЫХ ИНТОКСИКАЦИЙ ПЕСТИЦИДАМИ ВОЗМОЖНЫ 1) в условиях производства 2) в быту 3) и тот, и другой 4) ни тот, ни другой 5) ни одно из перечисленных
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	152. К ГРУППЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ 1) тиофос 2) хлорофос 3) фосфамид 4) карбофос 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	153. К СРЕДСТВАМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ПЕСТИЦИДАМИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) холинолитиков 2) реактиваторов холинэстеразы 3) антибиотиков 4) цитостатиков 5) верно 3, 4

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	154. НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ КУМУЛЯТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЮТ 1) хлорорганические соединения 2) фосфорорганические соединения 3) карбонаты 4) перитроиды 5) нитрофенольные соединения
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	155. ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИМИ ПЕСТИЦИДАМИ ХАРАКТЕРНО ОКРАШИВАНИЕ ЯЗЫКА, СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА, РВОТНЫХ МАСС 1) в сине-зеленый цвет 2) в черный цвет 3) в красный цвет 4) в желтый цвет 5) в оранжевый цвет
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	156. ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕСТИЦИДОВ НИТРОФЕНОЛЬНОГО РЯДА ХАРАКТЕРНО ОКРАШИВАНИЕ КОЖИ, ВОЛОС, ВЫДЕЛЯЕМОГО ПОТА 1) в желтый цвет 2) в зеленый цвет 3) в красный цвет 4) в черный цвет 5) в коричневый цвет
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	157. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ИНТОКСИКАЦИЙ ПЕСТИЦИДАМИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 1) промывание желудка 2) сифонные клизмы 3) инфузионная терапия 4) форсированный диурез 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-10	158. ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ РТУТЬОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 1) комплексонотерапия 2) витаминотерапия 3) физиотерапия 4) все перечисленное 5) ни одно из перечисленных
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	159. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ДЛЯ АСБЕСТОЗА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ТИПОМ ФИБРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 1) узелковый 2) интерстициальный 3) узловой 4) смешанный 5) верно 1, 3

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	160. К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ В ТЕЧЕНИИ АСБЕСТОЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ 1) туберкулез 2) бронхит 3) рак легких 4) бронхоэктазы 5) кандидомикоз
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	161. НАЛИЧИЕ В МОКРОТЕ АСБЕСТОВЫХ ТЕЛЕЦ 1) имеет диагностическую ценность 2) не имеет диагностической ценности 3) всегда учитывается в совокупности с другими симптомами 4) верно 1, 3 5) может свидетельствовать о производственном контакте
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	162. К СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ У РАБОТАЮЩИХ В КОНТАКТЕ С АСБЕСТОВОЙ ПЫЛЬЮ ОТНОСИТСЯ 1) экзема 2) бородавки 3) папилломы 4) дерматит 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	163. ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ФИБРОЗНОГО ПРОЦЕССА ДО УЗЛОВЫХ ФОРМ 1) характерно для силикатозов 2) не характерно для силикатозов 3) характерно для беррилиоза 4) характерно для антракоза 5) характерно для биссиноза
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	164. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ФИБРОЗНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СИЛИКАТОЗАХ ЯВЛЯЕТСЯ 1) медленно прогрессирующее 2) быстро прогрессирующее 3) регрессирующее 4) стабильной динамики 5) верно 3, 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	165. ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОКОНИОЗАХ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА 1) однородны 2) неоднородны 3) прогрессирующие вне контакта 4) верно 1, 3 5) регрессирующие вне контакта
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	166. ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ МЕТАЛЛОВ ОТНОСЯТСЯ К ВИДУ: 1) дезинтеграции 2) конденсации 3) удушающего действия 4) кожно-резорбтивного действия 5) верно 1, 2

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	167. К МЕТАЛЛОКОНИОЗУ, ПРИ КОТОРОМ ОТСУТСТВУЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ДОЗЫ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА И ЭФФЕКТА ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСИТСЯ 1) сидероз 2) алюминоз 3) бериллиоз 4) верно 2, 3 5) оливиноз
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	168. К ЭФФЕКТАМ ДЕЙСТВИЯ АЭРОЗОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) аллергических 2) гемолитических 3) фиброгенных 4) канцерогенных 5) эмбриотоксических
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	169. В СОСТАВ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ ВХОДИТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 1) железо 2) окись углерода 3) мышьяк 4) марганец 5) озон
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	170. К ВЕЩЕСТВУ, ВХОДЯЩЕМУ В СОСТАВ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ ЛИТЕЙНОЙ ЛИХОРАДКИ, ОТНОСИТСЯ 1) аэрозоль железа 2) аэрозоль цинка 3) окись углерода 4) аэрозоль марганца 5) аэрозоль свинца
ПК-2 ПК-5 ПК-6	171. СРОКОМ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ РЕГРЕССИИ ПРОЦЕССА ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗЕ СВАРЩИКА ЯВЛЯЕТСЯ 1) 1-2 года 2) 5-6 лет 3) более 10 лет 4) все перечисленное 5) более 25 лет
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	172. К СОЕДИНЕНИЯМ БЕРИЛЛИЯ, ОБЛАДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ТОКСИЧЕСКИМ РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, ОТНОСЯТСЯ 1) растворимые 2) нерастворимые 3) токсическое раздражающее действие не зависит от растворимости 4) жирорастворимые 5) верно 1, 4

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	173. К СОЕДИНЕНИЯМ БЕРИЛЛИЯ, ОБЛАДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ОТНОСЯТСЯ 1) растворимые 2) нерастворимые 3) аллергическое действие не зависит от степени растворимости 4) жирорастворимые 5) верно 1, 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	174. ОСНОВНОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ БЕРИЛЛИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 1) узелок 2) бугорок 3) гранулема 4) папула 5) розеола
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	175. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО БЕРИЛЛИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 1) бронхит 2) бронхобронхиолит 3) эмфизема легких 4) все перечисленное 5) ни одно из перечисленных
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	176. НАИБОЛЬШИМ НАРУШЕНИЕМ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПРИ БЕРИЛЛИОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ 1) вентиляции 2) диффузии 3) легочного кровотока 4) сердечно-легочная недостаточность 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	177. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ БЕРИЛЛИОЗА ГРАНУЛЕМАТОЗНОГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ 1) прогрессирующее 2) регрессирующее 3) стабильное 4) медленно регрессирующее 5) медленно прогрессирующее
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	178. У БОЛЬНЫХ БЕРИЛЛИОЗОМ ОТМЕЧАЕТСЯ 1) высокая чувствительность к туберкулину 2) отрицательные туберкулиновые пробы 3) положительны пробы с промышленными аллергенами 4) положительная проба Куртиса 5) верно 2, 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	179. КАРБОКОНИОЗЫ 1) относятся к частым формам пневмокониозов 2) не относятся к частым формам пневмокониозов 3) не относятся к пневмокониозам 4) относят к аллергическому заболеванию органов дыхания 5) верно 1, 4

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	180. ТЕЧЕНИЕ КАРБОКОНИОЗОВ ОТЛИЧАЕТСЯ 1) медленно прогрессирующим течением 2) быстро прогрессирующим течением 3) регрессирующим течением 4) в постконтактном периоде(позднее) 5) верно 2, 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	181. К НАИБОЛЕЕ ФИБРОГЕННОМУ ВИДУ УГЛЯ ОТНОСИТСЯ 1) коксующийся 2) антрацит 3) бурый уголь 4) белый уголь 5) верно 1, 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	182. К РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ АНТРАКО-СИЛИКОЗА ОТНОСЯТСЯ 1) узелковая 2) интерстициальная 3) узловая 4) верно 1, 2, 3 5) смешанная
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	183. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ИНТЕРСТИ-ЦИАЛЬНЫХ ФОРМАХ АНТРАКОСИЛИКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 1) туберкулез 2) бронхит 3) саркоидоз 4) кандидоз 5) дыхательная недостаточность
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	184. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ УЗЕЛКОВЫХ ФОРМАХ АНТРАКОСИЛИКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 1) туберкулез 2) бронхит 3) саркоидоз 4) кандидоз 5) дыхательная недостаточность
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	185. К ПРОФЕССИЯМ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ СИДЕРОСИЛИКОЗА, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИС-КЛЮЧАЯ 1) рабочих литейных цехов 2) шахтеров железорудных шахт 3) рабочих металлургических заводов черной металлургии 4) верно 2, 3 5) верно 1, 2, 3

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	186. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ВИДОМ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БРОНХОВ ПРИ ПЫЛЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЯВЛЯЕТСЯ 1) атрофический 2) гипертрофический 3) катаральный 4) гипотрофический 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	187. Стажем работы, предшествующим развитию профессионального бронхита, чаще является 1) до 3 лет 2) до 5 лет 3) до 10 лет 4) свыше 10 лет 5) от 5 до 10 лет
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	188. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЮТСЯ: 1) АНАЛИЗ МОКРОТЫ; 2) БРОНХОСКОПИЯ; 3) КОЖНЫЕ ПРОБЫ; 4) ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ; 5) РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛЕГКИХ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 2 и 3 3) если верно 2 и 4 4) если верно 4 и 5 5) если верно 1 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	189. В ПРОЯВЛЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БРОНХИТА 1) присутствует специфичность изменений бронхов 2) специфики проявлений нет 3) присутствует всегда аллергический компонент 4) присутствуют ранние осложнения 5) характерны сочетания с пневмонией
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	190. К НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БРОНХИТА ПРОЦЕССАМ В БРОНХАХ НЕ ОТНОСИТСЯ 1) бронхоспазм 2) дистонические расстройства 3) активное воспаление 4) альтерация 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	191. К ПРОФЕССИЯМ, В КОТОРЫХ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПЫЛЕВОЙ БРОНХИТ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 1) шахтеров угольных шахт 2) пескоструйщиков 3) рабочих текстильных предприятий 4) рабочих цементных заводов 5) шлифовальщиков

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	192. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ, КРОМЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ БРОНХИТОВ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ПРОГРЕССИРОВАНИЮ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) раздражающих токсических веществ 2) перепадов температуры 3) воздействия лучистого тепла 4) значительных физических нагрузок 5) все перечисленное неверно
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	193. К ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПОРАЖЕНИЯМ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ НА ФОНЕ ПНЕВМОКОНИОЗА, ОТНОСЯТСЯ 1) пролиферативные 2) экссудативные 3) альтеративные 4) тотальные 5) верно 1, 2
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	194. СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА ОТЛИЧАЕТСЯ 1) меньшей выраженностью интоксикации 2) большей выраженностью интоксикации 3) отсутствием микобактерии 4) лихорадочным состоянием 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	195. К ФОРМЕ ПНЕВМОКОНИОЗА, ЧАЩЕ ОСЛОЖНЯЮЩЕЙСЯ БРОНХИТОМ, ОТНОСИТСЯ 1) интерстициальная 2) узелковая 3) узловая 4) верно 2, 3 5) смешанный тип
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	196. К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ДЛЯ ПНЕВМОКОНИОЗОВ ОТНОСЯТСЯ: 1) РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ; 2) АБСЦЕСС ЛЕГКОГО; 3) СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС; 4) БУЛЛЕЗНАЯ ЭМФИЗЕМА; 5) ЭКССУДАТИВНЫЙ ПЛЕВРИТ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 2, 4 и 5 5) если верно 1, 3 и 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	197. К НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) исследования мокроты на ВК 2) бронхоскопии 3) перкуссии и аускультации 4) рентгенографии 5) всех перечисленных

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	198. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ВИДОМ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ 1) тотальный 2) ограниченный 3) секторальный 4) только в сочетании с пылевым бронхитом 5) верно 2, 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	199. НАЛИЧИЕ "СИМПТОМА ПОНЕДЕЛЬНИКА" 1) достаточно для постановки диагноза биссиноза 2) недостаточно для постановки диагноза биссиноза 3) симптом не является специфическим 4) достаточно для постановки диагноза силикатоза 5) достаточно для постановки диагноза альвеолита
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	200. К ВИДАМ ПЫЛИ, ВЫЗЫВАЮЩИМ РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ЭКЗОГЕННОГО АЛЬВЕОЛИТА, ОТНОСЯТСЯ: 1) АСБЕСТОВАЯ; 2) ЗЛАКОВАЯ; 3) КВАРЦЕВАЯ; 4) ШЕРСТЯНАЯ; 5) ДРЕВЕСНАЯ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 2, 4 и 5 5) если верно 1, 3 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	201. ХАРАКТЕРНЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ОТВЕТОМ ПРИ ЭКЗОГЕННОМ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ АЛЬВЕОЛИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ 1) реакция немедленного типа 2) реакция полузамедленного типа 3) и та, и другая 4) ни та, ни другая 5) все перечисленное
ПК-2 ПК-6	202. ОБРУБЩИК, У КОТОРОГО ДИАГНОСТИРОВАН СИЛИКОЗ I СТАДИИ, В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 1) работать может 2) работать не может 3) вопрос о трудоспособности решается индивидуально 4) может продолжать работу при динамическом наблюдении 5) все перечисленное
ПК-2 ПК-6	203. ВОПРОС О ТРУДОСПОСОБНОСТИ ШАХТЕРА, СТРАДАЮЩЕГО АНТРАКОСИЛИКОЗОМ II СТАДИИ И ОЧАГОВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ФАЗЕ НЕПОЛНОГО УПЛОТНЕНИЯ, ДОЛЖЕН БЫТЬ СФОРМУЛИРОВАН СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ 1) может продолжать работу в подземных условиях с меньшей запыленностью (на свежей струе) при динамическом врачебном наблюдении 2) нуждается в переквалификации и выводе на поверхность 3) может продолжать работу в шахте при динамическом наблюдении и лечении 4) может продолжать работу в шахте при динамическом наблюдении 5) все перечисленное

ПК-2 ПК-6	204. ВОПРОС О ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОЧЕГО ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРОМУ УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ ПНЕВМОКОНИОЗ I СТАДИИ, ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ, ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ I-II СТЕПЕНИ, ДОЛЖЕН БЫТЬ СФОРМУЛИРОВАН СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ 1) нетрудоспособен 2) ограниченно трудоспособен. Не может продолжать работу в условиях запыленности, воздействия раздражающих веществ, перепадов температур, а также связанную со значительным физическим напряжением 3) трудоспособен в своей профессии при условии динамического врачебного наблюдения и лечения 4) верно 1, 3 5) все перечисленное
ПК-2	205. ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЦЕНТ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНОМУ ПНЕВМОКОНИОЗОМ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ИМ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 1) можно 2) нельзя 3) зависит от выраженности изменений 4) верно 2, 3 5) верно 1, 3
ПК-2 ПК-6	206. БОЛЬНОМУ, СТРАДАЮЩЕМУ СИЛИКОЗОМ I СТАДИИ И ИБС ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ (СТЕНОКАРДИЯ ПОКОЯ) ДОЛЖНА БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА 1) 2-я общая группа инвалидности 2) 2-я профессиональная группа инвалидности 3) третья общая группа инвалидности 4) верно 1, 2 5) % утраты профессиональной трудоспособности
ПК-5 ПК-10	207. МЕТОДЫ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗАХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 1) применяются 2) не применяются 3) только при сочетании с бронхитом 4) верно 1, 3 5) только при осложнениях
ПК-2 ПК-10	208. БОЛЬНОЙ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРОЦЕССОМ НУЖДАЕТСЯ В ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СРОКОМ 1) до 1-2 месяцев 2) до 3-4 месяцев 3) до 5-6 месяцев 4) до 1 года 5) все перечисленное
ПК-5 ПК-6 ПК-10	209. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ВИДАМ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЫЛЕВЫХ БРОНХИТАХ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) бронхолитиков 2) секретолитиков 3) противовоспалительных 4) антигистаминных

	5) химиотерапевтических
ПК-10	210. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЯ КОРТИКОСТЕРОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТНОСЯТСЯ: 1) УЗЕЛКОВЫЙ СИЛИКОЗ II СТАДИИ (БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ) ; 2) УЗЕЛКОВЫЙ СИЛИКОЗ II СТАДИИ (МЕДЛЕННО ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ) ; 3) БЕРИЛЛИОЗ I-II СТАДИИ; 4) АНТРАКОСИЛИКОЗ I СТАДИИ, РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ; 5) ПНЕВМОКОНИОЗ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА I-II СТАДИИ 1) если верно 1, 3 и 4 2) если верно 1, 2 и 3 3) если верно 1, 4 и 5 4) если верно 2, 3 и 4 5) если верно 3, 4 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	211. К ПЫЛЯМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ РАЗВИТИЕ СИЛИКОЗА, ОТНОСЯТСЯ 1) электросварочный аэрозоль 2) кварцевая (содержащая свободный диоксид кремния) 3) древесная 4) пыль шерсти 5) хлопковая
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	212. К СИЛИКОЗООПАСНЫМ ПРОФЕССИЯМ ОТНОСЯТСЯ: 1) БУРИЛЬЩИК; 2) ФРЕЗЕРОВЩИК; 3) ПЕСКОСТРУЙЩИК; 4) ОБРУБЩИК; 5) КУЗНЕЦ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 3 и 4 5) если верно 1, 2 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	213. К ОСЛОЖНЕНИЮ, ХАРАКТЕРНОМУ ДЛЯ СИЛИКОЗА, ОТНОСИТСЯ 1) пневмония 2) бронхиальная астма 3) туберкулез легких 4) бронхит 5) бронхоэктазы
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	214. К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СИЛИКОЗА ОТНОСЯТ 1) изменения в периферической крови 2) наличие "пылевых клеток" в мокроте 3) рентгенологические данные 4) данные спирографии 5) наличие кашля

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	215. К ПРОФЕССИЯМ, В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БРОНХИТА, ОТНОСЯТСЯ: 1) ШВЕЯ-МОТОРИСТКА; 2) ОБРУБЩИК; 3) ТОКАРЬ; 4) ПРЯДИЛЬЩИЦА; 5) МУКОМОЛ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 2, 4 и 5 4) если верно 3, 4 и 5 5) если верно 1, 4 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	216. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ; 2) НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ); 3) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЫЛЬ; 4) ШУМ; 5) ВЫНУЖДЕННАЯ РАБОЧАЯ ПОЗА 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 2 и 5 5) если верно 1, 3 и 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	217. К ПРОФЕССИЯМ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ 1) обрубщика 2) клепальщика 3) токаря 4) полировщика 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	218. ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ ЖАЛОБАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) БОЛИ В КОНЕЧНОСТЯХ; 2) ОНЕМЕНИЯ КИСТЕЙ, СТОП; 3) КАШЕЛЬ, ОДЫШКА; 4) ПОБЕЛЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ; 5) БОЛИ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 1, 2 и 4 4) если верно 3, 4 и 5 5) если верно 1, 4 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	219. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ СИМПТОМАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) расстройства чувствительности по полиневритическому типу 2) акроцианоза 3) тремора пальцев рук 4) миофиброза плечевого пояса 5) гипотермии кистей, стоп

ПК-6 ПК-10	220. В ЛЕЧЕНИИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ 1) сосудорасширяющих 2) витаминов группы В 3) комплексонов 4) физиотерапии 5) бальнеотерапии
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	221. К ПРОФЕССИЯМ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ТРУДОУСТРОЕН БОЛЬНОЙ С ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ОТНОСЯТСЯ: 1) СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ; 2) ЛАБОРАНТ-ХИМИК; 3) ШЛИФОВЩИК ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА; 4) РАБОЧИЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ; 5) МАСТЕР ЦЕХА ПОЛИРОВКИ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 2 и 5 5) если верно 1, 3 и 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	222. ШУМ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВРЕДНОСТЬЮ ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ, КРОМЕ 1) ткацких цехов 2) цеха точной сборки 3) штамповочных цехов 4) обрубного цеха 5) компрессорного цеха
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	223. К ОСНОВНОМУ ФАКТОРУ, УСИЛИВАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ РАБОТАЮЩЕГО, ОТНОСИТСЯ 1) неблагоприятные метеоусловия 2) вибрация 3) токсические вещества 4) вынужденная рабочая поза 5) напряжение зрения
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	224. В ПЕРЕВОДЕ НА РАБОТУ ВНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЕЙ ШУМА НУЖДАЮТСЯ 1) лица с признаками воздействия шума 2) лица с нейросенсорной тугоухостью легкой степени 3) лица с нейросенсорной тугоухостью значительной степени 4) ни одно из перечисленных 5) все перечисленное
ПК-2	225. ГЛУХОНЕМОТА 1) является противопоказанием к приему на работу в контакте с шумом 2) не является противопоказанием к приему на работу в контакте с шумом 3) единой точки зрения нет 4) может работать при нормальном ПДУ шума 5) решается индивидуально

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	226. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ (ПОМИМО ОРГАНА СЛУХ 1), КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА, ОТНОСЯТСЯ: 1) ГИПЕРТОНИЯ; 2) ИНФАРКТ МИОКАРДА; 3) НЕВРАСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ; 4) ТИРЕОТОКСИКОЗ; 5) БОЛЕЗНЬ МЕНЬЕРА 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 3, 4 4) если верно 4, 5 5) если верно 1, 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	227. К ПРОИЗВОДСТВАМ И ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОДИАПАЗОНА, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ 1) радиолокационные установки 2) телевидение 3) медицину 4) легкую промышленность 5) радиовещание
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	228. ВЕДУЩИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИОЧАСТОТ, ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ 1) астенический 2) миелополиневропатии 3) астено-вегетативный 4) гипоталамический 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	229. КРИТИЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ В ОТНОШЕНИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ОРГАН ЗРЕНИЯ; 2) ПЕЧЕНЬ; 3) КОСТНЫЙ МОЗГ; 4) КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ; 5) ОРГАН СЛУХА 1) если верно 1, 2 2) если верно 2, 3 3) если верно 3, 4 4) если верно 4, 5 5) если верно 1, 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	230. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ КРОВИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) увеличения количества эритроцитов 2) лейкоцитоза 3) снижения уровня гемоглобина 4) лейкопении 5) тромбоцитопении
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	231. ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ, КРОМЕ 1) астенического 2) астено-вегетативного 3) вегетативно-сосудистой дисфункции 4) гипоталамических кризов 5) всех перечисленных

ПК-6 ПК-10	232. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ 1) применение анальгетиков 2) введение гепарина 3) стимуляция сердечно-сосудистой системы 4) лечебная рекомпрессия 5) стимуляция дыхания
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	233. ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ 1) к стойким нарушениям центральной нервной системы 2) к заболеваниям типа синдрома Меньера 3) к хроническим заболеваниям костно-суставной системы 4) к заболеваниям сердца и сосудов 5) ко всему перечисленному
ПК-5 ПК-6	234. К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА, относятся 1) температура воздуха 2) влажность воздуха 3) инфракрасные излучения 4) скорость движения воздуха 5) все перечисленное
ПК-6 ПК-10	235. ТЕПЛОВОЙ УДАР РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ 1) высокой температуры и ионизирующего излучения 2) высокой температуры и лазерного излучения 3) высокой температуры и высокой влажности 4) высокой температуры и низкочастотной вибрации 5) все перечисленные
ПК-5 ПК-6	236. ПОДОСТРОЕ ТЕПЛОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЧАЩЕ ПРОТЕКАЕТ В ВИДЕ 1) дегидратационной формы 2) судорожной формы 3) смешанной формы 4) рецидивирующей формы 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	237. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ ХРОНИЧЕСКОГО ТЕПЛОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ 1) неврастенический 2) сердечно-сосудистый 3) анемический 4) желудочно-кишечный 5) все перечисленные
ПК-10	238. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ТЕПЛОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ 1) гидропроцедуры или влажные обертывания тела, холод на голову 2) оксигенотерапию 3) обильное питье до полного утоления жажды 4) внутривенное введение изотонического раствора хлорида натрия, глюкозы, плазмы 5) все перечисленные

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	239. СУММАРНОЙ ДОЗОЙ ОБЛУЧЕНИЯ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ, ЯВЛЯЕТСЯ 1) 0, 5 Грей (50 Ра 5) 2) 1, 0 Грей (100 Ра 5) 3) 0, 25 Грей (25 Ра 5) 4) 10, 0 Грей (1000 Ра 5) 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	240. ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ 1) кровь 2) органы дыхания 3) почки 4) нервная система 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	241. К НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, ОТНОСИТСЯ 1) 20-29 лет 2) 30-49 лет 3) 50-59 лет 4) 60-69 лет 5) все возрастные группы
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	242. УРОВНЯМИ ДОЗ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ЗАВЕДОМО ПОВРЕЖДАЮЩИХ, ЯВЛЯЮТСЯ 1) 0, 01-0, 1 Грей 2) 0, 1-1, 0 Грей 3) 1-10 Грей 4) 10-100 Грей 5) все перечисленное
ПК-2 ПК-6	243. ПРАВИЛЬНЫМ ЭКСПЕРТНЫМ РЕШЕНИЕМ ЧЕРЕЗ 1 ГОД ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА "ХРОНИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ I СТЕПЕНИ", КОГДА НАСТУПИЛО ПОЛНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 1) может быть допущен к прежней работе при условии, если доза облучения лежит заведомо ниже принятого ПДУ 2) контакт с ионизирующим излучением должен быть прекращен навсегда. Подлежит рациональному трудоустройству 3) противопоказана работа с ионизирующим излучением и воздействием токсических химических веществ. Подлежит направлению на МСЭ 4) может быть допущен к прежней работе при условии, если доза облучения лежит в пределах принятого ПДУ 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	244. ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ, ВСЕ КРОМЕ: 1) двустороннее поражение органа слуха 2) постепенное начало 3) начало поражения слуха с высоких частот 4) острое начало 5) все перечисленное

ПК-2 ПК-6	245. ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ УЧИТЫВАЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 1) степени выраженности заболевания 2) состояния сердечно-сосудистой системы 3) пола 4) возраста 5) стажа работы
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	246. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ОСТРОГО ТЕПЛОВОГО ПОРАЖЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) гипертермии 2) кратковременной потери сознания 3) понижения артериального давления 4) гиперемии кожных покровов 5) усиленного потоотделения
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	247. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ОСТРОГО ТЕПЛОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) гипертермии 2) гипертензии 3) гипотонии 4) судорог 5) остановки дыхания
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	248. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ПРИ ВЫРАЖЕННОМ СУДОРОЖНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ ТЕПЛОВОМ ПОРАЖЕНИИ ОТНОСЯТСЯ: 1) СУДОРОГИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП МЫШЦ; 2) ВЛАЖНАЯ, ГОРЯЧАЯ КОЖА; 3) ПОЛИУРИЯ; 4) НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРИДОВ; 5) УВЕЛИЧЕНИЕ В КРОВИ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ И ГЕМОГЛОБИНА 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 4 и 5 5) если верно 2, 4 и 5
ПК-2 ПК-5 ПК-6	249. К ПРОФЕССИЯМ, В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ (ХЛ 2), ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) рентгенолога 2) гамма-дефектоскописта 3) физика-ядерщика 4) настройщика радиоаппаратуры 5) все перечисленное

ПК-2 ПК-5 ПК-6	250. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ОСТРОЕ НАЧАЛО; 2) ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО; 3) ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ; 4) РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ; 5) ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ 1) если верно 1, 3 и 5 2) если верно 2, 3 и 5 3) если верно 2, 4 и 5 4) если верно 1, 4 и 5 5) все перечисленное
ПК-5 ПК-6	251. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) мононейропатии 2) полинейропатии 3) невритов 4) неврозов 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	252. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ 1) лигаментит тыльной связки запястья 2) лигаментит поперечной связки запястья 3) крепитирующий тендовагинит предплечья 4) тендовагинит сгибателей кисти 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	253. К КЛИНИЧЕСКИМ ФОРМАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСКИНЕЗИЙ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) судорожной 2) дрожательной 3) паретической 4) невральной 5) ангиодистонической
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	254. КООРДИНАТОРНЫЕ НЕВРОЗЫ ОБЫЧНО ПРОТЕКАЮТ 1) остро 2) рецидивирующее 3) прогрессирующе 4) вялотекущее 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	255. К СИНДРОМАМ, СОЧЕТАЮЩИМСЯ С КООРДИНАТОРНЫМИ НЕВРОЗАМИ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) экстрапирамидного синдрома 2) неврастенического синдрома 3) миофиброза плечевого пояса 4) интрапирамидного синдрома 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	256. ПРОГНОЗ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРНЫХ НЕВРОЗАХ 1) благоприятный 2) сомнительный 3) неблагоприятный 4) хороший

	5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	257. ВСЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ (ДИСФОНИЙ) ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ 1) на органические 2) на функциональные 3) верно 1, 2 4) профессиональные 5) органоспецифические
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	258. К ОРГАНИЧЕСКИМ ДИСФОНИЯМ ОТНОСЯТСЯ 1) кровоизлияния в слизистую оболочку или мышцу гортани 2) острые и хронические ларингиты 3) вазомоторный и маргинальный (краевой) хордиты 4) узелки, полипы и контактные язвы голосовых связок 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	259. К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ДИСФОНИЯМ ОТНОСЯТСЯ 1) гиперкинетическая дисфония 2) гипокинетическая дисфония 3) спастическая дисфония 4) фонастения 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	260. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА ОТНОСЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 1) хронический ларингит 2) вазомоторный и маргинальный (краевой) хордиты 3) узелки, полипы и контактные язвы голосовых связок 4) фонастению 5) все перечисленное
ПК-6 ПК-10	261. КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ РАЗВИТИЕ МИОПИИ ИЛИ ЕЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ВКЛЮЧАЕТ 1) физические упражнения 2) гимнастику для глаз 3) рациональное питание с добавкой кальция, витамина D 4) закаливание организма 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	262. ОСОБЕННОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 1) ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО; 2) ЗАВИСИМОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ; 3) ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ; 4) НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ; 5) НАЛИЧИЕ ТРАВМЫ В АНАМНЕЗЕ 1) если верно 1, 2 и 3 2) если верно 2, 3 и 4 3) если верно 3, 4 и 5 4) если верно 1, 3 и 5

	5) если верно 2, 4 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	263. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 1) крепитирующего тендовагинита предплечья 2) миофасцитов (миопатозо 3) 3) эпикондилеза плеча 4) контрактуры Дюпиютрена 5) бурситов
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	264. К ПРОФЕССИЯМ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ КООРДИНАТОРНЫЙ НЕВРОЗ, ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) скрипача 2) пианиста 3) токаря 4) машинистки 5) линотиписта в типографии (работа на клавишных машинах)
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	265. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ КОНЪЮНКТИВИТЫ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ КОНТАКТЕ СО ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ГРУППАМИ ВЕЩЕСТВ, КРОМЕ 1) косметических средств (урсоловая краска, янтарный крем) 2) лакокрасочных покрытий 3) свинцовой пыли 4) солей металлов платиновой группы 5) пыли чулочной фабрики
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	266. ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ЭТИОЛОГИИ КОНЪЮНКТИВИТА НЕОБХОДИМО 1) собрать аллергологический анализ 2) выявить специфический аллерген согласно представленной санитарно-гигиенической характеристике 3) провести аппликационные кожные пробы с подозреваемым аллергеном 4) провести цитологическое исследование соскобов с конъюнктивы глаза 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	267. К АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТНОСЯТСЯ 1) аллергические риниты 2) аллергические синуситы 3) аллергические фарингиты 4) аллергические ларингиты 5) все перечисленные

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	268. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НЕРЕДКО СОЧЕТАЮТСЯ СО ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 1) аллергического дерматита 2) астмоидного бронхита 3) гипохромной анемии 4) бронхиальной астмы 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	269. К АЛЛЕРГЕНАМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) хлопка 2) льна 3) шиповника 4) джута 5) мучной пыли
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	270. К ХИМИЧЕСКИМ АЛЛЕРГЕНАМ ОТНОСЯТСЯ 1) никель 2) марганец 3) кобальт 4) хром 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	271. К АЛЛЕРГЕНАМ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ 1) шерсть различных видов животных 2) эпидермальные образования 3) натуральный шелк 4) все перечисленное 5) ни одно из перечисленных
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	272. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ С АЛЛЕРГИЕЙ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ И ИНФЕКЦИОННЫМ ФАКТОРАМ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) симптомов экспозиции и элиминации 2) контакта с производственными аллергенами 3) положительных результатов кожных проб с бактериальными аллергенами 4) положительных результатов специфических иммунологических тестов 5) положительных результатов провокационной ингаляционной пробы
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	273. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ТУБЕРКУЛЕЗ, БРУЦЕЛЛЕЗ, ЯЩУР, ТУЛЯРЕМИЯ, САП, СИБИРСКАЯ ЯЗВА И ДРУГИЕ) МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ У ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ 1) с больными людьми 2) с больными животными 3) с культурами возбудителей инфекционных заболеваний 4) с переносчиками болезней 5) со всеми перечисленными категориями

ПК-2	274. ПРАВО УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ 1) инфекционной больнице, специализирующейся по определенной инфекции (зоонозы, антропонозы, туберкулез) 2) специализированному профпатологическому учреждению (профцентру, клинике профзаболеваний и т. п.) 3) только в совокупности с крупными центрами профпатологии 4) необходима санитарно-гигиеническая характеристика 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	275. РАК КОЖИ ВЫЗЫВАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 1) каменноугольной смолы 2) парафина 3) бензола 4) мышьяка 5) рентгеновских лучей
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	276. РАК ЛЕГКИХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, КРОМЕ 1) бензопирена 2) хрома 3) парафина 4) никеля 5) асбеста
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	277. РАК ЖЕЛУДКА МОГУТ ВЫЗВАТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, КРОМЕ 1) бензопирена 2) гудрона 3) никеля 4) хрома 5) асбеста
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	278. К ГРУППЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ЗАНИМАЮЩЕЙ САМОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ДЕЙСТВИЮ НА ДЕТОРОДНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА, ОТНОСЯТСЯ 1) химические 2) промышленные аэрозоли 3) физические 4) биологические 5) функциональное перенапряжение
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	279. ПАТОГЕНЕЗ РАССТРОЙСТВ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ СВЯЗАН 1) с нарушением гемодинамики органов малого таза 2) с нарушением гипофизарно-овариальных взаимоотношений 3) с повреждением фолликулов яичника 4) ни одно из перечисленных 5) все перечисленное

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	280. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОТНОСЯТСЯ 1) ранние токсикозы 2) токсикозы второй половины беременности 3) невынашивания беременности 4) верно 2, 3 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	281. НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОЗОЙ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ 1) стоячая работа 2) сидячая работа 3) переменная поза 4) существенного значения не имеет 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	282. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ КОЖИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 1) экземы 2) дерматита 3) эпидермоза 4) крапивницы 5) токсидермии
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	283. К РАДИОНУКЛИДАМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ У РАБОТАЮЩИХ, ОТНОСЯТСЯ 1) радий 2) стронций 3) плутоний 4) цезий 5) уран
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	284. К ОСНОВНЫМ ВРАЧЕБНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, В КОТОРЫХ НАБЛЮДАЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ 1) инфекционисты 2) хирурги 3) фтизиатры 4) анестезиологи 5) все перечисленные
ПК-2	285. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ: 1) туберкулез 2) вирусный гепатит В 3) бруцеллез 4) все перечисленные 5) ни одно из перечисленных

ПК-2	286. К ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ 1) отсутствие данного заболевания до начала работы по соответствующей специальности 2) наличие контакта с вредными производственными факторами, превышающими ПДК и ПДУ 3) наличие контакта с источником инфекции (при инфекционном заболевании) 4) неблагоприятные условия труда 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	287. НАИБОЛЬШИМ ТЕРАТОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ: 1) ПЫЛЬ ХЛОПКА; 2) СОЕДИНЕНИЯ СВИНЦА; 3) ХЛОРИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ; 4) ЦИНК; 5) РТУТЬ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 2 и 3 3) если верно 3 и 4 4) если верно 4 и 5 5) если верно 1 и 5
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	288. ВОЗРАСТОМ ЖЕНЩИНЫ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ЯВЛЯЕТСЯ: 1) ДО 18 ЛЕТ; 2) ПОСЛЕ 30 ДО 40 ЛЕТ; 3) ПОСЛЕ 40 ДО 50 ЛЕТ; 4) ПОСЛЕ 50 ЛЕТ 1) если верно 1 и 2 2) если верно 2 и 3 3) если верно 3 и 4 4) если верно 1 и 3 5) если верно 2 и 4
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	289. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ НАРУШЕНИЯМ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 1) ГИПЕРМЕНОРЕЯ; 2) ГИПОМЕНОРЕЯ; 3) АЛЬГОМЕНОРЕЯ 1) если верно 1 и 3 2) если верно 2 и 3 3) верно 1 4) верно 1, 2 5) верно 1, 2, 3
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	290. ТЕПЛООТДАЧА У РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ЦЕХЕ 33-35°С, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 40-45% И ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 60-80% ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЛЕДУЮЩИМ ПУТЕМ 1) излучением 2) испарением 3) проведением 4) конвекцией 5) все перечисленное

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	291. ТИПЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 1) душирующие установки 2) воздушные завесы 3) панельный воздухораспределитель 4) потолочный распределитель 5) все перечисленное
ПК-2	292. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МИКРОКЛИМАТ ДЕЛИТСЯ НА 1) комфортный 2) охлаждающий 3) нагревающий 4) верно 2, 3 5) верно 1, 2, 3
ПК-2	293. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ 1) латексная аллергия 2) бронхиальная астма 3) профессиональная радикулопатия 4) профессиональная близорукость 5) действие лазера
ПК-2	294. К ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ 1) отсутствие данного заболевания до начала работы по соответствующей специальности 2) наличие контакта с вредными производственными факторами, превышающими ПДК и ПДУ 3) наличие контакта с источником инфекции (при инфекционном заболевании) 4) неблагоприятные условия труда 5) все перечисленные
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	295. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ НАРУШЕНИЯМ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 1) альгоменорея 2) опущение женских половых органов 3) выпадение матки 4) метроррагии 5) верно 2, 4
ПК-2	296. ТЕПЛООТДАЧА У РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ЦЕХЕ 33-35°С, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 40-45% И ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 60-80% ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЛЕДУЮЩИМ ПУТЕМ 1) излучением 2) испарением 3) проведением 4) конвекцией 5) все перечисленное

ОПК-9 ПК-5 ПК-6	297. ТИПЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 1) дширующие установки 2) воздушные завесы 3) панельный воздухораспределитель 4) потолочный распределитель 5) все перечисленное
ОПК-9 ПК-5 ПК-6	298. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ФОРМАЛЬДЕГИДА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ 1) раздражение слизистых оболочек дыхательных путей 2) сенсибилизация организма 3) раздражение кожных покровов и слизистых оболочек глаз 4) канцерогенное 5) все перечисленное
ПК-2	299. КАКОЙ ФАКТОР ВРЕДНОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ? 1) химический 2) физический 3) биологический 4) тяжесть и напряженность труда 5) верно 1, 3
ПК-2	300. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЦЕНТРА ПРОФПАТОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 1) установление связи заболеваний с профессией 2) оздоровление больных, инвалидов вследствие профзаболеваний 3) оздоровление лиц из группы риска 4) разработка и проведение мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости и трудопотерь по болезни и инвалидности 5) все перечисленное

3.4 Эталоны ответов к тестовым вопросам по модулю «Профессиональные болезни»

№ теста	Ответ
1.	3
2.	4
3.	3
4.	3
5.	3
6.	2
7.	4
8.	4
9.	1
10.	5
11.	5
12.	5
13.	4
14.	5
15.	4
16.	2
17.	4
18.	5
19.	2
20.	4
21.	3
22.	1
23.	4
24.	2
25.	3
26.	2
27.	2
28.	5
29.	2
30.	5
31.	5
32.	5
33.	4
34.	5
35.	4
36.	2
37.	3
38.	5
39.	1
40.	4
41.	4
42.	5
43.	3
44.	3
45.	1
46.	5
47.	1
48.	2
49.	5

№ теста	Ответ
50.	2
51.	3
52.	2
53.	3
54.	1
55.	3
56.	1
57.	1
58.	4
59.	5
60.	3
61.	4
62.	1
63.	4
64.	1
65.	2
66.	2
67.	1
68.	3
69.	2
70.	4
71.	2
72.	2
73.	4
74.	3
75.	4
76.	1
77.	2
78.	2
79.	3
80.	4
81.	3
82.	3
83.	4
84.	5
85.	3
86.	4
87.	5
88.	3
89.	5
90.	4
91.	5
92.	5
93.	4
94.	5
95.	1
96.	3
97.	4
98.	3

№ теста	Ответ
99.	3
100.	1
101.	3
102.	2
103.	2
104.	3
105.	3
106.	1
107.	3
108.	5
109.	5
110.	2
111.	4
112.	4
113.	3
114.	3
115.	2
116.	2
117.	3
118.	2
119.	3
120.	5
121.	2
122.	5
123.	5
124.	5
125.	5
126.	4
127.	5
128.	1
129.	4
130.	4
131.	1
132.	3
133.	2
134.	5
135.	1
136.	2
137.	2
138.	5
139.	2
140.	5
141.	2
142.	1
143.	5
144.	4
145.	4
146.	3
147.	4

№ теста	Ответ
148.	4
149.	4
150.	5
151.	2
152.	5
153.	5
154.	1
155.	1
156.	1
157.	5
158.	4
159.	2
160.	5
161.	2
162.	2
163.	2
164.	1
165.	2
166.	5
167.	3
168.	2
169.	3
170.	2
171.	3
172.	1
173.	2
174.	3
175.	4
176.	2
177.	1
178.	5
179.	2
180.	1
181.	2
182.	4
183.	2
184.	1
185.	1
186.	1
187.	4
188.	3
189.	2
190.	3
191.	2
192.	3
193.	5
194.	1
195.	1
196.	5

3.4 Эталоны ответов к тестовым вопросам по модулю «Профессиональные болезни»

№ теста	Ответ
197.	3
198.	5
199.	1
200.	4
201.	2
202.	2
203.	2
204.	2
205.	5
206.	2
207.	2
208.	4
209.	5
210.	1
211.	2
212.	4
213.	3
214.	3
215.	3
216.	4
217.	3
218.	3
219.	3
220.	3
221.	4
222.	2
223.	2
224.	3
225.	3
226.	5
227.	4
228.	2
229.	5
230.	5
231.	4
232.	4
233.	5
234.	5
235.	3
236.	3
237.	5
238.	5
239.	2
240.	1
241.	2
242.	3
243.	2
244.	4
245.	3

№ теста	Ответ
246.	3
247.	2
248.	4
249.	4
250.	3
251.	3
252.	2
253.	5
254.	3
255.	1
256.	2
257.	3
258.	5
259.	5
260.	5
261.	5
262.	1
263.	4
264.	3
265.	3
266.	5
267.	5
268.	3
269.	3
270.	3
271.	1
272.	4
273.	1
274.	1
275.	4
276.	3
277.	4
278.	3
279.	3
280.	3
281.	4
282.	5
283.	3
284.	5
285.	3
286.	5
287.	2
288.	4
289.	1
290.	2
291.	5
292.	5
293.	3
294.	5

№ теста	Ответ
295.	5
296.	2
297.	5
298.	5
299.	4
300.	5

4. Программные вопросы к промежуточной аттестации по дисциплине «Факультетская терапия, профессиональные болезни»

4.1 Вопросы по модулю «Факультетская терапия»

Код компетенций	Вопросы
	1. Башкирская школа терапевтов. История кафедры факультетской терапии БГМУ (1935 - 2019). Основные направления научной работы кафедры.
	2. Основы врачебной деонтологии и медицинской этики. Ятрогенные заболевания.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	3. Анафилактический шок. Причины развития. Клиника, неотложная помощь.
ПК-8	4. Санаторно-курортное лечение при заболеваниях внутренних органов. Местные и российские санатории и курорты. Показания и противопоказания к лечению.
ПК-8	5. Физиотерапевтические методы лечения при заболеваниях внутренних органов.
ПК-8	6. Диета при заболеваниях внутренних органов.
ПК-5, ПК-6,	7. Пневмония. Этиология, патогенез. Классификация.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	8. Внебольничная долевая пневмония. Клиника. Диагностика. Лечение.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	9. Внебольничная очаговая пневмония. Клиника. Диагностика. Лечение.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	10. Осложнения пневмонии (легочные, внелегочные). Диагностика. Лечение.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	11. Особенности течения внутрибольничных, аспирационных пневмоний и пневмоний у лиц с иммунодефицитом.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11	12. Инфекционно-токсический шок. Причины развития. Клинические проявления. Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	13. Хронический необструктивный бронхит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.
ПК-5, ПК-6	14. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Этиология. Патогенез. Классификация.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	15. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Клиника. Диагностика. Лечение.
ПК-5, ПК-6	16. Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. Классификация.
ПК-5, ПК-6	17. Бронхиальная астма. Клиника. Методы диагностики.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11	18.Астматический статус. Причины развития. Формы. Стадии. Принципы лечения.
ПК-8, ПК-10	19. Современное лечение бронхиальной астмы в приступный и межприступный период.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	20. Инфекционные деструкции легких. Этиология, патогенез, классификация. Клиника абсцесса и гангрены легких. Диагностика. Осложнения. Лечение.
ПК-5, ПК-6,	21. Гипертоническая болезнь. Факторы риска, патогенез, классифика-

	ция. Клиника. Диагностика.
ПК-8, ПК-10	22. Современные методы лечения гипертонической болезни.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	23. Осложнения гипертонической болезни (сердечные, мозговые, почечные, аортальные). Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11	24. Гипертонические кризы. Классификация. Клиника. Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	25. Атеросклероз. Факторы риска. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.
ПК-5, ПК-6	26. ИБС. Факторы риска. Патогенез. Классификация.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	27. ИБС. Внезапная коронарная смерть (Первичная остановка сердца). Причины развития. Диагностика. Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	28. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения. Классификация. Клиника. Лечение.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	29. ИБС. Острый коронарный синдром. Нестабильная стенокардия. Клинические формы. Диагностика. Лечение.
ПК-5, ПК-6, ПК-8	30. ИБС. Инфаркт миокарда. Классификация. Клинические варианты. Лабораторная диагностика.
ПК-5, ПК-6	31. ЭКГ – диагностика инфаркта миокарда. Динамика ЭКГ с учетом периода инфаркта миокарда, локализации и глубины некроза.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	32. Осложнения острейшего и острого периодов инфаркта миокарда. Диагностика. Неотложная помощь.
ПК-11	33. Купирование болевого синдрома при инфаркте миокарда.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11	34. Кардиогенный шок. Критерии диагностики. Стадии шока. Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	35. Нарушения ритма сердца при инфаркте миокарда. ЭКГ – диагностика. Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	36. Нарушения проводимости сердца при инфаркте миокарда. Синдром Морганьи - Адамса – Стокса. ЭКГ - диагностика. Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	37. Осложнения инфаркта миокарда в подостром и постинфарктном периодах. Синдром Дресслера. Лечение.
ПК-8, ПК-10, ПК-11	38. Современные принципы оказания медицинской помощи при инфаркте миокарда. Лечение в различные периоды инфаркта миокарда.
ПК-8	39. Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда. Роль местных санаториев в реабилитации больных.
ПК-8, ПК-10	40. Принципы лечения ИБС. Современная медикаментозная терапия. Хирургическое лечение.
ПК-5, ПК-6	41. Острая ревматическая лихорадка. Этиология. Патогенез. Классификация. Критерии диагностики.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	42. Острая ревматическая лихорадка. Клиника. Лабораторная и ЭКГ - диагностика. Лечение. Первичная и вторичная профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	43. Недостаточность митрального клапана. Этиология. Патогенез. Клиника. Инструментальная диагностика. Осложнения. Показания к оперативному лечению.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	44. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. Этиология. Патогенез. Клиника. Инструментальная диагностика, осложнения. Показания к оперативному лечению.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	45. Недостаточность аортального клапана. Этиология. Патогенез. Клиника. Инструментальная диагностика. Показания к оперативному лечению.
ПК-5, ПК-6, ПК-	46. Стеноз устья аорты. Этиология, патогенез клиническая картина.

8, ПК-10	Инструментальная диагностика.
ПК-5, ПК-6	47. Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, Классификация.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	48. Инфекционный эндокардит. Клиника, диагностические критерии, осложнения. Лечение, профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	49. Острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отек легких). Причины развития. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	50. Острая сосудистая недостаточность. Обморок, коллапс, шок. Причины развития. Клиника. Неотложная помощь.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	51. Хроническая сердечная недостаточность. Этиология. Патогенез, Классификация. Клиника. Диагностика.
ПК-8, ПК-10	52. Лечение хронической сердечной недостаточности.
ПК-5, ПК-6	53. Хронический гастрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	54. Хронический гастрит. Методы диагностики. Лечение. Профилактика.
ПК-5, ПК-6	55. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Этиология, патогенез, классификация. Клиника. Диагностика.
ПК-8, ПК-10	56. Современные методы лечения ЯБ. Эрадикационная терапия. Профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	57. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. Клинико-инструментальная диагностика. Неотложная помощь Показания к переводу больных в хирургическое отделение.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	58. Хронический панкреатит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение, профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	59. Дисфункции желчевыводящих путей. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	60. Хронический холецистит. Этиология. Патогенез, классификация. Клиника, лабораторная и инструментальная диагностика. Лечение. Профилактика.
ПК-5, ПК-6	61. Хронический гепатит. Этиология, патогенез. Классификация.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	62. Хронический гепатит. Клиника. Лабораторная и инструментальная диагностика. Современные методы лечения. Профилактика.
ПК-5, ПК-6	63. Циррозы печени. Этиология, патогенез, классификация.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	64. Цирроз печени вирусной этиологии. Особенности клинического течения. Лабораторная и инструментальная диагностика. Лечение. Профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	65. Билиарный цирроз печени. Особенности клинического течения. Диагностика. Лечение. Профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	66. Алкогольный цирроз печени. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	67. Осложнения циррозов печени. Клиника. Диагностика. Лечение.
ПК-5, ПК-6	68. Гломерулонефриты. Этиология. Патогенез. Клинико-морфологическая классификация.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	69. Острый гломерулонефрит. Клиника. Диагностика. Лечение, профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10	70. Хронический гломерулонефрит. Клинические варианты, осложнения. Диагностика. Лечение, профилактика.
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11	71.ГЛПС в республике Башкортостан: клинические особенности, осложнения. ОПН при ГЛПС. Принципы лечения. Вклад ученых

	БГМУ в изучение проблемы ГЛПС.

4. 2 Вопросы по модулю «Профессиональные болезни»

Код компетенций	Вопросы
ПК-2	1. Общие принципы классификации, диагностики и терапии профессиональных заболеваний. Структура профессиональных заболеваний в РФ и РБ. Общие принципы диагностики профессиональных заболеваний. Значение дополнительных методов обследования в профпатологии. Понятие о профмаршруте, трудовом больничном листе.
ПК-2	2. Приказ 302-н (от 12. 04. 2011 МЗ РФ и СР). Обязательные предварительные медосмотры (ПМО) работников. Организация ПМО. Цели и задачи ПМО.
ПК-2	3. Медико-социальная экспертиза и реабилитация больных с профессиональными заболеваниями.
ПК-2	4. В течение какого времени осуществляется расследование острого или хронического профессионального заболевания? (Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" и письмо ФСС РФ от 29 апреля 2005 г. № 02-18/06-3810 «Обзор по вопросам экспертизы страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием».).
ПК-2	5. Нормативно-законодательные документы в профпатологии. Документы для юридически обоснованной связи заболевания с профессией.
ПК-2	6. Понятие о вредных и опасных производственных факторах. Острые отравления на производстве Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Роль врача по гигиене труда в профилактике профессиональных отравлений.
ПК-2	7. Общая характеристика промышленных аэрозолей. Гигиеническая классификация промышленной пыли, ее свойства. О современных показателях гигиенического нормирования и контроля содержания промышленной пыли в воздухе рабочей зоны.
ОПК-9, ПК-2 ПК-5, ПК-6 ПК-10	8. Пневмокониозы. Потенциально опасные производства и профессии. Общая характеристика пневмокониозов, классификация, патогенез и диагностика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	9. Особенности клинической картины неосложненных пневмокониозов. Диагностика пневмокониозов. Дифференциальная диагностика пневмокониозов с туберкулезом, саркоидозом, карциноматозом. Основные принципы лечения пневмокониозов и профилактики.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	10. Силикоз. Клинические и рентгенморфологические особенности. Осложнения. Принципы лечения, профилактики. Экспертиза трудоспособности при различных стадиях силикоза.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	11. Антракоз и антракосиликоз. Потенциально опасные производства и профессии. Клинико-рентгенологические особенности, осложнения, принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.

ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	12. Асбестоз. Потенциально опасные производства и профессии. Клинико-рентгенологические особенности, особенности течения болезни, осложнения, принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	13. Пневмокониозы от смешанных пылей. Пневмокониоз электросварщика. Клинико-рентгенологические особенности, осложнения, принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-10	14. Пневмокониозы от органических пылей. Клинико-рентгенологические особенности, осложнения, принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9, ПК-2 ПК-5, ПК-6 ПК-10	15. Гиперчувствительные пневмониты (основные нозологические формы). Потенциально опасные производства и профессии. Этиология, патогенез, клиника. Дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	16. Профессиональный пылевой бронхит. Потенциально опасные производства и профессии. Этиология, патогенез, патоморфологические изменения, классификация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	17. Профессиональный пылевой бронхит. Особенности клиники неосложненного пылевого бронхита, принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	18. Профессиональный токсико-пылевой бронхит. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2	19. Классификация промышленных аллергенов, их общая характеристика.
ПК-2 ПК-5, ПК-6	20. Профессиональные аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6	21. Профессиональная бронхиальная астма. Потенциально опасные производства и профессии. Классификация профессиональной астмы.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	22. Профессиональная бронхиальная астма. Дифференциально-диагностические критерии астмы (перечислите отличия профессиональной от остальных видов). Принципы лечения. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5, ПК-6	23. Заболевания, связанные с воздействием бериллия и его соединений. Бериллиоз. Клиника, диагностика, осложнения, дифференциальная диагностика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ПК-2 ПК-5, ПК-6	24. Острые профессиональные токсико-химические поражения органов дыхания. Потенциально опасные производства и профессии.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5, ПК-6	25. Острые профессиональные токсико-химические поражения верхних дыхательных путей: ринит, фарингит, ларингит, трахеит. Этиология. Клиника. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.

ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6	26. Острые профессиональные поражения дыхательной системы: токсико-химический бронхит, бронхиолит, пневмония. Клиника, диагностика, осложнения, Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	27. Острый токсический отек легких. Потенциально опасные производства и профессии. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Неотложная помощь. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6	28. Хронические профессиональные токсико-химические поражения органов дыхания. Потенциально опасные производства, профессии. Этиология. Патогенез поражений органов дыхания токсико-химической этиологии.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	29. Профессиональный ринит. Потенциально опасные профессии. Клиника, диагностика и лечение. Дифференциальная диагностика. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	30. Профессиональные заболевания с преимущественным поражением системы крови. Хроническая профессиональная интоксикация бензолом и его гомологами (ксилол, стирол, толуол). Потенциально опасные производства и профессии. Патогенез развития заболевания. Клинические проявления. Диагностика. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	31. Хроническая интоксикация свинцом и его неорганическими соединениями. Потенциально опасные профессии и производства. Патогенез развития заболевания. Клинические проявления. Диагностика. Профилактика. Лечение. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6, ПК-10	32. Хроническая интоксикация свинцом. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Клинико-лабораторные критерии определения степени тяжести. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5, ПК-6 ПК-10	33. Хроническая интоксикация ртутью. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Клинико-лабораторные критерии определения степени тяжести. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6	34. Хроническая профессиональная интоксикация амино- и нитросоединениями бензола. Потенциально опасные производства и профессии. Клинические проявления, диагностика, профилактика.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5, ПК-6 ПК-10	35. Острая профессиональная интоксикация амино- и нитросоединениями бензола. Потенциально опасные производства и профессии. Патогенез. Клинические проявления. Неотложная помощь. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	36. Острая профессиональная интоксикация ароматическими углеводородами – бензолом и его гомологами (ксилол, стирол, толуол). Потенциально опасные производства и профессии. Клинические проявления. Неотложная помощь. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	37. Хроническая интоксикация марганцем. Потенциально опасные производства и профессии. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.

ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	38. Острая профессиональная интоксикация марганцем. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	39. Острая интоксикация металлической ртутью. Потенциально опасные производства и профессии. Патогенез. Основные клинические синдромы. Принципы неотложной помощи и профилактики.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	40. Профессиональные интоксикации фтором и его неорганическими соединениями. Клинические синдромы. Диагностика. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	41. Острая интоксикация сероуглеродом. Потенциально опасные производства и профессии. Основные клинические синдромы, методы диагностики. Принципы неотложной помощи и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6, ПК-10	42. Острая интоксикация тетраэтилсвинцом. Потенциально опасные производства и профессии. Патогенез. Основные клинические синдромы, методы диагностики. Принципы неотложной помощи и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6	43. Хроническая интоксикация тетраэтилсвинцом. Потенциально опасные производства и профессии. Основные клинические синдромы, методы диагностики. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6, ПК-10	44. Острая интоксикация оксидом углерода. Потенциально опасные производства и профессии. Патогенез. Основные клинические синдромы, методы диагностики. Принципы неотложной помощи и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	45. Хроническая интоксикация окисью углерода. Потенциально опасные производства и профессии. Клинические синдромы. Диагностика. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5, ПК-6 ПК-10	46. Острая и хроническая интоксикация органическими растворителями. Потенциально опасные производства и профессии. Основные клинические синдромы, методы диагностики. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ПК-5 ПК-6	47. Пестицидами, используемые в сельском хозяйстве. Классификация пестицидов. Принципы профилактики отравлений пестицидами.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	48. Острая и хроническая интоксикация фосфорорганическими пестицидами. Патогенез. Клинические синдромы, осложнения, исходы. Неотложная помощь при острых отравлениях. Профилактика. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	49. Острая и хроническая интоксикация ртутьорганическими пестицидами. Патогенез, клинические синдромы, осложнения. Неотложная помощь при острых отравлениях. Профилактика. Экспертиза трудоспособности

ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	50. Острая и хроническая интоксикации хлорорганическими пестицидами. Патогенез. Клинические синдромы, осложнения. Неотложная помощь при острых отравлениях. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	51. Острая и хроническая интоксикация мышъяксодержащими пестицидами. Патогенез. Клинические проявления, осложнения. Неотложная помощь при острых отравлениях. Профилактика. Трудовые рекомендации.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	52. Интоксикация пестицидами. Острая и хроническая интоксикация производными карбаминовой кислоты. Патогенез. Клинические проявления, осложнения. Неотложная помощь при острых отравлениях. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	53. Интоксикация пестицидами. Острая и хроническая интоксикация нитрофенольными соединениями. Патогенез. Клинические проявления, осложнения. Неотложная помощь при острых отравлениях. Профилактика. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ПК-2 ПК-5 ПК-6	54. Понятие о производственной вибрации, физические показатели, ее характеризующие. Гигиеническая характеристика производственной вибрации.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	55. Вибрационная болезнь. Потенциально опасные производства и профессии. Этиология. Патогенез. Классификация вибрационной болезни.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	56. Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации. Классификация. Основные клинические синдромы, Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	57. Вибрационная болезнь от воздействия комбинированной вибрации. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	58. Вибрационная болезнь от воздействия общей вибрации. Классификация. Основные клинические синдромы. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ПК-2 ПК-5, ПК-6	59. Вибрационная болезнь, меры профилактики. Основные методы диагностики вибрационной болезни
ПК-2 ПК-5 ПК-6	60. Производственный шум, его физические характеристики. Гигиеническая характеристика производственного шума. Влияние шума на организм работников.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	61. Специфические изменения при воздействии производственного шума: двустороннняя нейросенсорная тугоухость. Клиника, . Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9, ПК-2, ПК-5, ПК-6	62. Влияние ультразвука на организм работающих. Основные клинические синдромы. Диагностика и профилактика.

ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	63. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием биологического фактора: антибиотиков. Потенциально опасные производства и профессии. Основные клинические синдромы, методы диагностики. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	64. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием биологического фактора: грибов-продуцентов, ферментов. Потенциально опасные производства и профессии. Основные клинические синдромы, методы диагностики. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	65. Воздействие инфразвука на организм работающих. Основные мероприятия, направленные на профилактику влияния инфразвука на работающих.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	66. Декомпрессионная (кессонная) болезнь. Патогенез. Основные клинические формы. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	67. Высотная болезнь. Патогенез заболевания. Основные клинические синдромы. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9, ПК-2	68. Лабораторные и функциональные методы исследования, используемые при диагностике профессиональных болезней
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	69. Заболевания, связанные с воздействием неблагоприятных микроклиматических условий производства. Тепловое поражение (острые, подострые, хронические). Основные клинические синдромы. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	70. Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием низких температур. Клиника и диагностика. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6	71. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием электромагнитных волн радиочастотного диапазона. Патогенез. Клиническая картина. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	72. Заболевания, вызванные воздействием лазерного излучения. Виды лазеров, их применение в разных производствах. Патогенез заболевания. Клиника и принципы лечения. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	73. Заболевания, вызванные воздействием ультразвука. Патогенез. Клиническая картина. Лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.

ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	74. Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием биологических факторов. Общая характеристика основных производственных биологических факторов. Заболевания, вызываемые антибиотиками, грибами-продуцентами и продуктами микробиологического синтеза.
ПК-2 ПК-5 ПК-6	75. Профессиональные заболевания кожи и ее придатков, связанные с воздействием биологических факторов, обладающих аллергенным действием (аллергический контактный дерматит, экзема, аллергическая крапивница, фотоконтактный дерматит). Потенциально опасные производства и профессии.
ПК-2 ПК-5 ПК-6	76. Профессиональные инфекционные заболевания. Туберкулез. Вирусные гепатиты. Клиника, экспертиза трудоспособности, профилактика.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6	77. Профессиональные онкологические заболевания. Общая характеристика канцерогенной опасности на производстве.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	78. Заболевания кожи, связанные с воздействием химических и физических факторов. Основные нозологические формы. Принципы диагностики, лечения и профилактики.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	79. Профессиональные лучевые поражения кожи Клинические проявления. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	80. Злокачественные новообразования соответствующих локализаций, связанные с воздействием ионизирующего излучения на производстве. Принципы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности и реабилитация.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	81. Заболевания, вызываемые воздействием ионизирующих излучений. Хроническая лучевая болезнь. Классификация лучевой болезни. Клиника и диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	82. Заболевания, связанные с воздействием антибиотиков, грибов-продуцентов, белково-витаминных концентратов, кормовых дрожжей, комбикормов. Клиника и диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	83. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Полинейропатия верхних и нижних конечностей, связанная с воздействием функционального перенапряжения. Клиника и диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	84. Профессиональные миофиброзы предплечья и плечевого пояса. Патогенез. Клиника и диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности.

ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	85. Эпикондилез надмыщелка плечевой кости. Патогенез. Клиника и диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	86. Профессиональный бурсит. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика. Профессиональные остеонекрозы. Диагностика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	87. Профессиональные заболевания от перенапряжений и перегрузок опорно - двигательного аппарата. Плече-лопаточный периартроз. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	88. Интоксикация продуктами переработки нефти. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.
ПК-2 ПК-5 ПК-6	89. Условия и особенности формирования профессиональных заболеваний у работников сельского хозяйства. Структура профессиональных заболеваний. Профилактические меры.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	90. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Хронический крепитирующи теносиновит кисти и запястья (общего разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.
ПК-2 ПК-5 ПК-6	91. Профессиональные заболевания медицинских работников. Структура профессиональных заболеваний. Основные клинические формы заболеваний. Методы профилактики.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	92. Профессиональные онкологические заболевания (рак кожи, рак мочевого пузыря). Ведущие факторы, вызывающие перечисленные новообразования. Дифференциальная диагностика. Меры профилактики.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	93. Профессиональные онкологические заболевания (рак легких, рак печени, новообразования костей). Ведущие факторы, вызывающие перечисленные новообразования. Дифференциальная диагностика. Меры профилактики.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	94. Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием гепатотропных веществ. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5	95. Промышленные яды, их классификация. Пути поступления ядов в организм человека. Токсикокинетика, токсикодинамика ядов в организме. Понятие о «летальном синтезе».
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6 ПК-10	96. Профессиональные дерматозы. Классификация профессиональных дерматозов. Лечение. Профилактика.

ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	97. Заболевания, связанные с воздействием электромагнитного поля. Основные клинические синдромы, возникающие от воздействия электромагнитных полей. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	98. Координаторные неврозы. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.
ПК-2 ПК-5 ПК-6	99. Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием химического фактора. Комбинированное, сочетанное, комплексное воздействия на организм работающего. Профилактика.
ОПК-9 ПК-2, ПК-5 ПК-6, ПК-10	100. Латексная аллергия. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.

5. Ситуационные задачи по дисциплине «Факультетская терапия, профессиональные болезни»

5. 1 Ситуационные задачи по модулю «Факультетская терапия»

Код компетенций	Задачи
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1** Больной П. 18 лет, учащийся, 3 недели тому назад выписан из инфекционной больницы, где лечился по поводу скарлатины. После переохлаждения заметил уменьшение выделения и изменение цвета мочи. Объективно: кожные покровы бледные. Пастозность лица. В легких везикулярное дыхание. Пульс 100 в мин., ритмичный. АД - 120/90 мм рт. ст. Границы сердца не изменены. Тоны сердца чистые, звучные. Печень не увеличена. Почки не пальпируются. Симптом поколачивания в проекции почек слабо положительный с обеих сторон. Данные лабораторных исследований: Анализ крови: Эр. - 3, 6 $\cdot 10^{12}$, Нв. - 109 г/л, Цв. п. - 0, 9; Л. - 9 $\cdot 10^{9}$ /л, э. -4% п-3%, с - 60%, лимф. - 25%, мон. - 8%, СОЭ - 30 мм/час. Мочевина крови - 6,67 ммоль/л, креатинин - 156 мкмоль/л, фибриноген - 4 г/л, холестерин - 4, 16 ммоль/л, СРБ ++ Анализ мочи: цвет имеет красноватый оттенок, уд. вес 1026, белок 0, 99‰, эр. - свежие и выщелоченные сплошь в п. зр. Клубочковая фильтрация при пробе Реберга-Тареева - 70 мл/мин. ЭКГ - Синусовая тахикардия. Осмотр окулиста: Глазное дно не изменено. **Вопросы:** 1. Сформулируйте диагноз. 2. Назовите заболевания, при которых чаще всего встречается гематурия. 3. Объясните патогенез заболевания. 4. Какие осложнения характерны для данного заболевания? 5. Показана ли больному “пульс-терапия”? 6. Назначьте патогенетическое лечение (выпишите рецепты). 7. Какие методы определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) используются в клинической практике. 8. Назовите курорты Башкортостана для лечения больных с данной патологией.
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2** Больной С. 26 лет, экспедитор, доставлен по скорой помощи в хирургическое отделение с жалобами на повышение температуры до 38, 8^{0} С, выраженные боли в животе (больше

	справа), сухой кашель, одышку, общую слабость, однократную рвоту. Заболел остро 15/X-2014г. после переохлаждения. Появился озноб, головная боль, повышение температуры тела до 40^0 С. После приема аспирина стало легче, но 16/X утром появились сильные боли в животе, вызвал "скорую помощь" и был доставлен в стационар с подозрением на острый живот. В анамнезе - хронический холецистит. Объективно: состояние тяжелое. Гиперемия щек, более выраженная справа, герпетические высыпания на носу, цианоз губ. ЧД - 32 в минуту. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. Голосовое дрожание справа в нижних отделах несколько усилено. Укорочение перкуторного звука справа ниже угла лопатки и в подмышечной области, там же ослабленное дыхание, крепитация, шум трения плевры. Тоны сердца ритмичные, приглушены, ЧСС - 98 в мин., АД- 100/60 мм рт. ст. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье, симптомов раздражения брюшины нет. Данные лабораторных исследований: Общий анализ крови: Эр. - 5, $2 \cdot 10^{12}$ /л, Нв - 142 г/л, Л. - 18 $\cdot 10^9$ /л, э. - 1%, п. - 22%, с. - 64%, лимф. - 7%, мон. - 6%, токсигенная зернистость нейтрофилов, СОЭ- 38 мм/час **Вопросы:** 1. Какое заболевание наиболее вероятно у больного? 2. Назовите этиологические факторы и особенности патогенеза болезни. 3. Объясните причину появления у больного болей в правом подреберье? 4. Составьте план обследования. 5. Назовите возможные осложнения болезни. 6. Назовите основные симптомы инфекционно-токсического шока. 7. Составьте план лечения (выпишите рецепты). 8. Перечислите побочные действия антибиотиков.
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3** Больная Ж. 30 лет, кондуктор автобуса, поступила в стационар с жалобами на отеки лица, поясницы и нижних конечностей, сухость во рту, жажду, уменьшение количества мочи, общую слабость. Три года назад после перенесенной ангины впервые был обнаружен белок в моче, при повторных исследованиях количество выделяемого белка нарастало. Появились отеки на лице. Лечилась в больнице по поводу заболевания почек. Ухудшение состояния наступило 2 недели назад после перенесённой ОРВИ. Объективно: состояние средней степени тяжести. Отмечается бледность и сухость кожных покровов. Выраженные отеки на лице, нижних конечностях, в области поясницы. В нижних отделах легких - ослабленное везикулярное дыхание, влажные

	мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения, 70 ударов в минуту. АД - 125/75 мм рт. ст. Печень не увеличена. Данные лабораторных исследований: Анализ крови: Эр. 3, 7 · 10^{12}/л, Нв. - 105 г/л, Цв. пок. - 0, 85, Л. - 6, 8 · 10^{9}/л, СОЭ - 40 мм /час, лейкограмма без особенностей. Б/х анализ крови: Общий белок 60 г/л, альбумины 40%, холестерин - 10, 1 ммоль/л, мочевина - 8, 2 ммоль/л, креатинин - 205 мкмоль/л. Анализ мочи: прозрачная, относительная плотность - 1021, реакция кислая, белок - 6, 6‰, эр. выщелоченные 5-8 в п. зр., Л. - 2-3 в поле зрения, цилиндры гиалиновые и зернистые - 5-6, восковидные - 2-3 в п. зр. **Вопросы:** 1. Назовите основные синдромы 2. Сформулируйте диагноз. 3. Укажите этиологию заболевания. 4. Что означает «нефротический синдром» (критерии) ? 5. Какие дополнительные методы исследования необходимы? 6. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 7. Назовите осложнения данного заболевания. 8. Составьте план лечения больной (выпишите рецепты).
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10;ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №4** Больная А. 38 лет, продавец поступила в клинику с жалобами на озноб, резкую слабость, повышение t^0 тела до 39, $5^{0,}$ кашель с гнойной мокротой в количестве 30-40 мл в сутки, тошноту. Заболела остро, 5 дней назад после переохлаждения поднялась температура до $38{,}3^0$, появилась боль в правой половине грудной клетки, выраженная одышка, кашель. В анамнезе - перенесенный 2 недели назад грипп. Объективно: общее состояние тяжелое, сознание спутанное. Кожные покровы бледные, акроцианоз. Перкуторно - укорочение легочного звука справа в нижних отделах, аускультативно дыхание везикулярное, усиленное справа ниже угла лопатки. Там же выслушиваются звучные влажные хрипы. ЧД - 36 в 1 минуту. Границы сердца не увеличены, тоны ритмичны, приглушены, тахикардия. ЧСС - 96 в 1 минуту. АД 80/50 мм рт. ст. Живот мягкий, печень не увеличена. Данные дополнительных исследований: Анализ крови: Эр. - 4, 8 · 10^{12}/л, Нв - 140 г/л, Цв. п. - 0, 9, Л. - 18 · 10^{9} /л, э. -1%, п. -22%, с. - 58%, л. - 12%, м. - 7%, токсигенная зернистость нейтрофилов, СОЭ - 53 мм/час. Биохимический анализ крови: общий белок 68 г/л, альбумины - 44%, глобулины: α_1 - 4%, α_2 -12%, β-14%, γ - 26%. Се-

	ромукоиды - 600 ед., СРБ +++ Анализ мокроты: гнойная, желтовато-зеленоватого цвета, микроскопически - лейкоциты в большом количестве. R-графия грудной клетки: выявляется обширная полисегментарная инфильтрация легочной ткани справа ($S_{6, 8, 9, 10}$) с участками просветления. **Вопросы:** 1. Выделите основные клинические синдромы. 2. Оцените тяжесть состояния больного. 3. Дайте интерпретацию рентгенологических и лабораторных данных. 4. Сформулируйте клинический диагноз. 5. Назовите наиболее вероятные этиологические факторы заболевания у больной. 6. Назовите возможные осложнения данного заболевания. 7. Что такое респираторный дистресс-синдром? 8. Назначьте лечение больной (выпишите рецепты).
ПК-6; ПК -5, ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №5** Больной И. 38 лет, слесарь-монтажник, поступил в стационар с жалобами на головные боли, тошноту, рвоту. В анамнезе частые ангины. В возрасте 18 лет перенес острый нефрит, заболевание протекало с большими отеками, макрогематурией, повышением АД. Объективно: кожные покровы бледные, сухие. Веки отечны. Лицо пастозно. В легких везикулярное дыхание. Пульс - 96 в мин., ритмичный, напряжен. АД - 200/140 мм рт. ст. Сердце расширено в поперечнике за счет левых отделов. Тоны сердца звучные. Акцент II тона на аорте. Печень и селезенка не увеличены. Почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный. Данные лабораторно-инструментальных исследований: Анализ крови: Эр. -2, 5 · 10^{12}/л, Нв - 75 г/л, Цв. п. - 0, 9, Л. - 7, 0 · 10^{9}/л, Э. - 2% п. -3% с/я - 70%, лимф. - 20%, м. - 5%, СОЭ - 35 мм/час. Б/х анализ крови: мочевина - 12, 66 ммоль/л, креатинин - 305, 04 мкмоль/л, калий - 4, 6 ммоль/л, натрий - 132 ммоль/л Анализ мочи: уд. вес - 1006, белок - 0, 165‰, Эр. - 3-5 в п. зр., гиал. цилиндры - единичные. Проба Зимницкого: Дневной диурез - 400 мл, ночной диурез - 600 мл, колебания уд. веса - 1006-1011. Проба Реберга-Тареева:суточное количество мочи - 1200 мл, креатинин крови 305, 2 мкмоль/л, креатинин мочи - 698, 3 ммоль/л, клубочковая фильтрация - 23 мл/мин., канальцевая реабсорбция - 96%. ЭКГ: признаки гипертрофии левого желудочка, метаболические нарушения в миокарде. Глазное дно: отек дисков зрительных нервов, сужение и извилистость артерий, многочисленные кровоизлияния, в пара-

	макулярной области - группа белых очажков. **Вопросы:** 1. Сформулируйте диагноз. 2. Назовите основные клинические формы данного заболевания. 3. Оцените показатели пробы Зимницкого и Реберга-Тареева. 4. Какие методы определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) используются в клинической практике. 5. Назовите осложнения болезни. 6. Перечислите основные принципы диеты при данном заболевании 7. Назовите четырехкомпонентную схему лечения данного заболевания. 8. Назначьте лечение больному (выпишите рецепты).
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №6** Больная Д., 45 лет, жалуется на интенсивные боли в правом подреберье, тошноту, рвоту с наличием в желудочном содержимом желчи, повышение температуры до 37, 5^0С. Из анамнеза: в течение 5 лет отмечает периодические боли в правом подреберье, связанные с погрешностями в диете, купирующиеся приемом но-шпы, аллохола. Ухудшение состояния наступило два дня назад после употребления копченой колбасы. Объективно: состояние средней тяжести. Повышенного питания (ожирение 2 степени). Кожные покровы и видимые слизистые субиктеричны. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД-20 в/мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. ЧСС-88 в/мин. АД-115/70 мм рт. ст. Живот несколько вздут, мягкий, болезненный в правом подреберье, в проекции желчного пузыря. Положительные симптомы Мюсси, Кера, Мерфи. Печень не увеличена. **Вопросы:** 1. Ваш предварительный диагноз. 2. Как определяются симптомы Кера, Мерфи, Мюсси-Георгиевского? 3. Назначьте план обследования 4. Какие факторы риска развития заболевания имеются у данной пациентки? 5. Назначьте лечение (выпишите рецепты). 6. Определите меры профилактики 7. Дайте рекомендации по санаторно-курортному лечению 8. Определите прогноз.
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №7**

	Больная С. 30 лет, учительница, доставлена в клинику машиной скорой помощи с жалобами на ощущение “стеснения в груди”, затрудненное дыхание (особенно затруднен выдох), кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой. Больной себя считает около 7 лет, развитие заболевания связывает с хроническим бронхитом. Приступы удушья возникают чаще ночью, к утру. Раньше приступы снимались ингаляцией сальбутамола, в последнее время они участились, сделались более продолжительными и купируются инъекциями эуфиллина. Ухудшение состояния отмечает после перенесенной ОРВИ. Объективно: вид больной испуганный. Положение вынужденное. Кожные покровы бледные, влажные. Дыхание затрудненное, с участием вспомогательных мышц, сопровождается слышными на расстоянии свистящими хрипами. Число дыханий - 24-26 в минуту. Грудная клетка бочкообразной формы, над легкими перкуторно - коробочный звук. При аускультации выслушивается большое количество сухих свистящих хрипов на фоне ослабленного дыхания. Пульс учащен, малого наполнения. АД - 100/60 мм рт. ст. Границы сердца расширены вправо на 1-1, 5 см, тоны приглушены, тахикардия. Печень выступает на 2 см из-под реберной дуги. Данные лабораторных исследований: Анализ крови: Эр. - 3, 8 · 10^{12}/л; Нв - 132 г/л, Л. - 7, 8· 10^{9}/л; Э. - 12%, п - 4%, с. - 36%, л. - 42%, м. - 6%, СОЭ - 15 мм/час. Анализ мокроты. Мокрота слизистая, тягучего характера. При микроскопии определяются лейкоциты. R-графия грудной клетки: повышенная прозрачность легочной ткани, усиление легочного рисунка. **Вопросы:** 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз больной. 2. Назначьте лечебные средства для купирования приступа удушья. 3. Какое лечение можно рекомендовать в межприступном периоде? 4. Какие дополнительные исследования необходимы для уточнения диагноза? 5. Назовите нарушения функции внешнего дыхания, характерные для данного заболевания. 6. При каких заболеваниях могут развиться подобные симптомы? 7. Какие иммунологические и неиммунологические механизмы участвуют в развитии заболевания? 8. Какие осложнения могут угрожать больной?
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА№ 8** Больная С. 56 лет обратилась к врачу с жалобами на головные боли, сердцебиение, одышку при физической нагрузке (подъем по лестнице на 1 этаж, ходьба в быстром темпе на расстояние более 50 метров), нестабильность артериального давле-

	ния с тенденцией к гипертензии (отмечает повышение показателей в пределах 160/100 – 195/110 мм. рт. ст.). Из анамнеза известно, что пациентка страдает артериальной гипертензией на протяжении 10 лет. Год назад у больной была транзиторная ишемическая атака. Тем не менее антигипертензивные медикаментозные препараты, назначенные ранее врачом, в последние 2 месяца принимала нерегулярно, допуская пропуски в приеме лекарств продолжительностью до нескольких дней. Наследственность по артериальной гипертензии и мозговому инсульту отягощена: отец умер от инсульта в возрасте 54 лет, мать – жива (76 лет), также страдает артериальной гипертензией с 55 летнего возраста. Объективно: Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Кожные покровы чистые, обычной окраски, легкий акроцианоз Индекс массы тела 34, 3 кг/м^2. Окружность талии 104 см, окружность бедер 120 см. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичны, акцент II тона над аортой. Пульс – 88 в мин. АД – 160/112 мм. рт. ст. Левая граница смещена влево на 2 см. от средне-ключичной линии. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена, отеков нет. Дизурических явлений нет. Симптомы поколачивания по поясничной области отрицателен с обеих сторон. Лабораторно-инструментальные данные: Анализ крови общий – без патологии; биохимический анализ крови (общий холестерин - 7, 2 ммоль/л, Триглицериды - 2, 7 ммоль/л (норма <1, 7 ммоль/л), ХС-ЛПВП – 1, 0 ммоль/л (норма > 1, 2 ммоль/л), ХС-ЛПНП – 4, 6 ммоль/л (норма < 3, 3 ммоль/л) ; глюкоза натощак – 5, 2 ммоль/л; креатинин – 88 мкмоль/л (норма 50-98 мкмоль/л), СКФ (по формуле CKD-EPI) = 63 мл/мин. **Вопросы:** 1. Предположите наиболее вероятный диагноз с указанием степени и стадии болезни. 2. Обоснуйте сформулированный Вами диагноз 3. Перечислите факторы сердечно-сосудистого риска, имеющиеся у больной. 4. Назовите органы –мишени, пораженные у пациентки. 5. Укажите диагностические методики, которые возможно применить для определения пораженности сосудов при гипертонической болезни. 6. Составьте план дополнительного лабораторно-инструментального исследования пациентки. 7. Препараты каких групп антигипертензивных средств Вы бы рекомендовали пациентке в составе комбинированной терапии. Свой выбор обоснуйте. 8. Назовите противопоказания к применению ингибиторов АПФ.
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №9**

	Больной К. 47 лет, инженер, обратился к участковому врачу с жалобами на боли сжимающего характера за грудиной и одышку при физической нагрузке, общую слабость, частые головокружения, головные боли, склонность к обморочным состояниям. Считает себя больным в течение 5 лет, когда появились вышеуказанные жалобы. К врачу не обращался. Принимал валидол, корвалол. В детстве - частые ангины. Во время учебы в институте при прохождении медицинского осмотра выявлялся "шум в сердце", но углубленного обследования не проводилось. Ухудшение состояния связывает с физическим перенапряжением во время ремонта квартиры. Объективно: Кожные покровы бледные. Над легкими - везикулярное дыхание. При пальпации области сердца - "кошачье мурлыканье" во II межреберье справа. Границы сердца смещены влево до передней подмышечной линии. Тоны сердца приглушены, II т. над аортой ослаблен, здесь же выслушивается грубый систолический шум, иррадиирующий на сосуды шеи, короткий систолический шум на верхушке сердца. ЧСС - 76 в мин. Пульс - 76 в мин. АД - 110/80 мм рт. ст. Пальпация живота безболезненна. Печень у края реберной дуги. **Вопросы:** 1. Сформулируйте предварительный диагноз. 2. Какие методы исследования необходимы для уточнения диагноза? 3. При каких заболеваниях выявляется симптом "кошачьего мурлыканья"? 4. Объясните причину обморочных состояний у больного. 5. Нарисуйте ЭКГ, характерную для данного заболевания. 6. Объясните причину появления сжимающих болей в сердце у больного. 7. Какие осложнения угрожают больному? 8. Назначьте лечение (выписать рецепты).
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА№ 10** Мужчина Б. 40 лет, обратился за медицинской помощью с жалобами на общую слабость, одышку при небольшой физической нагрузке. Из анамнеза заболевания. В течение нескольких последних месяцев стал отмечать нарастание одышки, появление ее при обычных нагрузках, умеренной ходьбе. Из анамнеза жизни: Работает учителем. У отца – хронический бронхит. Не курит. Объективно: Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. Положение активное с ограничением двигательной активности из-за слабости и одышки. Пониженного питания. ИМТ 19 кг/м^2. Кожные покровы обычной окраски. Пульсоксиметрия: SaO_2 95%. ЧД-18 в мин. в покое. Грудная клетка бочкообразная. Над легкими перкуторный звук с коробочным оттенком. При аускультации в легких дыхание везикулярное ослабленное, при форсированном дыхании появляются единичные

	сухие свистящие хрипы. Границы сердца в пределах нормы, тоны сердца умеренно приглушены, ритм правильный. ЧСС=Пульс= 80 уд. в мин., АД - 120/80 мм рт ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Данные лабораторно-инструментальных исследований: общий анализ крови: эритроциты - 4, 3 х$\cdot 10^{12}$/л, Нв -140 г/л, лейкоциты 9, 0 х 10^{9} /л, эозинофилы – 1%, п/яд. - 3%, с/яд. - 70%, лимфоциты-21 %, моноциты- 5, СОЭ - 5 мм/час, ЭКГ: Ритм синусовый, ЧСС 80 мин. Рентгенография органов грудной клетки: Отмечается усиление легочного рисунка, расширение межреберных промежутков, уплощение куполов диафрагмы. Очаговые и инфильтративные тени не определяются. Спирография (после пробы с бронходилататором): индекс Тиффно 62%, ОФВ1 - 54% **Вопросы**: 1. Обоснуйте и сформулируйте предварительный диагноз. 2. Обоснуйте и составьте план дополнительных методов обследования. 3. Оцените данные дополнительных методов обследования. 4. Определите степень тяжести по спирографическим данным 5. Определите фенотип данного заболевания 6. Определите факторы риска возникновения и прогрессирования заболевания у данного пациента. 7. Перечислите медикаментозные средства лечения данной патологии. *8.* Перечислите методы профилактики данной патологии
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №11** Больной К. 38 лет, инвалид II группы, поступил на стационарное лечение по направлению участкового терапевта с жалобами на повышение температуры тела до 38-39^{0}, сопровождающееся ознобами, профузным потом, одышку и сердцебиение при ходьбе, приступы удушья по ночам. В анамнезе - ревматизм с 12-летнего возраста, в 18 лет установлен диагноз митрального порока сердца. Ежегодно лечился стационарно. Последние 4 года усилилась одышка, появились отеки на ногах. Постоянно принимает мочегонные и сердечные гликозиды. Состояние резко ухудшилось месяц назад после удаления зуба: появились ознобы, фебрильная температура. Лечился в поликлинике с диагнозом ОРВИ. Прием аспирина, амоксициллина, зинацефа был неэффективным. Объективно: Состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, на коже предплечий, плеч петехиальные кровоизлияния, акроцианоз, отеки голеней. Симптом Мюссе. В легких везикулярное дыхание, незвучные мелкопузырчатые хрипы в нижнебоковых отделах. Верхушечный толчок усилен, пальпируется в

	VII межреберье. На верхушке сердца определяется диастолическое дрожание. Границы сердца расширены влево, вниз, вверх и вправо. Аускультативно: ослабление I тона, систолический и диастолический шумы на верхушке. Над аортой II тон резко ослаблен, выслушивается мягкий, дующий диастолический шум, который проводится в точку Боткина-Эрба. ЧСС - 95 в мин. АД 160/40 мм рт. ст. Пульс скорый, высокий, аритмичный, 80 в 1 мин. Печень выступает на 5 см из-под края реберной дуги. Симптом Пастернацкого слабо положительный с обеих сторон. Данные дополнительных исследований: Общий анализ крови: Эр - 2, 1 $\cdot 10^{12}$/л, Нв - 92 г/л, Л. - 15 $\cdot 10^{9}$/л, Э. - 2%, п - 12%, с. - 64%, л. -16%, м. - 6%, СОЭ - 54 мм/час. Общий анализ мочи: уд. вес. - 1013, белок - 1, 65‰, Эр. - 25-40 в п/зр., цил. гиалиновые - 6-7 в п/зр. **Вопросы:** 1. Сформулируйте предварительный диагноз. 2. Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточнения диагноза. 3. Объясните причину ухудшения состояния больного. 4. Что такое симптом Мюссе? При каких заболеваниях он встречается? 5. Объясните причину выявленного у больного геморрагического синдрома. Какими клиническими симптомами он проявляется? 6. О каких нарушениях гемодинамики свидетельствует АД больного? С наличием какого порока сердца оно связано? 7. Назовите “периферические” признаки выявленного у больного порока сердца. 8. Назначьте лечение больному.
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 12** Больной Б. 35 лет, доставлен машиной скорой помощи в тяжелом состоянии с жалобами на ознобы, потливость, высокую температуру - 39-39, 5°в течение недели, боли в грудной клетке, кашель с трудно отхаркиваемой мокротой. Накануне поступления в больницу больной отмечает выделение мокроты в количестве 100 мл, неприятного запаха. Болен в течение 3 недель - перенес грипп, течение которого осложнилось пневмонией. Лечился не регулярно. В анамнезе - злоупотребление алкоголем. Объективно: Состояние тяжелое. Пониженного питания. Кожные покровы бледно-землистой окраски, влажные. Акроцианоз. Отмечается отставание левой половины грудной клетки при дыхании. ЧД-24 в мин. Укорочение перкуторного звука слева ниже угла лопатки. При аускультации - ослабленное дыхание, мелкопузырчатые хрипы слева, после откашливания мокроты отмечается появление амфорического дыхания. Границы сердца в пределах нормы, тоны сердца ритмичные, умеренно приглушены. Пульс - 100 уд. в мин., тахикардия, АД - 100/60 мм. рт. ст. Живот мягкий печень не увеличена. Симптом поколачивания отрицательный.

	Данные лабораторно-инструментальных исследований: Анализ крови: Эр. - 3, 5 · 10^{12}/л, Нв -110 г/л, Л. - 15, 0 · 10^{9} /л, п. - 20%, с. - 62%, лимф. -10 %, м. - 8%, токсигенная зернистость нейтрофилов, СОЭ - 60 мм/час Анализ мочи: уд. вес 1020, белок -0, 66‰, Л. единичные в п/зр. Анализ мокроты: при стоянии расслаивается на 2 слоя. Микроскопически большое количество лейкоцитов и эластических волокон. Рентгенография грудной клетки: Слева определяется округлая, нерезко ограниченная тень с горизонтальным уровнем жидкости. **Вопросы:** 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 2. Перечислите этиологические факторы, способствующие развитию данного заболевания. 3. Проанализируйте результаты дополнительных исследований. 4. Какие осложнения угрожают больному? 5. Назовите критерии инфекционно-токсического шока и неотложную помощь при нём. 6. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 7. Назовите методы верификации возбудителей? 8. Назначьте лечение (выпишите рецепты).
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №13** Больная К. 35 лет, домохозяйка, обратилась к участковому врачу с жалобами на ноющие боли в области сердца, сердцебиение, шум в ушах, слабость, обмороки, извращения вкуса. Больна в течение 3 месяцев - появилась наклонность к обморочным состояниям, при физической нагрузке возникали сердцебиение и одышка, мелькание “мушек” перед глазами. Принимала корвалол, поливитамины, но улучшения не отмечала. Из перенесенных заболеваний отмечает ОРВИ. Беременностей и родов - 4 (последние роды 9 месяцев назад), ребенка кормит грудью. Менструации регулярные, цикл 26 дней, обильные. Объективно: общее состояние относительно удовлетворительное. Положение активное, сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые бледной окраски. Кожа сухая, волосы редкие. Ногти слоистые, уплощены. Трещины в углах рта. В легких дыхание везикулярное, ЧД - 18 в 1 мин. Границы сердца расширены влево на 0, 5 см. Тоны сердца приглушены, тахикардия, на верхушке систолический шум. ЧСС- 98 уд. в 1 мин. АД - 100/70 мм рт. ст. На яремной вене справа выслушивается “шум волчка”. Язык влажный, обложен. Печень не увеличена. Пальпация живота безболезненна. **Вопросы:** 1. Сформулируйте диагноз.

	2. Какое фоновое состояние обусловило развитие заболевания? 3. Объясните механизм развития тканевого сидеропенического синдрома. 4. Объясните механизм появления “шума волчка”. 5. При анализе крови получены следующие данные, оцените их: Эр. - 3, 0 · 10^{12}/л, Нв - 80 г/л, ЦП - 0, 8; лейкоциты – 5, 2 · 10^{9}/л, тромбоциты - 190 · 10^{9}/л, СОЭ - 14 мм/час. 6. Составьте план обследования больной. 7. Тактика лечения (выписать рецепты). 8. Определите меры профилактики заболевания.
(ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №14** Больной В. 68 лет, пенсионер, обратился к участковому врачу с жалобами на боли в эпигастральной области, ощущение жжения и давления под мечевидным отростком грудины. Боль часто иррадирует в область сердца, под левую лопатку, возникает через 20-30 мин. после еды и снимается приемом соды. Беспокоят также тошнота, горечь во рту, отмечается наклонность к запорам. Ухудшение самочувствия отмечает в течение 2-х недель после приема индометацина, назначенного по поводу лечения остеохондроза. Объективно: пониженного питания, кожные покровы чистые, бледные. Над легкими - везикулярное дыхание. Границы сердца расширены влево на 1, 5-2 см. Тоны ритмичные, приглушены, небольшой акцент II тона над аортой. Пульс 80 в минуту. АД - 150/90 мм рт. ст. Язык обложен белым налетом. Живот при пальпации умеренно напряжен в эпигастральной области. Симптом Менделя положителен. Печень не увеличена. **Вопросы:** 1. Выделите синдромы, сгруппировав их из имеющихся симптомов. 2. Сформулируйте предварительный диагноз. 3. Какие дополнительные методы исследования необходимо назначить больному? 4. Назовите прямые и косвенные рентгенологические симптомы данного заболевания. 5. Назовите эндоскопические критерии заболевания. 6. Проведите дифференциальную диагностику со сходными болезнями. 7. Ваша тактика лечения (выпишите рецепты). 8. Назовите возможные осложнения болезни.
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №15** Больной Т. 37 лет, водитель, обратился с жалобами на болевые ощущения в эпигастральной области, ноющие боли в области сердца, слабость, сердцебиение, одышку при физических нагрузках, мелькание “мушек” перед глазами и головокру-

	жение при перемене положения тела, ломкость волос и ногтей, затруднения при глотании твердой и сухой пищи. Во время службы в армии был оперирован по поводу проводной язвы желудка (по Бильрот II). В дальнейшем периодически беспокоили тошнота, вздутие живота, поносы. Ухудшение состояния отмечает в течение трех месяцев в связи с появлениемвышеуказанных жалоб. Объективно: состояние удовлетворительное. Пониженного питания. Кожные покровы и видимые слизистые бледной окраски. Кожа сухая. Ногти уплощены с поперечной исчерченностью. В легких везикулярное дыхание. ЧД - 16 в 1 мин. Тоны сердца приглушены, систолический шум на верхушке. АД - 110/70 мм рт. ст. Пульс - 80 уд. в 1 мин., ритмичный. Трещины в углах рта. Язык влажный, обложен у корня белым налетом. Сосочки языка сглажены. Кариес зубов, альвеолярная пиорея. Живот обычной формы. По средней линии послеоперационный рубец. Нерезко выраженная болезненность в эпигастральной области. Печень, селезенка не пальпируются. Стул оформленный. **Вопросы:** 1. Выделите ведущие синдромы выявленной патологии. 2. При анализе крови получены следующие данные, оцените их: Эр. -3, 0 · 10^{12}/л, Нв - 96 г/л, Ц. П. – 0, 7; Л. - 5, 8 · 10^{9}/л, э. -1%, п-3%, с. - 62%, лимф. - 28%, м. - 6%, СОЭ - 10 мм/час. Сывороточное железо - 6, 8мкмоль/л. 3. Поставьте предварительный диагноз. 4. Какие дополнительные исследования необходимы? 5. Перечислите причины данной патологии и укажите возможную причину заболевания у данного пациента. 6. При изменении какого показателя крови диагноз данного заболевания становится несомненным? 7. Тактика лечения (напишите рецепты). 8. Определите прогноз и методы профилактики заболевания.
(ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №16** Больной К. студент, 19 лет, доставлен машиной скорой помощи с приступом удушья. В анамнезе - периодически возникающие приступы одышки, с появлением свистящих хрипов в груди после контакта с пахучими веществами, воздействия неблагоприятных метеорологических факторов - ветра, холода, сырости. Появлению приступа удушья обычно предшествует сухой кашель, ощущение зуда в носу. Приступ заканчивается усиленным выделением вязкой мокроты. В анамнезе - диатез в детстве, непереносимость некоторых пищевых продуктов, редкие простудные заболевания. Объективно: Положение больного вынужденное, сидячее, с фиксацией плечевого пояса. Набухшие шейные вены. Цианоз губ. В дыхании участвует вспомогательная мускулатура. На расстоянии слышны свистящие хрипы. ЧД - 24 в мин. Под-

	вижность грудной клетки ограничена. При перкуссии с обеих сторон - коробочный звук. При аускультации - масса сухих, свистящих хрипов, дыхание резко ослаблено. Пульс учащен - 105 в мин. Тоны сердца ритмичные, звучные, АД- 110/70 мм рт. ст. Живот безболезненный. Печень не увеличена. Данные лабораторных исследований: Анализ крови: Эр. - 4, 1 · 10^{12} /л; Нв - 138 г/л, Л. - 4 · 10^{9} /л; э. - 22%, п - 2%, с. - 49%, лим. - 22%, м - 5%, СОЭ - 10 мм/час. В мокроте большое количество эозинофилов. **Вопросы:** 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 2. В каком дополнительном обследовании нуждается больной? 3. Назовите мероприятия для купирования приступа удушья. 4. Составьте план лечения в межприступном периоде (выпишите рецепты). 5. При каких заболеваниях могут развиваться подобные симптомы? 6. Назовите нарушения функции внешнего дыхания, характерные для данного заболевания. 7. Трудовые рекомендации больному. 8. Какие иммунологические механизмы участвуют в развитии болезни?
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 17** Мужчина Б. 55 лет, обратился за медицинской помощью с жалобами на общую слабость, одышку при небольшой физической нагрузке, периодический кашель со слизистой мокротой, больше по утрам. Из анамнеза заболевания: Курит 35 лет, по 1 пачке в день. Несколько лет отмечает появление кашля с мокротой по утрам. В течение нескольких последних месяцев стал отмечать нарастание одышки, появление ее при обычных нагрузках, умеренной ходьбе. Из анамнеза жизни: Работает водителем, отмечает на работе частые переохлаждения, воздействие выхлопных газов. У отца – хронический бронхит. Объективно: Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. Положение активное с ограничением двигательной активности из-за слабости и одышки. Повышенного питания. ИМТ 30 кг/$м^2$. Кожные покровы обычной окраски, пальцы в виде «барабанных палочек», ноги в виде «часовых стекол». Пульсоксиметрия: SaO_2 95%. ЧД-18 в мин. в покое. Грудная клетка бочкообразная. Над легкими перкуторный звук с коробочным оттенком. При аускультации в легких дыхание везикулярное ослабленное, при форсированном дыхании появляются сухие свистящие хрипы. Границы сердца в пределах нормы, тоны сердца умеренно приглушены, ритм правильный. ЧСС=Пульс= 80 уд. в мин., АД - 110/70 мм. рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Симптом Пастер-

	нацкого отрицательный. Отеков нет. Стул, диурез без особенностей. Данные лабораторно-инструментальных исследований: общий анализ крови: эритроциты - 4, 5 х·10 ^{12}/л, Нв -140 г/л, лейкоциты 15, 0 х 10 ^{9} /л, эозинофилы – 1%, п/яд. - 3%, с/яд. -70%, лимфоциты-21 %, моноциты- 5, СОЭ - 5 мм/час, общий анализ мочи: уд. вес 1020, белок – отр., лейкоциты единичные в поле зрения. Рентгенография органов грудной клетки: Отмечается усиление легочного рисунка, расширение межреберных промежутков, уплощение куполов диафрагмы. Очаговые и инфильтративные тени не определяются. Спирография (после пробы с бронходилататором) : Индекс Тиффно 62%, ОФВ1 -55% **Вопросы:** 1. Обоснуйте и сформулируйте предварительный диагноз. 2. Обоснуйте и составьте план дополнительных методов обследования. 3. Оцените данные дополнительных методов обследования. 4. Определите степень тяжести по спирографическим данным 5. Рассчитайте и оцените индекс пачка/лет 6. Определите факторы риска возникновения и прогрессирования заболевания у данного пациента. 7. Перечислите медикаментозные средства лечения данной патологии. 8. Перечислите методы профилактики данной патологии
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №18** Больной С. 69 лет, пенсионер. Госпитализирован в клинику с жалобами на боли за грудиной сжимающего характера при ходьбе на расстояние 100-150 м и подъеме на 1 этаж, головокружение, периодические приступы слабости с кратковременной потерей сознания, одышку при ходьбе. Болен в течение 3-х лет. Доставлен бригадой скорой помощи с улицы - был приступ потери сознания “с судорогами” и непроизвольным мочеиспусканием. Объективно: Состояние тяжелое. Акроцианоз. Периферических отеков нет. На фоне везикулярного дыхания небольшое количество влажных хрипов в задне-боковых отделах легких. Перкуторно - расширение границ сердца влево и вправо. Тоны сердца глухие, периодически звучность I тона усиливается (“пушечный тон” Стражеско). Акцент и металлический оттенок II тона на аорте. Пульс ритмичен, напряжен, 42 удара в минуту. АД - 160/80 мм рт. ст. Данные лабораторно-инструментальных исследований: Общий анализ крови: Эр. - 4, 2 ·10^{12} /л, Нв. - 145 г/л, Л. - 6, 3 ·10^{9} /л, СОЭ - 4 мм/час. Лейкоцитарная формула не измене-

	на. Общий анализ мочи: уд. вес- 1014, белок - 0, 033 ‰, л. ед. в поле зрения. ЭКГ: зубцы Р и комплексы QRST регистрируются каждый в своем ритме, соответственно 88 и 42 в минуту, часть зубцов Р накладывается на QRST. ***Вопросы*:** 1. Сформулируйте диагноз. 2. Какой вид аритмии имеется у больного? 3. Что такое "пушечный тон" Стражеско? 4. Объясните причину приступов потери сознания у больного. Как называются эти приступы? 5. Ваша тактика во время приступа потери сознания. 6. Назначьте лечение больному в межприступный период (выпишите рецепты). 7. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 8. Какое лечение показано больному при неэффективности консервативной терапии?
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №19** Больной В. 36 лет, строитель, госпитализирован с жалобами на боли в грудной клетке справа, сухой кашель, одышку, подъем t^0 до 39^0, озноб, резкую слабость. Заболел остро, после переохлаждения. Вчера вечером почувствовал озноб, слабость, повысилась T^0 тела до $38,5^0$. Принял аспирин, чай с малиной. После временного улучшения к утру состояние вновь ухудшилось, появился сухой болезненный кашель, вызвал "скорую помощь". Объективно: общее состояние тяжелое. Правильного телосложения, пониженного питания. Кожные покровы горячие, влажные, гиперемия правой щеки. На губах герпетические высыпания. Отставание правой половины грудной клетки в акте дыхания. Над нижнебоковой поверхностью правого легкого - усиление голосового дрожания, укорочение перкуторного звука, аускультативно - дыхание с бронхиальным оттенком, крепитация. ЧД - 32 в 1 мин. Границы сердца не изменены, тоны приглушены, тахикардия, ритм правильный. Пульс - 112 в 1 мин. АД - 90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье, печень у края реберной дуги. Данные лабораторно-инструментальных исследований: Анализ крови: Эр. - $4,2 \cdot 10^{12}$/л; Нв. - 126 г/л; Л. - $12,9 \cdot 10^{9}$/л; э. - 1%, п - 16%, с. - 62%, л. - 15%, м - 6%, токсигенная зернистость нейтрофилов, СОЭ - 58 мм/час. Анализ мочи: - белок - 0, 66 ‰, Л. - 3-4-5 в п. /зр., гиал. цилиндры - 2-6 в п. /зр. R-графия грудной клетки: справа средняя доля ($S_{4,}$ $S_{5)}$ гомогенно затемнена ЭКГ: синусовая тахикардия, нарушение метаболических про-

	цессов в миокарде. **Вопросы:** 1. Какое заболевание наиболее вероятно у больного? 2. Оцените данные дополнительных исследований. 3. О каких других заболеваниях можно думать по клиническим и лабораторным данным? 4. Какие дополнительные обследования необходимы для уточнения диагноза? 5. Обоснуйте и сформулируйте клинический диагноз. 6. Назовите возможные этиологические факторы данного заболевания. 7. Назначьте лечение (напишите рецепты). 8. Какие осложнения могут угрожать больному?
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №20** Больная Н. 22 года, служащая, обратилась к врачу с жалобами на отеки, олигурию, изменение цвета мочи, которые появились через 2 недели после ангины. До настоящего времени ничем не болела. Объективно: кожные покровы бледные. Отеки на лице, ногах, пояснице. Рост 164 см, вес 76 кг (до болезни 67 кг). В легких везикулярное дыхание. Пульс 98, ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 160/90 мм рт. ст. Поперечник сердца расширен за счет левых отделов. Тоны сердца приглушены, на верхушке и в точке Боткина короткий систолический шум. Печень не увеличена. Почки не пальпируются. Симптом поколачивания положительный с обеих сторон. Данные лабораторных исследований: Анализ крови: Эр. - 3, 7 □ 10 12 /л, Нв - 126 г/л, Цв. пок. - 1, 0, Л. - 7, 0 □ 10 9 /л, э. - 4%, п/я. - 1%, с/я. - 64%, лимф. - 29%, м. - 2%, СОЭ - 48 мм/час. Б/х анализ крови: мочевина - 32 ммоль/л, холестерин - 11, 6 ммоль/л, фибриноген - 10 г/л, креатинин - 280 мкмоль/л. Общий белок - 41 г/л, А - 40%, Г - 60%, □1 - 6%, □2 -17%, □- 12%, □ - 25%. Сахар крови - 4, 5 ммоль/л. LE - клетки в крови не найдены. Анализ мочи: удельный вес 1024, белок - 6, 6‰, Эр. свежие и выщелоченные 20-25 в п. зр., цилиндры - 2-3 в п. зр. Проба Зимницкого: колебания удельного веса 1016-1026, суточный диурез - 700 мл. Проба Реберга-Тареева: суточный диурез - 200 мл, креатинин мочи - 530, 4 ммоль/л, креатинин крови - 288, 4 мкмоль/л, клубочковая фильтрация - 42 мл/мин., канальцевая реабсорбция – 98 %. ЭКГ: синусовая тахикардия - 100 в минуту. Метаболические нарушения в миокарде. Вопросы: 1. Сформулируйте диагноз.

	2. Назовите основные клинические варианты данного заболевания. 3. Назовите этиологические факторы. 4. Основные механизмы патогенеза данного заболевания. 5. Обоснуйте необходимость назначения антикоагулянтной терапии. 6. Перечислите основные принципы диеты при данном заболевании 7. Проведите дифференциальный диагноз данного заболевания с ГЛПС. 8. Назначьте лечение (выпишите рецепты).
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 21** Больная С. 58 лет, жалуется на головные боли, сердцебиение, одышку при небольшой физической нагрузке, ноющие боли в области сердца. В течение 10 лет отмечается высокая артериальная гипертония (АД в пределах 160/100 – 195/110 мм рт. ст). Несмотря на проводимую гипотензивную терапию, отмечаются периодические подъемы артериального давления. Год назад у больной было острое нарушение мозгового кровообращения. В анамнезе – семейно-бытовые и производственные стрессовые ситуации. Наследственность по артериальной гипертензии и мозговому инсульту отягощена (отец умер от инсульта). Объективно: Кожные покровы чистые, обычной окраски, легкий акроцианоз. Повышенного питания. В легких дыхание везикулярное. Пульс - 100 в мин. АД - 190/115 мм рт. ст. Левая граница смещена влево на 2см от среднеключичной линии, тоны сердца приглушены, на верхушке сердца систолический шум, акцент II тона над аортой. Печень не увеличена, отеков нет. Анализ кровиобщий – без патологии. Биохимический анализ крови: холестерин крови - 7, 2 ммоль/л, ЛПНП - 3, 2 ммоль/л, ТГ – 1, 6 ммоль/л, ЛПВН – 0, 8 ммоль/л. Анализ мочи: белок - 0, 33 ‰, единичные эритроциты в поле зрения. Глазное дно – артерии резко сужены, уплотнены, вены полнокровны. ЭКГ – признаки гипертрофии левого желудочка с явлениями систолической перегрузки. **Вопросы:** 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз согласно современной классификации. 2. Какие факторы риска АГ имеются у больной? 3. Какие дополнительные методы исследования необходимо назначить больной? 4. Назовите особенности кардиалгического синдрома при данном заболевании. 5. Поражения каких органов и систем имеются у пациентки?

	6. Назначьте лечение (выпишите рецепты). 7. Профилактика данного заболевания.
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА№ 22** Больной Т., 36 лет, поступил в клинику 10 августа. В течение июля работал в саду за городом, строил дом. Заболел остро 5 августа: температура повысилась до 40 ^{0}С. Жаловался на сильную головную боль, повторную рвоту, боли в области поясницы и живота с 3-го дня болезни, плохой сон, отсутствие аппетита, жажду. С 8 августа стал плохо видеть, появилась сыпь на коже. Объективно. При поступлении в больницу состояние больного тяжелое. Гиперемия лица и плечевого пояса, на боковых поверхностях грудной клетки, на спине обильная петехиальная сыпь, в местах инъекций – обширные кровоподтеки. В склере правого глаза – кровоизлияние. Слизистая ротовой полости сухая, на твердом небе пятнистая энантема. В легких везикулярное дыхание. Пульс 88 уд. в мин., ритмичный, мягкий, АД 110/90 мм рт. ст. Границы сердца не изменены, тоны глухие. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии. Печень своим нижним краем выступает на 3 см из-под реберной дуги, плотная и болезненная. Селезенка не пальпируется. Менингеальных симптомов нет. Суточный диурез: на 7-й день болезни выпил 2200 мл воды, выделил мочи – 750мл, за следующие сутки выделил 350 мл мочи. На 9-й день – 150мл. Жаловался на сухость во рту, резкую слабость, рвоту, боли в пояснице. Пульс 60 уд. в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 130/80мм рт. ст. Общий анализ крови: Эр. - 5, 7 · 10 ^{12}/л, Нв - 136 г/л, Л. - 8, 0 · 10 ^{9}/л, Тромб. - 105· 10 ^{9}/л, СОЭ - 28 мм/час Общий анализ мочи: Относительная плотность – 1008, белок – 3, 3‰, эритроциты свежие 10-12 в п/з, цил. гиалиновые 5-6 в п/з. **Вопросы:** 1. Определите ведущие синдромы в клинике заболевания 2. Поставьте предварительный диагноз 3. Проведите дифференциальную диагностику 4. Какие лабораторные исследования необходимо провести? 5. Перечислите показания для проведения гемодиализа. 6. Какие осложнения характерны для данного заболевания? 7. Назначьте лечение 8. Диспансерное наблюдение
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №23** Больной Ж. 45 лет, руководитель малого предприятия, доставлен кардиобригадой с жалобами на боли жгучего характера за грудиной, сопровождающиеся ощущением нехватки

	воздуха и сердцебиением. Состояние резко ухудшилось 40 минут назад - после сильного стресса появились загрудинные боли. Прием нитроглицерина уменьшил боли на короткое время. Через несколько минут боли вновь усилились и приняли более распространенный характер, с иррадиацией в левую руку и нижнюю челюсть. Появилась резкая слабость, потливость, "страх смерти". Была вызвана скорая помощь. Объективно: Состояние тяжелое. Бледность кожных покровов, акроцианоз. Покрыт холодным потом. Над легкими - везикулярное дыхание, мелкопузырчатые влажные хрипы с обеих сторон. Тоны сердца глухие, аритмичные, ЧСС - 110 в мин. АД - 80/50 мм рт. ст. Пульс - 110 в мин., слабого наполнения, аритмичен. Живот мягкий, печень у края реберной дуги. Отеков нет. Данные дополнительных исследований: Анализ крови: Эр. - 4, 8 $\cdot 10^{12}$ /л, Нв. - 145 г/л, Л. - 13 $\cdot 10^{9}$ /л, СОЭ- 6 мм/час. Миоглобин 128 нг/мл. Положительный тропониновый тест. ЭКГ: Синусовая тахикардия, единичные желудочковые экстрасистолы. В I, II, AVL, V_2 - V_3 -V_4 отв. - сегмент ST в виде монофазной кривой. **Вопросы:** 1. Сформулируйте диагноз. 2. Тактика врача скорой помощи на догоспитальном этапе. 3. Чем обусловлена тяжесть состояния больного? 4. Какие другие осложнения могут угрожать больному? 5. Оцените данные дополнительных исследований. Нарисуйте ЭКГ больного. 6. Современная тактика оказания медицинской помощи больному с данной патологией (выписать рецепты). 7. Какое противоаритмическое средство необходимо назначить больному для профилактики фибрилляции желудочков, при нормальном АД. 8. Назовите факторы риска этого заболевания.
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №24** Больной К., 40 лет, работает слесарем, курит с 18 лет. В течение 4 лет беспокоит надсадный утренний кашель с выделением небольшого количества слизистой мокроты, одышка при умеренной физической нагрузке, утомляемость. Объективно: Состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Повышенного питания. Умеренный диффузный цианоз. Вес 75 кг. Рост 176 см. Пальцы - в виде «барабанных палочек», ногти как «часовые стекла». Грудная клетка бочкообразной формы, надключичные пространства выбухают. Голосовое дрожание ослаблено с обеих сторон Перкуторно над легкими - коробочный звук. Суммарная экскурсия легких - по 4 см с обеих сторон по средней подмышечной линии. Дыхание жесткое с удлиненным выдохом, в нижне-боковых отделах - жужжащие и свистящие хрипы, усиливающиеся при форсированном выдохе. Частота дыхания – 22 в минуту. Пульс - 78 в

	минуту, полный, мягкий, ритмичный, симметричный. Границы сердца - в пределах нормы. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. АД 135/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень не увеличена. *Дополнительные методы обследования:* Общий анализ крови: эритр. 5, $1 \cdot 10^{12}$/л, Hb 161г/л, лейкоциты 6, $5 \cdot 10^{9}$/л, СОЭ 3мм/ч; рентгенограмма органов грудной клетки: легочные поля повышенной прозрачности. Легочный рисунок тяжистый. Корни легких уплотнены, не структурные. Спирография: $ОФВ_1$ /ФЖЕЛ - 59%. Анализ мокроты: консистенция слизистая, вязкая, цвет-серая. Микроскопия- эпителиальные клетки в большом количестве, лейкоциты 5-6 в поле зрения. ЭКГ: Синусовый ритм. ЧСС 84 в 1 мин. Признаки гипертрофии правого предсердия, правого желудочка. **Вопросы:** 1. Выделите основные синдромы. 2. Поставьте и обоснуйте диагноз. 3. Какое осложнение развилось у данного пациента? 4. Назовите этиологические факторы заболевания. 5. Перечислите основные механизмы обструкции бронхов. 6. Назовите методы лечения данного заболевания (выпишите рецепты). 7. Прогноз и исход данного заболевания? 8. Дайте рекомендации по санаторно-курортному лечению.
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА№ 25** Больной К., студент, 20 лет, жалуется на резко выраженную одышку, возникающую в покое и при незначительной физической нагрузке (разговор, перемещение по комнате), сухой приступообразный кашель со скудной, слизистой, трудноотделяемой мокротой, выраженную общую слабость, потливость. Отмечает усиление симптомов одышки и кашля ночью и в ранние утренние часы. Из анамнеза – Ухудшению самочувствия предшествовала 2х недельная поездка в гости к родителям и контакт там с перхотью и шерстью кошки. В прошлом уже отмечал возникновение конъюнктивита, ринита при взаимодействии с кошками. За день до отъезда из родительского дома присоединился сухой кашель. В последующие 2-3 дня интенсивность кашля нарастала, добавилась одышка при небольшой физической нагрузке, резко усилилась слабость, потливость. Температура тела в течение всего периода болезни не повышалась. В прошлом неоднократно отмечал у себя эпизоды затрудненного дыхания во время занятий спортом (игра в футбол, бег), однако за медицинской помощью по этому поводу никогда не обращался. Кроме того страдает весенним поллинозом (имеет рино-конъюнктивальный синдром при цветении ольхи, березы, орешника). В раннем детстве у пациента был диагностирован атопический дерматит, однако в последние 5-6 лет случаев обострения дерматита у пациента не было. Имеется наследственная

	отягощенность по аллергическим заболеваниям: мать и брат больного также имеют атопический дерматит. Объективно: Температура тела 36, 8 градусов Цельсия. Сатурация кислорода 96%. Сознание ясное. Состояние средней степени тяжести. Активность пациента умеренно ограничена из-за выраженной экспираторной одышки. Кожные покровы бледноватой окраски, повышенной влажности. При осмотре грудной клетки отмечается участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц шеи, брюшного пресса), экскурсия грудной клетки снижена до 4 см. ЧД 26 в минуту. Перкуторно по всем легочным полям определяется коробочный звук. Аускультативно над всеми участками аускультации ослабленное везикулярное дыхание. Выслушивается множество сухих свистящих хрипов на вдохе и выдохе, рассеянных по легочным полям с обеих сторон. ЧСС 105 в минут. АД 115/76 мм. рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень по нижнему краю реберной дуги. Отеков нет. Стул и диурез в норме. **Вопросы**: 1. Назовите ведущий клинический синдром у данного пациента 2. Предположите наиболее вероятный диагноз заболевания, ставшего поводом для обращения за медицинской помощью; 3. Обоснуйте сформулированный Вами диагноз 4. Назовите препараты для оказания неотложной помощи пациенту, укажите способы их введения. 5. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. Укажите ключевые тесты, позволяющие подтвердить предварительный диагноз. 6. Расскажите, что из себя представляет бронходилатационный тест, с помощью каких медикаментозных препаратов его проводят. 7. Если предположить, что респираторные симптомы у пациента присутствуют постоянно (круглогодично), назовите основные группы препаратов для базисной терапии заболевания. 8. Что такое аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), показания для проведения АСИТ?
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 26** Больной М., 43 лет поступил в терапевтическое отделение с жалобами на давящие боли за грудиной при быстрой ходьбе, подъеме на 3-5 этажи лестницы. Боли купирует в состоянии покоя в течение 1-2 минут. Заболел 2 недели назад, когда впервые появилась давящая боль в нижней трети грудины при быстром подъеме на 4 этаж, прошедшая в покое через 5 минут. Курит в течение 20 лет. Объективно. Состояние средней тяжести. Сознание ясное, положение активное. Повышенного питания. Кожные покровы бледно-розовые, чистые, отеков нет. Над легкими перкуторно -

	легочный звук. Аускультативно - дыхание везикулярное. Границы относительной тупости сердца: левая - по левой средне - ключичной линии, правая - по правому краю грудины, верхняя - на уровне III ребра. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 120/80 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений-76 в минуту. Живот при поверхностной ориентировочной безболезнный. Размеры печени по Курлову: 9-8-7см. Общий анализ крови и мочи - без патологии. Биохимический анализ крови: холестерин -8, 5 ммоль/л, ЛПНП 3, 3 ммоль/л, ЛПВП – 0, 8 моль/л, аспартатаминотрансфераза- 28ед/л, лактатдегидрогеназа -320ед/л, глюкоза – 5, 2 ммоль/л. Электрокардиограмма. Ритм синусовый. Горизонтальное положение электрической оси сердца. Холтеровское мониторирование ЭКГ: зарегистрированы единичные внеочередные зубцы Р и следующие за ним неизмененные комплексы QRST с неполной компенсаторной паузой. После лечения в стационаре перед выпиской проведена велоэргометрическая проба: при нагрузке мощностью 100 ВТ наблюдалась депрессия сегмента ST-T на 2 мм в отведениях V_1 - V_4. **Вопросы:** 1. Интерпретируйте данные лабораторно-инструментальных методов исследования. 2. Какие современные дополнительные методы диагностики необходимо провести? 3. Сформулируйте диагноз. 4. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать выявленную патологию? 5. Каковы факторы риска заболевания? 6. Укажите основные патогенетические механизмы и теории развития заболевания. 7. Назначьте лечение (выпишите рецепты). 8. Определите прогноз и меры профилактики заболевания.
ПК-5; ПК-6;ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №27** Больной З. 35 лет, сотрудник НИИ, поступил в клинику с жалобами на резкую слабость, головокружение, одышку, сердцебиение, боли в эпигастрии. В анамнезе – патология желудочно-кишечного тракта. Ухудшение состояния связывает с физической работой в саду, после которой почувствовал резкую слабость, потливость, однократно был дегтеобразный стул. С трудом добрался до города, где сразу же вызвал “скорую помощь”. Объективно: кожные покровы и видимые слизистые бледной окраски. Холодный пот. В легких дыхание везикулярное. ЧД 26 в 1 мин. Тоны сердца приглушены, тахикардия с ЧСС 120 в 1 мин., АД 80/60 мм рт. ст. Пульс 120 уд. в 1 мин. Язык суховат, обложен белым налетом. Живот несколько вздут, болезненный в эпигастрии и зоне Шоффара. Симптом Щеткина-

	Блюмберга отрицательный. **Вопросы**: 1. С чем связано ухудшение состояния больного? 2. При каких заболеваниях могут развиться подобные осложнения? 3. Ваша тактика ведения больного. 4. При анализе крови получены следующие данные, оцените их: Эр. - 2, 0 · 10^{12}/л, Нв - 70 г/л, ЦП - 1, 0; Л. - 7, 4 · 10^{9}/л, лейкоформула без особенностей, СОЭ - 14 мм/час. 5. Обоснуйте и сформулируйте диагноз заболевания. 6. Ваша тактика лечения (выписать рецепты). 7. Какие осложнения угрожают больному с данным заболеванием? 8. По какой причине средний объем эритроцитов и ширина распределения эритроцитов по объему при состоянии, развившемся у больного, остаются неизменными?
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 28** Больной 62 лет в экстренном порядке был госпитализирован в блок интенсивной терапии. При поступлении предъявлял жалобы на интенсивные жгучие боли за грудиной, не купирующиеся приемом нитроглицерина. В течение 10 лет беспокоят загрудинные боли при ходьбе через 300-500 метров, преимущественно по утрам, купируются после приема нитроглицерина через 1-2 минуты или в состоянии покоя. Лечился не регулярно. Курит много лет до 10 сигарет в день. Ухудшение отмечает в течение недели, когда участились и усилились загрудинные боли. Несколько часов назад развился болевой приступ, который был купирован лишь наркотическими анальгетиками бригадой скорой помощи. Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное, повышенного питания. Кожные покровы слизистые, бледно-розовые. Периферических отеков нет. Над легкими перкуторно-легочный звук, аускультативно - дыхание везикулярное. Частота дыхания -18 в минуту. Границы относительной тупости сердца: левая - по левой средне-ключичной линии, правая - по правому краю грудины, верхняя - на уровне III ребра. Тоны сердца приглушены, ритмичны. АД 120/75 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений-80 в минуту. Живот безболезненный. Размеры печени по Курлову: 9-8-7см. На электрокардиограмме №1(в 16-00 ч.) - ритм синусовый, $R_I > R_{II} > R_{III}$, $S_{III} > R_{III}$. В отведениях I, avL, V_4, V_5, V_6 определяется снижение сегмента ST на 2 мм и слабоотрицательный зубец Т. На электрокардиограмме №2(в 19-00 ч.) -сегмент ST на изолинии, зубец Т-слабоположительный. *Общий анализ крови:* Эритроциты - 4, 5. 10 12/л; Гемоглобин - 150 г/л; Лейкоциты - 4, 5. 10^{9}/л; Палочкоядерные - 1%; Сегментоядерные - 72%; Лимфоциты - 22%; Моноциты - 5%; СОЭ - 7 мм/час.

	Биохимический анализ крови: АсТ - 22, 5ед/л; АлТ - 18, 4ед/л; КФК - 75 ед/л, КФК-МВ – 8 МЕ/л; ЛДГ - 240 ед/л. При эхокардиографическом исследовании: аорта уплотнена, открытие аортального клапана-1, 8см, левое предсердие –3, 0см, толщина межжелудочковой перегородки-1, 1 см, толщина задней стенки левого желудочка-1, 1, правый желудочек- 2, 3см, левый желудочек: конечный диастолический размер –4, 5см, конечный систолический размер-4, 0см, фракция выброса 56%. **Вопросы:** 1. Оцените данные лабораторных методов исследования. 2. Интерпретируйте изменения электрокардиограммы, эхокардиографии 3. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 4. Проведите дифференциальную диагностику. 5. Какие осложнения угрожают данному пациенту? 6. Какова лечебная тактика? Выпишите рецепты. 7. Назовите этиологические факторы и особенности патогенеза болезни. 8. Определите прогноз.
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №29** Больной М., 49 лет поступил в приемное отделение стационара с жалобами на сильную головную боль, чувство «внутренней дрожи», давящие боли в области сердца, сердцебиение, общее возбуждение. Из анамнеза. В течение 3 ближайших лет отмечает редкие преходящие сжимающие боли за грудиной при длительной ходьбе, подъеме на 3-5 этажи лестницы. Боли купируются в состоянии покоя в течение 1-2 минут. К врачам не обращался, лечение не принимал. Сегодня после стрессовой ситуации на работе появились вышеперечисленные жалобы, личным транспортом пациент был доставлен в приемное отделение стационара. Вредные привычки отрицает. Наследственность не отягощена. Объективно. Состояние средней тяжести. Сознание ясное, положение активное. Повышенного питания. Кожные покровы бледно-розовые, чистые, отеков нет. Над легкими перкуторно - легочный звук. Аускультативно - дыхание везикулярное. Границы относительной тупости сердца: левая - по левой средне - ключичной линии, правая - по правому краю грудины, верхняя - на уровне III ребра. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 170/95 мм рт. ст. на обеих плечевых артериях. Частота сердечных сокращений-96 в минуту. Живот при поверхностной ориентировочной пальпации безболезненный. Размеры печени по Курлову: 9-8-7см. Общий анализ крови и мочи - без патологии. Биохимический анализ крови: холестерин - 6, 5 ммоль/л, ЛПНП 2,9 ммоль/л, ЛПВП – 0,8 моль/л, аспартатаминотрансфераза - 32ед/л, лактатдегидрогеназа - 280ед/л, глюкоза – 4, 5 ммоль/л.

	Электрокардиограмма. Ритм синусовый. ЧСС 93 в мин. Отклонение электрической оси сердца влево. Высокие зубцы R в отведениях V_5, V_6, по амплитуде больше, чем в отведении V_4. Индекс Соколова – Лайона 45мм. Холтеровское мониторирование ЭКГ: в течение суток наблюдались эпизоды депрессии сегмента ST-T на 2 мм в отведениях V_1 -V_4. **Вопросы:** 1. Интерпретируйте данные лабораторно-инструментальных методов исследования. 2. Какие современные дополнительные методы диагностики необходимо провести? 3. Сформулируйте диагноз. 4. Какое осложнение развилось у больного? Назовите препараты неотложной помощи. 5. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное состояние? 6. Каковы факторы риска заболевания и меры профилактики? 7. Укажите основные патогенетические механизмы развития заболевания. 8. Назначьте препараты для длительного лечения выявленной патологии (выпишите рецепты).
ПК-5; ПК-6;ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 30** Больной О. 34 лет, водитель, обратился к врачу с жалобами на сильные боли в подложечной области, возникающие через 1, 5-2 часа после приёма пищи, в ночное время или натощак. Болевой приступ уменьшается после приёма пищи. Беспокоят также общая слабость, изжога, отрыжка кислым, тошнота, запоры. Считает себя больным в течение 2-х лет. Развитие заболевания связывает с частыми длительными командировками и нарушением режима питания. К врачам не обращался. При появлении изжоги принимал соду. Ухудшение состояния отмечает в течение недели. После тяжелой физической работы появились вышеуказанные жалобы. Объективно: Состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы бледные. Над легкими везикулярное дыхание. Тоны сердца ритмичные, чистые. Пульс - 72 в 1 мин., ритмичен. АД- 110/70 мм рт. ст. Язык обложен белым налетом. Живот при пальпации - умеренно напряжен в области эпигастрия, определяется локальная болезненность в зоне Шоффара, в точках Опенховского, Боаса, положительный симптом Менделя. Печень не увеличена. Данные лабораторных исследований: Общий анализ крови: Эр. - 3, 5 $\cdot 10^{12}$ /л, Нв - 102 г/л, Л. - 6, 8 $\cdot 10^{9}$ /л, Лейкоформула без особенностей. СОЭ - 20 мм/час R-скопия желудка: Натощак содержит жидкость. Пери-

	стальтика желудка усилена, конвергенция складок, деформация и раздражение луковицы 12-перстной кишки, эвакуация замедлена. Анализ кала: реакция Грегерсена положительная. **Вопросы:** 1. Сформулируйте диагноз. 2. Какое обследование необходимо для уточнения диагноза? 3. Назовите прямые и косвенные рентгенологические признаки при данной патологии. 4. О чем говорит положительная реакция Грегерсена? При каких заболеваниях она наблюдается? 5. Какие осложнения угрожают больному? 6. Что такое симптомы Менделя, Опенховского, Боаса? 7. Назначьте лечение (выпишите рецепты). 8. Что такое эрадикационная терапия? Показана ли она больному?
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №31** Больной К., студент, жалуется на боли в эпигастрии голодные и через 1, 5-2 часа после приема пищи, иногда боли по ночам, тошноту, изжогу, купируемую приемом молока, повышенную утомляемость, раздражительность. Болен в течение года. В последнее время боли усилились. В анамнезе частые нарушения пищевого режима. Объективно: общее состояние относительно удовлетворительное. Положение активное. Сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД – 18 в минуту. Границы сердца не изменены. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС – 72 в минуту, АД – 115/70 мм рт ст. Язык влажный, умеренно обложен налетом белого цвета. При пальпации живот мягкий, болезненный в пилородуоденальной зоне. Симптом Менделя отрицательный. Печень не увеличена. ФГС - в антральном отделе желудка наблюдается отек слизистой оболочки, очаги гиперемии, единичные эрозии. **Вопросы:** 1. Сформулируйте диагноз. 2. Перечислите основные синдромы, имеющиеся у данного больного. 3. Для какого типа желудочной секреции характерны подобные симптомы? Как это подтвердить? 4. Назовите основные этиологические факторы данного заболевания. 5. Назовите методы исследования для определения Helicobacterpylori. 6. Какой прогноз при данном заболевании? 7. Назначьте лечение (выписать рецепты). Напишите одну из схем эрадикационной терапии 8. Дайте рекомендации по санаторно-курортному лечению и

	профилактике обострений.
ПК-5; ПК-6;ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 32** Больной Т., 36 лет, поступил в клинику 10 августа. В течение июля работал в саду за городом, строил дом. Заболел остро 5 августа: температура повысилась до 40 ^{0}С. Жаловался на сильную головную боль, повторную рвоту, боли в области поясницы и живота с 3-го дня болезни, плохой сон, отсутствие аппетита, жажду. С 8 августа стал плохо видеть, появилась сыпь на коже. Объективно. При поступлении в больницу состояние больного тяжелое. Гиперемия лица и плечевого пояса, на боковых поверхностях грудной клетки, на спине обильная петехиальная сыпь, в местах инъекций – обширные кровоподтеки. В склере правого глаза – кровоизлияние. Слизистая ротовой полости сухая, на твердом небе пятнистая энантема. В легких везикулярное дыхание. Пульс 88 уд. в мин., ритмичный, мягкий, АД 110/90 мм рт. ст. Границы сердца не изменены, тоны глухие. Живот мягкий, безболезненный в эпигастрии. Печень своим нижним краем выступает на 3 см из-под реберной дуги, плотная и болезненная. Селезенка не пальпируется. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Менингеальных симптомов нет. На 7-й день болезни выпил 2200 мл воды, выделил мочи – 750мл, за следующие сутки выделил 350 мл мочи. На 9-й день – 150мл. Жаловался на сухость во рту, резкую слабость, рвоту, боли в пояснице. Пульс 60 уд. в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 130/80мм рт. ст. *Общий анализ мочи:* Относительная плотность – 1008, белок – 3, 3‰, эритроциты свежие 10-12 в п/з, цил. гиалиновые 5-6 в п/з. **Вопросы:** 1. Определите ведущие синдромы в клинике заболевания 2. Поставьте предварительный диагноз 3. Проведите дифференциальную диагностику 4. Назначьте лечение. 5. Какие лабораторные исследования необходимо провести? 6. Показания для проведения гемодиализа 7. Правила выписки 8. Диспансерное наблюдение.
ПК-5; ПК-6; ПК-8, ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 33** Больная М., 46 лет, жалуется на интенсивные боли в верхней половине живота опоясывающего характера, тошноту, рвоту, обильный кашицеобразный стул. Оперирована по поводу желчно-каменной болезни 4 года назад. Через полгода после операции впервые возник подобный приступ, сопровождался увеличением уровня амилазы в крови и моче. Подобные приступы повторяются 1-2 раза в год, после погрешностей в диете.

	Объективно. Состояние средней тяжести. На коже груди и живота «рубиновые капли». Патологии со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы не выявлено. Язык умеренно обложен у корня белым налетом. Живот мягкий, болезненный в зоне Шоффара, Губергрица-Скульского и левом подреберье. Симптомов раздражения брюшины нет. В ОАК – эритроциты – 4, 2* 10^{12}/л, гемоглобин – 126 г/л, лейкоциты – 6, 7*10^{9}/л, лейкоформула без особенностей, СОЭ-20 мм/час. ОАМ – с/ж, уд. вес 1018, белок – отр., лейкоциты – един. в поле зрения, диастаза мочи по Вольгемуту – 128 ед/ч*л. **Вопросы:** 1. Ваш предварительный диагноз. 2. Назовите этиологические факторы заболевания. 3. Назначьте план обследования 4. Назовите признаки экзокринной недостаточности при данной патологии 5. Как может проявиться нарушение эндокринной функции при этом заболевании? 6. Назначить лечение (выписать рецепты) 7. Назовите меры профилактики 8. Определите прогноз.
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10, ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №34** Больная П. 42 лет, инвалид II группы, доставлена в неврологическое отделение инсультной бригадой с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения». Сбор анамнеза затруднен из-за дизартрии. Со слов сопровождающих родственников страдает ревматизмом с детства, с 35 лет - инвалид 2 группы. Ухудшение состояния наступило остро - после посещения бани появилась затрудненная речь, резкая слабость и потеря движений в правых конечностях. Объективно: Состояние тяжелое. Правосторонний гемипарез. Пониженного питания. Акроцианоз (facies mitralis). При пальпации области сердца - диастолическое дрожание. Границы сердца расширены вверх и вправо. При аускультации сердца тоны аритмичные, ЧСС 98 в мин., на верхушке - 1 тон хлопающий, «ритм перепела», диастолический шум. Акцент 2 тона над легочной артерией. Пульс 75 уд в мин., аритмичный, слабее по наполнению на левой лучевой артерии. АД 100/70 мм. рт ст. Печень выступает на 2 см ниже реберной дуги, болезненна. Голени пастозны. **Вопросы:** 1. Объяснить причину развития ОНМК у данной больной. 2. Какие дополнительные обследования необходимо назначить для уточнения диагноза? Нарисуйте ЭКГ, характерную для данной патологии. 3. Сформулируйте диагноз больной. 4. Какие осложнения основного заболевания имеются у боль-

	ной? 5. Дайте краткую характеристику этиологии и патогенеза заболевания у данной больной. 6. Что такое «ритм перепела» и дефицит пульса? 7. Объясните причину ослабления пульса на лучевой артерии слева. 8. Назначьте лечение (выпишите рецепты).
ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №35** Больная С. 56 лет, предъявляет жалобы на головные боли преимущественно в затылочной и височной областях, сердцебиение, одышку при небольшой физической нагрузке, ноющие боли в области сердца. Из анамнеза. В течение 11 лет отмечается высокая артериальная гипертония (АД в пределах 160/100 – 185/110 мм рт. ст). Антигипертензивные препараты принимает нерегулярно, иногда приступы повышения АД купирует приемом таблетки адельфана. Год назад у больной было острое нарушение мозгового кровообращения. В анамнезе отмечает частые семейно-бытовые и производственные стрессовые ситуации. Наследственность по артериальной гипертензии и мозговому инсульту отягощена (отец умер от инсульта в возрасте 52 лет). Объективно: Состояние средней тяжести. Кожные покровы чистые, обычной окраски, легкий акроцианоз. Повышенного питания. Над легкими дыхание везикулярное. Пульс 100 в мин. АД 190/115 мм рт. ст. Левая граница смещена влево на 2 см от средне-ключичной линии, тоны сердца приглушены, ритм правильный, на верхушке сердца систолический шум, акцент II тона над аортой. Печень не увеличена, отеков нет. Общий анализ крови – без патологии. Общий анализ мочи: белок - 0, 33 ‰, единичные эритроциты в п/зр. Биохимический анализ крови: общий холестерин - 7, 2 ммоль/л, ЛПНП – 2, 8 ммоль/л, ЛПВП – 1, 0 ммоль/л, глюкоза 4, 9 моль/л, АсТ – 28 ел/л. АлТ – 34 ед/л, билирубин – 16, 8 ммоль/л, креатинин 101 мкмоль/л, мочевина – 7, 2 ммоль/л. Глазное дно – артерии резко сужены, уплотнены, вены полнокровны. ЭКГ: признаки гипертрофии левого желудочка с явлениями систолической перегрузки. **Вопросы:** 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 2. Какие факторы риска АГ имеются у больной? 3. Какие дополнительные методы исследования необходимо назначить? 4. Назовите ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка. Нарисуйте ЭКГ. 5. Перечислите особенности кардиалгического синдрома при этом заболевании.

	6. Опишите патогенез данного заболевания. 7. Какие осложнения имеются у больной? 8. Назначьте современное лечение и меры профилактики (выпишите рецепты).
ПК-5; ПК-6;ПК-8; ПК-10;ПК-11	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 36** Больной Д., 45 лет обратился в поликлинику с жалобами на интенсивные боли в эпигастральной области, тошноту, резкую слабость; накануне однократно была рвота съеденной пищей. В анамнезе: язвенная болезнь желудка. Боли в эпигастрии появились через 10 часов после выполнения физической работы. Нарушений диеты отмечено не было. При объективном исследовании: состояние средней тяжести, сознание ясное. Кожные покровы бледные. Периферических отеков нет. ЧД-18 в 1 минуту. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушены, ритмичны. АД 100/60 мм рт. ст., ЧСС=94 в минуту. Живот мягкий, при пальпации болезнен в эпигастрии, симптомов раздражения брюшины не обнаружено. Печень - у края реберной дуги. Сделан общий анализ крови: эритроциты - 4, $0 \cdot 10^{12}$/л; Гемоглобин - 128 г/л; Лейкоциты - 9, 8.10^{9}/л; СОЭ -15 мм/час. Был выставлен предварительный диагноз: обострение язвенной болезни желудка. Назначено противоязвенное лечение и больной направлен на фиброгастроскопию (ФГС). На следующий день во время проведения ФГС больной потерял сознание. Объективно: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, влажные, холодные, цианотичные. Тоны сердца глухие, ритмичные. АД-60/30 мм рт. ст. Пульс 100 в минуту. Живот мягкий. На электрокардиограмме: подъем сегмента ST на 3 мм, отрицательный зубец Т в отведениях III, AVF, II, снижение сегмента ST в отведениях $V_1 – V_3$, высокий остроконечный положительный зубец Т в V_1 - V3. Биохимический анализ крови: лактатдегидрогеназа - 460 ед/л; креатинфосфокиназа - 890 ед/л; КФК МВ-масса 70 ед/л; аспартатаминотрансфераза - 90 ед/л. **Вопросы:** 1. Чем обусловлено резкое ухудшение состояния больного во время проведения ФГС? 2. Оцените данные электрокардиографии. Нарисуйте ЭКГ больного. 3. Ваша интерпретация лабораторных показателей. 4. Какие дополнительные исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 5. Сформулируйте диагноз. 6. Какие еще осложнения угрожают больному с данной патологией? 7. Современная тактика оказания медицинской помощи больному с данной патологией (выписать рецепты).

	8. Назовите меры профилактики этого заболевания.
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 37** Больной К. 36 лет, экспедитор, обратился с жалобами на слабость, повышенную утомляемость, вздутие живота, непостоянные тупые боли в правом подреберье. Болен около 4-х лет. Ухудшение состояния наблюдалось после нарушений диеты и употребления алкоголя. К врачу не обращался. Два месяца назад был в командировке, после которой отмечает усиление болей в правом подреберье, появление желтушности склер, неустойчивого стула. Принимал аллохол и но-шпу. Улучшения состояния не наблюдалось, в связи с чем обратился к врачу. В анамнезе острый вирусный гепатит, развившийся после лечения у стоматолога. Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски, склеры субиктеричны. Сердце и легкие без патологии. АД - 110/70 мм рт. ст. Язык обложен желтым налетом. Живот умеренно вздут. Печень пальпируется на 2 см ниже края реберной дуги, несколько уплотнена, болезненна, край гладкий. Селезенка не пальпируется, отеков нет. Данные лабораторных исследований: Общие анализы крови и мочи без патологии. Биохимический анализ крови: общий белок - 68 г/л; альбуминов -51%; глобулинов - α_1 - 4%; α_2 - 10%; β - 13%; γ - 22%; билирубин - 28 мкмоль/л, прямой - 16 мкмоль/л, непрямой - 12 мкмоль/л; тимоловая проба - 5 ед., АЛТ - 94 ед/л; АСТ - 42 ед/л; ПТИ - 85%. **Вопросы:** 1. Выделите синдромы, скомпоновав их из имеющихся симптомов. 2. Сформулируйте диагноз. 3. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести для уточнения диагноза? 4. Какой вариант острого гепатита чаще осложняется хронизацией процесса? 5. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз? 6. Какие биохимические показатели крови наиболее информативны для диагностики паренхиматозных поражений печени? 7. Назначьте лечение больному (выпишите рецепты). 8. Какие российские и местные курорты показаны больному?
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №38** Больной Б., 49 лет. Жалобы на слабость, увеличение живота и тяжесть в правом подреберье. Ежедневно употребляет 1 л пива. Увеличение живота заметил 1 месяц назад. Объективно: Состояние средней тяжести. Сознание ясное.

	Кожные покровы и видимые слизистые субиктеричны. Телеангиоэктазии на коже туловища, гиперемия ладоней. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД-20 в/мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. ЧСС-80 в/мин. АД-115/70 мм рт. ст. Язык умеренно обложен белым налетом. Живот увеличен в объеме, пупок сглажен, определяется флюктуация при пальпации. Печень выступает ниже реберной дуги на 3 см, край ее заострен, консистенция плотная. Пальпируется нижний край селезенки. Биохимический анализ крови: билирубин крови - 32 мкмоль/л, АСТ - 80 МЕ/л, АЛТ - 120 МЕ/л, креатинин - 80 мкмоль/л, общий белок - 52 г/л, альбумины – 42%, холестерин – 3, 3 ммоль/л, протромбиновый индекс - 50%. **Вопросы:** 1. Ваш предварительный диагноз. 2. Объясните патогенез заболевания у данного пациента. 3. Как оценить показатель протромбинового индекса у больного? 4. Назначьте дополнительные методы исследования. Консультации каких специалистов необходимы пациенту? 5. Назначьте лечение (выпишите рецепты). 6. Назовите показания для лапароцентеза и введения заменителей плазмы? 7. Какой прогноз при данном заболевании? Какие осложнения могут развиться? 8. Перечислите меры профилактики. Как проводится расчет гепатотоксичных доз алкоголя?
ПК-5; ПК-6;ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА№39** Больной Г., 25 лет, не работает, поступил в клинику по направлению участкового врача. Жалобы при поступлении на общую слабость, тошноту, плохой аппетит, непостоянные тупые боли в правом подреберье, похудание, боли в суставах рук, ног. Периодически отмечались носовые кровотечения, в последнюю неделю до поступления – повышение температуры до 37, 5^0С. Анамнез заболевания: слабость, плохой аппетит отмечает в течение месяца. Боли, тяжесть в правом подреберье наблюдались и ранее в течение года, но к врачам пациент не обращался. Не лечился, диету не соблюдал. Ухудшение состояния в течение недели: появились желтушность склер, тошнота, повысилась температура. Обратился к участковому врачу, госпитализирован в стационар. Анамнез жизни: в детстве перенес болезнь Боткина. Работу с токсическими веществами, прием медикаментов отрицает. После службы в армии не имеет постоянного места работы. Отмечает периодическое использование инъекций наркотиков. На учете у нарколога не состоит. Курит около пачки в день, употребление алкоголя отрицает. Объективно: Состояние средней тяжести. Температура 37, 1^0С. Астеник. Пониженного питания. Кожа и видимые слизи-

	стые субиктеричны. На руках по ходу вен следы инъекций. Органы грудной клетки без особенностей. АД 115/70 мм рт. ст. ЧСС 86 в минуту. Язык суховат, обложен белым налетом. Живот обычных размеров, мягкий умеренно болезненный в правом подреберье. Нижний край печени выступает на 2 см из-под края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Отеков нет. Симптомы Мерфи, Ортнера отрицательны. Данные дополнительных исследований: в анализе крови – Л. – 9* 109/л, СОЭ – 30 мм/ч, в биохимическом анализе – общий белок 68 г/л, общий билирубин – 30 мкмоль/л, прямой – 18 мкмоль/л, АЛТ – 228 ед, АСТ – 246 ед, ЩФ – 350 ед, серомукоиды – 1024 ед, СРБ+++. HBSAg в крови не выявлен. УЗИ – гепатомегалия, диффузные изменения в печени, признаков портальной гипертензии нет. **Вопросы:** 1. Какие синдромы наблюдаются у больного? 2. Назовите проявления цитолитического синдрома. 3. Можно ли исключить у больного вирусные гепатиты? 4. Ваш предварительный диагноз. 5. Назначьте дополнительные методы обследования. 6. Назначьте лечение больному. Выпишите рецепты. 7. Каков вероятный прогноз? 8. Назовите меры профилактики заболевания.
ПК-5; ПК-6; ПК-8	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 40** Больная 55 лет, поступила в терапевтическое отделение с жалобами на одышку в покое, сердцебиение, перебои в работе сердца, отеки на нижних конечностях и увеличение живота, слабость, кашель, кровохарканье, тяжесть в правом подреберье. Из анамнеза. В детстве частые ангины. В возрасте 26 лет обнаружен порок сердца. В течение 10 лет отмечает перебои в работе сердца и одышку при физической нагрузке. В последние два года появились отеки, усилилась одышка, кашель. Объективно. Состояние средней тяжести, астенического телосложения, пониженного питания. На лице - румянец с цианотичным оттенком, акроцианоз. Кожные покровы желтушные, сухие, горячие на ощупь, отмечаются отеки нижних конечностей до середины бедер. При перкуссии над легкими – притупление в нижних отделах. Аускультативно: жесткое дыхание, в задне-нижних отделах легких - влажные мелкопузырчатые хрипы. ЧД - 24 в 1 мин. Шейные вены набухшие, пульсируют. При осмотре области сердца определяется сердечный толчок в эпигастральной области. При пальпации верхушечный толчок смещен влево, вниз, не усилен, ограниченный. Определяется «кошачье мурлыкание» над верхушкой. Перкуторно - левая граница сердца - в 5 межреберье по среднеключичной линии, правая - на 1, 5 см кнаружи от правого края грудины, верхняя - на уровне III ребра. Тоны сердца приглушены, аритмичные, на верхушке - хлопающий 1 тон, ритм “перепела”, диастолический шум, у основания мечевидного от-

	ростка - систолический шум более грубый, усиливающийся на вдохе. Акцент II тона во II межреберье слева у грудины. ЧСС – 108 в мин., пульс – 91 в мин. малый, аритмичный, частый. АД – 115/80 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме за счет свободной жидкости. Печень выступает из-под края реберной дуги на 5 см, плотная с острым краем, пульсирует. Общий анализ крови: эритроциты- 3, $3x10^{12}$/л, гемоглобин-100г/л, лейкоциты-$10x10^{9}$/л, п/яд - 3%, сегм/яд - 59%, эоз - 3%, лимф- 25%, мон - 10%, СОЭ 21 мм/ч. Общий анализ мочи: прозр., удельный вес 1014, белок – отр. Биох. анализ крови: белок – 83 г/л, СРБ ++, билирубин общий - 45 мкмоль/л. ЭКГ: ритм неправильный, частота 100 в мин., признаки гипертрофии обоих желудочков, интервалы R-R различной величины, зубцы Р отсутствуют, волны ff, комплексы QRS не расширены. **Вопросы:** 1. Выделите основные синдромы заболевания. 2. Оцените изменения на ЭКГ. Нарисуйте ЭКГ. 3. Как объяснить шум у мечевидного отростка, усиливающийся на вдохе, и изменения печени? 4. Сформулируйте предварительный диагноз. 5. Какие дополнительные методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? 6. В чем заключается патогенез данного заболевания? 7. Укажите основные группы лекарственных препаратов, необходимых для лечения (выпишите рецепты). 8. Определите прогноз, меры профилактики заболевания.

5. 2 Ситуационные задачи по модулю «Профессиональные болезни»

Коды компетенций	Задачи
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1** *Больной К.,* 33 года, работает 9 лет камнерезчиком с пневматическим инструментом. Испытывает воздействие локальной вибрации. Вибрация больше передается на левую руку, удерживающую боек. Во время очередного медицинского осмотра предъявлял жалобы на онемение, покалывание, зябкость и побеление пальцев левой руки при охлаждении, появившееся в течение последнего года. Болей в руках не ощущает. Побеление пальцев началось с мизинца, затем при охлаждении начали белеть III и IV пальцы. После приступов побеления появляются парестезии, иногда - отек лучезапястного сустава. Объективно: Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. АД 120/70 мм. рт. ст., пульс 72 в минуту. Кисти рук нормальной окраски, теплые, умеренный подмышечный и ладонный гипергидроз. Трофические нарушения отсутствуют. Чувствительных нарушений на верхних и нижних конечностях не определяется. Легкая гипостезия лишь на концевых фалангах IV и V пальцев рук; мышцы не изменены; по данным капилляроскопии - незначительная тенденция к спазму. При холодовой пробе - побеление IV и V пальцев левой руки. Анализ крови: гемоглобин- 133 г/л, эритроциты -4, 2х 10^{12}/л, лейкоциты -5, 6хх 10^{9}/л, СОЭ -4 мм/ч *Задание:* 1. Выделите ведущие синдромы у данного больного. 2. Перечислите дополнительные лабораторные исследования. 3. Сформулируйте и обоснуйте диагноз у данного больного. 4. Назначьте лечение, проведите врачебно - трудовую экспертизу и дайте рекомендации. 5. Подлежит ли больной динамическому наблюдению? 6. Каков прогноз заболевания?
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2** Обрубщик металлического литья *С.,* 34 года, стаж работы 15 лет. Обратился в медико-санитарную часть с жалобы на боли в дистальных отделах рук, усиливающиеся после работы, чувство онемения больше слева, побеление концевых фаланг пальцев верхних конечностей, которые появляются при общем охлаждении, особенно в холодное время года. Больной около 2 лет, к врачам не обращался. Объективно: пульс 80 ударов в минуту, ритмичный. АД 130/75 мм. рт. ст. Границы сердца в пределах нормы. Тоны значительно приглушены. Состояние удовлетворительное. Дыхание жестко-ослабленное, хрипов нет. Язык розового цвета. Живот мягкий безболезненный, печень не увеличена. Неврологический статус: черепно-мозговые нервы без

	изменений. Сухожильные и периостальные рефлексы равномерно оживлены. Патологических рефлексов нет. Руки холодные на ощупь, кончики пальцев слегка отечны и цианотичны, отмечается «кружевной рисунок» кистей, положительный симптом «белого пятна»; трофических нарушений нет. Холодовая проба положительная. Снижение болевой чувствительности. *Задание:* 1. Установите предварительный диагноз. 2. Выделите синдромы характерные для данного заболевания. . Составьте план дополнительного обследования больного, необходимого для установления окончательного диагноза. Назначьте лечение. Каков прогноз заболевания? . Подлежит ли больной динамическому наблюдению и с какой частотой? .. Решите вопрос о трудоспособности и дайте рекомендации.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3** *Больная Ф.*, 42 года, в течение 21 года работает лаборантом в химической лаборатории завода, имея постоянный контакт с металлической ртутью. Во время периодического медицинского осмотра предъявляла жалобы на головную боль, усиливающуюся при волнении, к концу рабочего дня, нарушение памяти, раздражительность, плаксивость, снижение работоспособности, нарушение сна, дрожание пальцев рук, быструю утомляемость. Обьективно: со стороны внутренних органов - над легочными полями выслушивается везикулярное дыхание. Границы сердца в пределах нормы. Тоны сердца приглушены. Пульс -96 уд/мин, ритмичный, АД 150/100 мм рт. ст. При осмотре выявлено равномерное оживление сухожильных и периостальных рефлексов по функциональному типу, тремор век и пальцев вытянутых рук (асимметричный), выраженный красный дермографизм, разлитой, стойкий, общий гипергидроз. Щитовидная железа не увеличина. *Задание:* 1. Установите предварительный диагноз. 2. Какие клинические синдромы характерны для данного заболевания? 3. Составьте план обследования, необходимый для формулировки окончательного диагноза? 4. Нужны ли дополнительные методы исследования, если да, то какие? 5 Назначьте лечение данному больному. 6. Проведите врачебно-трудовую экспертизу, дайте рекомендации.

ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4** *Больной Л.,* 43 года, работает в совхозе водителем грузового автотранспорта. Нередко ему приходится производить ремонтные работы автомашины, при этом обычно наблюдается загрязнение рук смазочными материалами, двигательным топливом. В анамнезе простудные заболевания. Спустя 15 лет после начала работы стал замечать появление головной боли в виде приступов по типу мигреней, головокружение, шум в ушах, нарушение сна (чуткий сон, бессонница). В дальнейшем появились раздражительность, чувство страха, ощущение волоса во рту, ползания насекомых по телу, кошмарные сновидения. Обьективно: над легкими выслушивается везикулярное дыхание, границы сердца в пределах нормы, тоны значительно приглушены. Пульс -62 уд. в мин. АД 110/70 мм. рт. ст. В неврологическом статусе легкая асимметрия носо-губных складок, сухожильные рефлексы равномерно повышены с расширенной зоной. Гипергидроз, гиперсаливация. В крови умеренный лейкоцитоз. *Задание:* 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 2. Какие лабораторные и инструментальные исследования нужно провести данному больному для подтверждения заболевания? 3. Назначьте лечение. 4. В наблюдении какого специалиста нуждается больной? Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5** *Больной К.,* 40 лет, работник сельхозкооператива, доставлен в центральную районную больницу с жалобами на резкую слабость, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе, горечь во рту. При опросе установлено, что за 2 ч. до появления описанных симптомов занимался прополкой поля, накануне обработанного ядохимикатом метилмеркаптофосом. Объективное исследование выявило сужение зрачков, гипергидроз кожи, миоз, бронхорею, брадикардию, фибрилярные подергивания отдельных мышц. Со стороны других органов и систем патологии не выявлено. *Задание:* 1. Ваши действия при оказании первой помощи. 2. Установите предварительный диагноз. 3. Какие лабораторные и инструментальные методы исследования нужно провести данному больному для подтверждения диагноза? 4. Назначьте лечение. 5. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации.

ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 6** Больной Щ., 38 лет, работает обрубщиком, имеет «пылевой» стаж работы 16 лет. Концентрация пыли на его рабочем месте превышает ПДК в 8-10 раз. Во время периодического медицинского осмотра предъявлял жалобы на кашель, преимущественно сухой, изредка с небольшим количеством слизистой мокроты, который стал его беспокоить около 2-3 лет назад. За медицинской помощью не обращался. Респираторных заболеваний ранее не было. Не курит. Объективно: небольшой цианоз губ и пальцев рук. Перкуторный звук в нижних отделах с коробочным оттенком, подвижность нижних краев легких не изменена. Дыхание жесткое, прослушиваются непостоянные рассеянные сухие хрипы. Флюорограммы легких без отклонений от нормы. Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ составляет 90% от ДЖЕЛ, проба Тиффно- 81%. Тоны сердца приглушены. АД 130/80 мм. рт. ст. Пульс 74 уд. в мин. Органы брюшной полости без патологии. Анализ крови в норме. Анализ мокроты: характер слизистый, элементов бронхиальной астмы нет. ЭКГ-вертикальное расположение электрической оси сердца. Задание: 1. Установите предварительный диагноз и обоснуйте его. 2. Наметьте план обследования для подтверждения диагноза. 3. Нужны ли дополнительные методы исследования для постановки окончательного диагноза? 4. Назначьте лечение данному больному. 5. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 7** Больная К.., 35 лет, маляр, в процессе работы использует нитрокраски, растворенные смесью растворителей, содержащих бензол, концентрации которого в воздухе рабочей зоны превышает в 2-3 раза. Спустя 12 лет от начала работы стала ощущать повышенную раздражительность, быструю утомляемость, общую слабость, беспричинную слезливость, обильные и длительные (6-7 дней) менструации. При очередном медицинском осмотре: кожные покровы нормальной окраски, кожные геморрагии в области бедер и голеней до 1. 5-2 см., в диаметре, десны при надавливании кровоточат. Положительный симптом щипка. Лимфатические узлы не увеличены. Пульс 80 уд. в мин. АД 110/70 мм. рт. ст. Тоны сердца приглушены, систолический шум над верхушкой. Неврологически: тремор век, умеренный тремор пальцев вытянутых рук. Гиперестезия по тыльной и гипостезия по ладонной поверхности кистей рук. Ладони мокрые, сухожильные рефлексы живые, надкостничные на руках с расширенной зоной. Розовой разлитой дермографизм. Анализ крови: Hb-105 г/л, эр. -3, 2х10 ^{12} /л, ЦП-0, 98, лейк. -3. 0х10^{9} /л, лимф-43%, мон-8%, эоз-3%, баз-0%, п/я-7%, с/я-39%, тромбоциты 90х10^{9} /л, ретикулоциты 15$_{0/00}$, СОЭ- 20мм, /ч, время кровотечения 5 мин. Картина стернального костномозгового пунктата: общее количе-

	ство миелокариоцитов снижено 45%, небольшое уменьшение элементов миелоидного ряда. Повторный анализ крови через 10 дн после отстранения от контакта с бензолом: Hb-112г/л, лейкоцитов- 3. 5х10^9 /л, СОЭ -15мм/ч. Задание: 1. Установите предварительный диагноз. 2. Укажите характерные синдромы для данного заболевания. 3. Какие лабораторные и инструментальные методы исследования нужны для уточнения диагноза? 4. Проведите дифференциальную диагностику. 5. Назначьте лечение, проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации по трудоустройству.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 8** *Больная Н.,* 37 лет, в течение 10 лет работает бушонщицей на парфюмерной фабрике. Работа заключается в закачивании крышек (бушонов) из пластмасс на тюбики для пасты, крема. За смену завинчивает до 11 тыс. бушонов. Обратилась к цеховому врачу с жалобами на слабость в правой руке, боли в правом лучезапястном суставе при выполнении производственных операций, особенно при движениях большого пальца. Боли появились около 3 мес. назад. Дома принимала анальгин, но значительного облегчения не получала. Объективно: патологии со стороны внутренних органов не отмечено; движения в правом лучезапястном суставе болезненны, особенно при ульнарном отведении, имеется припухлость в области «анатомической табакерки», положительные симптомы Элькина и Финкельстайна. *Задание:* 1. Поставьте предварительный диагноз. 2. Выделите характерные синдромы для данного заболевания. 3. Составьте план обследования больной. 4. Обоснуйте диагноз. 5. Назначьте лечение данной больной. 6. Решите вопрос о ее трудоспособности и дайте рекомендации по трудоустройству
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 9** *Больной С.,* 36 лет, штукатур с 14-летним стажем работы. При прохождении периодического медосмотра предъявлял жалобы в правом плечевом суставе, особенно в начале работы. Боли усиливаются при подъеме и переноске тяжестей и отведении плеча. Объективно: при одевании и снятии одежды заметно щажение руки. Контуры плечевых суставов не изменены, закладывание руки за спину неосуществимо из-за болей. Отчетливо выраженный симптом Дауборна. Пальпация большого бугорка плеча и верхнего края дельтовидной мышцы болезненна. Отмечается хруст при движениях в плечевом суставе. Обеъективные данные со стороны внутренних органов без отклонений от нормы. Рентгенограмма плечевых составов: склероз площадки больного бугорка правой плечевой кости.

	Рентгенограмма шейно-грудного отдела позвоночника без патологии. Динамометрия: слева - 40 кг, справа - 15 кг. *Задание:* 1. Установите предварительный диагноз и обоснуйте его. 2. Нужны ли дополнительные методы исследования, если нужны то какие? 3. Назначьте лечение. 4. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 10** *Больной Н.,* 43 года, направлен в противотуберкулезный диспансер для консультации. В прошлом 13 лет работал обрубщиком; 2 года назад был диагностирован силикоз, узелковая форма 2р. При очередном обследовании в медсанчасти обнаружено усиление одышки, учащение кашля, появление болей в подлопаточных областях при дыхании. Обьективно: астеническая конституция. Питание не снижено. Температура в норме. Грудная клетка цилиндрической формы. Перкуторный звук над нижними отделами легких с коробочным оттенком, подвижность нижних краев легких ограничена. Дыхание ослабленное, жестковатое, прослушиваются единичные сухие хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс 86 уд. в мин., удовлетворительного наполнения, ритмичный. АД 130/80 мм. рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Анализ крови: гемоглобин 144 г/л, эритроциты 4, 4х 10^{12} /л, цв. Показатель 0, 98, лейкоциты 6, 2х 10^{9}/л, лимфоциты -23%, моноциты -14%, эозинофилы -2%, базофилы -1%, П/я- 1%, с/я - 59%. На рентгенограмме отмечается диффузное усиление и деформация легочного рисунка, на фоне которого имеются множественные узелковые тени размером 2-4 мм в диаметре. Уплотнение междолевой плевры справа. Корни обрубленной формы с обызвествленными по типу яичной скорлупы лимфатическими узлами. *Задание:* 1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз? 2. Укажите, какие дополнительные методы исследования следует провести для подтверждениядиагноза. 3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику? 4. Назначьте лечение данному больному. 5. Какой прогноз заболевания в данном случае? 6. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации.

ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 11** Больной С., 42 года, в течение 16 лет работает формовщиком литейного производства. В последние 2 года стал ощущать колющие боли в грудной клетке, периодически беспокоит кашель, при больших физических нагрузках появляется одышка. Обьективно: при внешнем осмотре объективных изменений не отмечается. В нижнебоковых отделах грудной клетки перкуторный звук с коробочным оттенком, подвижность нижних краев легких не изменена. В легких прослушиваются сухие хрипы в большом количестве. Анализы крови и мочи без отклонений от нормы. Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ составляет 78% от ДЖЕЛ, снижение показателей бронхопроходимости - 61%. Тоны сердца приглушены. Пульс -86 уд. в мин., удовлетворительного наполнения, ритмичный. АД - 130/80 мм. рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена На рентгенограмме отмечаются усиление и деформация легочного рисунка, преимущественно в средних и нижних отделах легких, видны немногочисленные узелковые тени размером 2 -3 мм, округлой формы. Корни легких несколько расширены и уплотнены. Прозрачность базальных отделов легких повышена. Задание: 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз? 2. Укажите наиболее вероятные осложнения. 3. Назначьте лечение. 4. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 12** Больной Р., 35 лет, литейщик по выплавке легированной стали, профессиональный стаж 10 лет. Жалобы на кашель, одышку, боли и онемение конечностей, головную боль, снижение аппетита, общую слабость, небольшую заторможенность при ходьбе. Сон тревожный, прерывистый, сопровождается тяжелыми сновидениями. Недомогание развивалось исподволь в течение последних 2 лет. Курит, спиртные напитки употребляет умеренно. Объективно: кожные покровы умеренно бледные; лимфатические узлы не увеличены; со стороны внутренних органов отклонений от нормы не выявлено. Неврологический статус: умеренная гипомимия, непостоянная анизокория, симптом Хвостека положительный с обеих сторон, справа слабовыраженный симптом Маринеско. Сухожильные и периостальные рефлексы равномерно снижены, брюшные не вызываются. Красный стойкий дермографизм, акрогипотермия, акроцианоз, гипоанальгезия по типу «перчаток» и «носков», тонус мышц конечностей снижен, мышечная сила ослаблена, неустойчивость в позе Ромберга. Легкий тремор пальцев вытянутых рук. Анализ крови: Hb 150 г/л; число эритроцитов 4, $55x10^{12}$/ л, лейкоцитов 6, $2x10^{9}$/л, эозинофилов- 1%, палочкоядерных -53%, лимфоцитов- 43%, моноцитов- 2%; СОЭ- 11 мм/ч. Анализ мочи: прозрачная, плотность 1015, белка и сахара нет, число лейкоцитов 1-2-3 в п/зр, эпителий плоский в умеренном количест-

	ве. ЭКГ без отклонений от нормы. Задание: 1. Выделите основные клинические синдромы у данного больного? 2. Нужны ли дополнительные методы исследования для постановки окончательного диагноза, если да то какие ? 3. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 4. Назначьте лечение больному. 5. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 13** *Больная М.,* 30 лет, работает 3 года медицинской сестрой в процедурном кабинете поликлиники. Страдает бронхиальной астмой, в связи с которой направлена на консультацию к профпатологу для установления (или исключения) связи заболевания с профессией. Около года назад заметила, что при контакте с пенициллином появилось першение в горле, чиханье, позднее - приступообразный кашель, а затем стали возникать приступы удушья. Приступы проходили вскоре после приема таблетки теофедрина или ингаляции сольбутамола, изредка требовались инъекции эуфиллина. За последние месяцы приступы стали намного тяжелее, но по-прежнему возникают только при контакте с пенициллином. В анамнезе редкие острые респираторные заболевания. Аллергических заболеваний у нее и ближайших родственников не было, антибиотиков не получала. Среди представленной медицинской документации имеются заключение о наличии у больной типичных приступов бронхиальной астмы, появляющихся при выполнении инъекций пенициллина, а также положительных результатов кожных и конъюнктивальных проб с раствором пенициллина. *Задание:* 1. Определите, достаточны ли приведенные данные для решения вопроса о связи имеющейся у больной бронхиальной астмы с ее профессией? Если недостаточны, то укажите, какие нужны дополнительные сведения? 2. Назначьте лечение, 3. Решите вопрос о её трудоспособности и дайте рекомендации больной.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 14** *Больной П.,* 42 года, работает на производстве по изготовлению аккумуляторов. Был доставлен в больницу машиной скорой помощи в связи с резкими болями в животе. Из анамнеза выяснено, что еще до работы на аккумуляторном заводе перенес язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. На протяжении последующих 20 лет обострений не было, что подтверждалось и фиброгастроскопическими исследованиями. При поступлении в больницу жаловался на слабость, резкие схваткообразные боли в животе, повышенная утомляемость, сладковатый вкус во рту. Объективно: В легких перкуторный звук, дыхание

	везикулярное, границы сердца не изменены, тоны ясные, чистые. АД- 130/90 мм рт. ст. Пульс -64 уд в мин. Живот втянут, при пальпации разлитая болезненность с преимущественной локализацией в средней и нижней половине живота и особенно вокруг пупка, симптом Щеткина - Блюмберга отрицательный. Появлению болей предшествовали неприятный вкус во рту, тошнота, слюнотечение, бессонница, запоры. Стула у больного не было в течении 3 дней, хотя он принимал слабительные средства. Анализ крови: Hb -90 г/л, число ретикулоцитов -40%, эритроцитов 4, 1х 10^{12}/л, число эритроцитов с базофильной зернистостью -66%; СОЭ- 11 мм/ч. *Задание:* 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз? Какие дополнительные диагностические исследования нужны для подтверждения диагноза? 3. Какие показатели крови и мочи будут подтверждать данный диагноз? 4. Назначьте лечение, проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 15** *Больной Ч.,* 33 года, работает на предприятии по изготовлению термоизоляционных материалов, содержащих асбест, при этом в цехе имеется повышенная концентрация асбестовой пыли в воздухе. Средства индивидуальной защиты использовал не всегда. Через 5 лет после начала работы стали беспокоить одышка при небольших физических напряжениях, приступообразный кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой, сопровождающийся болями в грудной клетке. Кроме того, появились резкая слабость, быстрая утомляемость, потеря массы тела. Объективно: пониженного питания, цианоз лица и губ, грудная клетка бочкообразной формы. Перкуторный звук над легкими коробочный, прослушивается большое количество сухих и влажных хрипов, а также шум трения плевры, подвижность нижних краев легких ограничена. Тоны сердца ясные. Пульс 76 уд. в мин, ритмичен. АД 130/70 мм. рт. ст. Органы брюшной полости без патологии. На рентгенограмме легких сосудисто-бронхиальный рисунок резко усилен и деформирован; прозрачность легочных полей диффузно повышена; имеются плевродиафрагмальные спайки, междолевая плевра справа утолщена; корни легких уплотнены и расширены. Показатели функции внешнего дыхания: ЖЕЛ- 62% от должной, проба Тиффно 64%. Мокрота слизисто-гнойная с прожилками крови. При динамическом наблюдении спустя 10 лет у больного обнаружен ателектаз средней доли легкого. *Задание:* 1. Установите и обоснуйте диагноз

	2. Укажите основной метод диагностики данного заболевания. 3. Какие необходимы дополнительные исследования для уточнения диагноза? 4. Проведите дифференциальную диагностику 6. Укажите наиболее вероятное осложнение у данного больного в отдалённые сроки 7. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 16** Больной К., 40 лет, обратился в медико-санитарную часть станкостроительного завода. Работает токарем-фрезеровщиком, в течение 11 лет занимается изготовлением неискрящихся резцов из медно-бериллиевых сплавов. Концентрации бериллия в воздухе рабочей зоне, по данным заводской лаборатории превышало ПДК в 3 раза. При этом средства защиты органов дыхания от пыли использовались нерегулярно. Жалобы на слабость, повышенную утомляемость, одышку при ходьбе и приступообразный сухой кашель, которые беспокоят его около года, интенсивно нарастая после острых респираторных заболеваний. Больной не курит. При осмотре отмечается цианоз, похудание. Над легкими перкуторный звук с коробочным оттенком, в нижних отделах прослушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы. ОАК – НВ- 120 г/л, L – 6, 5х 10^9 /л, ОАМ – протеинурия. Задание: 1. Установите предварительный диагноз и составьте план дальнейшего обследования для уточнения диагноза. 2. Проведите дифференциальную диагностику с туберкулезом, саркоидозом, карциноматозом. 3. Какие методы обследования необходимо провести. 4. Проведите необходимое лечение. 5. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 17** Больной С., 42 года, в течение 16 лет работает формовщиком литейного производства. В последние 2 года стал ощущать колющие боли в области лопаток, периодически беспокоит кашель, при больших физических нагрузках появляется одышка. При внешнем осмотре объективных изменений не отмечается. В нижнебоковых отделах грудной клетки перкуторный звук с коробочным оттенком, подвижность нижних краев легких не изменена. В легких прослушиваются сухие хрипы в большом количестве. Анализы крови и мочи без отклонений от нормы. Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ составляет 78 % от ДЖЕЛ, проба Тиффно - 61%. Изменений со стороны сердечно-сосудистой системы и пищеварительного трата не имеется. На рентгенограмме отмечаются усиление и деформация легочного рисунка, преимущественно в средних и нижних отделах легких, видны немногочисленные узелковые тени размером 2 -3 мм, округлой формы. Корни легких несколько расширены и уплотне-

	ны. Прозрачность базальных отделов легких повышена. Задание: 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику. 3. Назначьте адекватное лечение на современном уровне. 4. Какие дополнительные методы обследования и исследования необходимо провести. 5. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 18** Больная М., 30 лет, работает 3 года медицинской сестрой в процедурном кабинете поликлиники. Страдает бронхиальной астмой, в связи с которой направлена на консультацию к профпатологу для установления (или исключения) связи заболевания с профессией. Около года назад заметила, что при контакте с пенициллином появилось першение в горле, чиханье, позднее - приступообразный кашель, а затем стали возникать приступы удушья. Приступы проходили вскоре после приема таблетки теофедрина или ингаляции сольбутамола, изредка требовались инъекции эуфиллина. За последние месяцы приступы стали намного тяжелее, но по-прежнему возникают только при контакте с пенициллином. В анамнезе редкие острые респираторные заболевания. Аллергических заболеваний у нее и ближайших родственников не было, антибиотиков не получала. ОАК – эозинофилия, повышенное СОЭ. ОАМ – протеинурия. БХ крови – увеличение АСТ и АЛТ. Среди представленной медицинской документации имеются заключение о наличии у больной типичных приступов бронхиальной астмы, появляющихся при выполнении инъекций пенициллина, а также положительных результатов кожных и конъюнктивальных проб с раствором пенициллина. Задание: 1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 2. Определите, достаточны ли приведенные данные для решения вопроса о связи имеющейся у больной бронхиальной астмы с ее профессией. Если недостаточны, то укажите, какие нужны дополнительные сведения. 3. Назначьте адекватное лечение на современном уровне. 4. Проведите дифференциальную диагностику с бронхопневмонией и бронхоэктатической болезнью. 5. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 19** Больной П., 42 года, работает на производстве по изготовлению аккумуляторов. Был доставлен в больницу машиной скорой помощи в связи с резкими болями в животе. Из анамнеза выяснено, что еще до работы на аккумуляторном заводе перенес язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. На протяжении последующих 20 лет обострений не было, что подтверждалось и фиброгастроскопическими исследованиями.

	При поступлении в больницу жаловался на резкие схваткообразные боли в животе. Объективно: живот втянут, при пальпации разлитая болезненность с преимущественной локализацией в средней и нижней половине живота и особенно вокруг пупка, симптом Щеткина - Блюмберга отрицательный. Появлению болей предшествовали неприятный вкус во рту, тошнота, слюнотечение, бессонница, запоры. Стула у больного не было в течении 3 дней, хотя он принимал слабительные средства. В легких перкуторный звук, дыхание везикулярное, границы сердца не изменены, тоны ясные, чистые. АД -180/90 мм рт. ст. Анализ крови: Hb-90 г/л, число ретикулоцитов- 40%, эритроцитов 4, 1 х1012/л, число эритроцитов с базофильной зернистостью -66%; СОЭ-11 мм/ч, повышение копропорферина. Задание: 1. Предварительный диагноз и его обоснование. 2. Укажите, на что необходимо провести дополнительное исследование мочи. 3. Проведите дифференциальную диагностику с тетраэтилсвинцовой интоксикацией. 4. Какой вид анемии у больного. 5. Адекватное лечение. 6. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 20** В клинику профессиональных болезней направлен для углубленного обследования кассир-счетчик банка, 42 лет (профессиональный стаж — 20 лет), с жалобами на боли в нижней трети правого предплечья и лучезапястного сустава, усиливающиеся при движениях I пальца кисти и отдающие в локоть. Объективно: со стороны внутренних органов патологии не выявлено. Левая кисть не изменена. Справа в области анатомической табакерки имеется ограниченная припухлость, болезненная при пальпации. Флексия и экстензия кисти не нарушены, локтевое ее отведение ограничено и болезненно. Давление на I палец по его оси и вытяжение его за концевую фалангу безболезненно. Удержать бумагу I и V пальцами правой кисти не может из-за боли в нижней трети предплечья. Анализы крови и мочи-без патологии. На рентгенограммах правой кисти отмечается утолщение мягких тканей в области шиловидного отростка лучевой кости. Задание: 1. Установите и обоснуйте диагноз; 2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести. 3. Проведите дифференциальную диагностику. 4. Назначьте эффективное этиологическое, патогенетическое и посиндромное лечение. 5. Проведите врачебно-трудовую экспертизу и дайте рекомендации

ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 21** При проведении периодического медицинского осмотра изолировщиков электротехнического завода у одного работника отмечены жалобы на общую слабость, головные боли, ноющие боли в руках. При движении боли усиливаются преимущественно в суставах. Болевые ощущения периодически сопровождаются чувством онемения в кистях и предплечьях. Работает изолировщиком 10 лет. Изолировка проводится вручную и требует большого физического напряжения рук и плечевого пояса. Изолировочная лента пропитана лаком, в состав которого входит 50% бензола. При осмотре отмечена некоторая бледность кожных покоровов и его адинамичность. Пульс-84 удара/мин, артериальное давление -140/90 мм рт. ст. Систолический шум в точке Боткина-Эрба. В легких выслушиваются единичные сухие хрипы. Пальпация суставов болезненна. Отмечается небольшая припухлость межфаланговых и лучезапястных суставов. Нарушений нет чувствительности. Мышечная сила правой руки составляет - 5 кг, левой - 6 кг. Температура тела - 37, 1°С. Анализ крови: гемоглобин—93 г/л, эритроциты—3, $9x10^{12}$ /л, цветной показатель — 0, 7, лейкоциты — 8, $5x10^{9}$ /л, СОЭ — 24 мм/ч, тромбоциты — $340x10^{9}$ /л, проба Геccf — 300 ед., С-реактивный белок – (++). ЭКГ—диффузные изменения. Рентгенограммы костей и суставов — без патологических изменении. Задание: 1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 2. Перечислите дополнительные методы исследования, которые помогут в постановке окончательного клинического диагноза. 3. Проведите дифференциальную диагностику. 4. Назначьте лечение. 5. Выпишите необходимые рецепты.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 22** Больная Ф., 42 года, в течение 21 года работает лаборантом в химической лаборатории завода, имея постоянный контакт с металлической ртутью. Во время периодического медицинского осмотра предъявляла жалобы на головную боль, нарушение памяти, раздражительность, плаксивость, снижениеработоспособности, нарушение сна, дрожание пальцев рук. При осмотре выявлено равномерное оживление сухожильных рефлексов, тремор пальцев вытянутых рук(ассиметричный), выраженный красный дермографизм, общий гипергидроз. Пульс -96 уд/мин, АД - 150/100 мм рт ст. По данным РЭГ сосудов головного мозга: значительное снижение пульсового кровотока, замедление по сосудам мелкого калибра и повышение их тонуса, затруднение венозного оттока. На глазном дне: вены расширены, полнокровны, артерии спазмированы; симптом Гвиста положителен.

	Задание: 1. Установите предварительный диагноз. 2. напишите план обследования. 3. назначьте лечение; 4. проведите ВТЭК; 5. дайте рекомендации по профилактике ртутных отравлений.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 23** Больной Л., 43 года, работает в совхозе водителем грузового автотранспорта. Нередко ему приходится производить ремонтные работы автомашины, при этом обычно наблюдается загрязнение рук смазочными материалами, двигательным топливом. В анамнезе простудные заболевания. Спустя 15 лет после начала работы стал замечать появление головной боли в виде кризов по типу мигреней, головокружение, нарушение сна (чуткий сон, бессонница). В дальнейшем появились раздражительность, чувство страха, ощущение волоса во рту, ползания насекомых по телу, кошмарные сновидения. В ОАК: лейкоциты-2. $8x10^9$/л, лимфоциты-40%. На ЭКГ - нарушение внутрижелудочковой проводимости. *Задание:* 1. сформулируйте и обоснуйте диагноз; 2. выделите ведущие клинические синдромы заболевания; 3. перечислите все стадии заболевания; 4. назначьте лечение; 5. проведите ВК
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 24** Больной Щ., 38 лет, имеет " пылевой" стаж работы обрубщиком 16 лет. Концентрация пыли на его рабочем месте превышает ПДК в 8-10 раз. Во время периодического медицинского осмотра предъявлял жалобы на кашель, преимущественно сухой, изредка с небольшим количеством слизистой мокроты, который стал его беспокоить около 2-3 лет назад. За медицинской помощью не обращался. Респираторных заболеваний ранее не было. Не курит. Объективно: перкуторный звук в нижних отделах с коробочным оттенком, подвижность нижних крав легких не изменена, дыхание жесткое, прослушиваются непостоянные рассеянные сухие хрипы. Флюорограмы легких без отклонений от нормы. Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ составляет 90% от ДЖЕЛ, проба Тиффно 81%. Газы крови - Ра О2:80 мм рт ст. В бронхиальном секрете: IgA 0. 2 г/л; низкий уровень интерферона, лизоцима, лактоферина. *Задание:* 1. поставьте предварительный диагноз;

	2. напишите развернутый план обследования; назначьте комплексное лечение согласно Федеральной программе Всероссийского общества пульмонологов; перечислите препараты базисной терапии; дайте рекомендации относительно дальнейшей трудоспособности пациента.
ОПК-9 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-10	**СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 25** Больная Ж., 35 лет, работает на заводе резино -технических изделий 12 лет, имеет контакт с растворителями, содержащими бензол, концентрации которого в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в 3 раза. В последнее время отмечает повышенную раздражительность, слабость, слезливость, быструю утомляемость. При объективном осмотре патологии не выявлено. Общий анализ крови: Эр. -3. $5x10^{12}$/л, НВ-100 г/л, Л-2. $8x10^{9}$/л, тромбоциты $150x10^{9}$/л, СОЭ-20 мм/ч. Б/х крови: сулемовая проба-1 ед., гамма-глобулины-20 г/л. На УЗИ -данные за дискинезию желчевыводящих путей. *Задание:* 1. поставьте диагноз; 2. перечислите ведущие клинические синдромы; 3. назначьте лечение; 4. какие виды лечения целесообразно выделить; 5. дайте рекомендации относительно дальнейшей трудоспособности пациента.

Приложение 1

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Факультетская терапия, профессиональные болезни»

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине «Факультетская терапия, профессиональные болезни», как основной формы проверки знаний обучающихся, предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую эффективность оценочной процедуры. Важнейшие среди них:

1) обеспечить самостоятельность ответа обучающегося по билетам одинаковой сложности требуемой программой уровня;
2) определить глубину знаний программы по предмету;
3) определить уровень владения научным языком и терминологией;
4) определить умение логически, корректно и аргументированно излагать ответ на зачете;
5) определить умение выполнять предусмотренные программой задания.

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:

- глубокое и систематическое знание всего программного материала;
- свободное владение научным языком и терминологией;
- логически корректное и аргументированное изложение ответа;
- умение выполнять предусмотренные программой задания.

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:

- знание важнейших разделов и основного содержания программы;
- умение пользоваться научным языком и терминологией;
- в целом логически корректное, но не всегда аргументированное изложение ответа;
- умение выполнять предусмотренные программой задания.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:

- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов и основного содержания программы;
- затруднения в использовании научного языка и терминологии;
- стремление логически, последовательно и аргументированно изложить ответ;
- затруднения при выполнении предусмотренных программой заданий.

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:

- незнание вопросов основного содержания программы;
- неумение выполнять предусмотренные программой задания.

Приложение 1

ПРОТОКОЛЫ
экспертизы оценочных материалов дисциплины «Факультетская терапия, профессиональные болезни» по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело»

г. Уфа 28.06.2019 года

Фонды оценочных материалов (ФОМ) разработаны в соответствии с Положением по разработке, подготовке и оформлению оценочных материалов ФГБОУ ВОБГМУ Минздрава России. Фонд оценочных материалов по дисциплине «Факультетская терапия, профессиональные болезни» утвержденрешением Ученого совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 28. 06. 2019г. (протокол № 10).

В ходе экспертизы установлено:

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют ФГОС ВО.
2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформированности компетенций.
3. Материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания:валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций.
4. Объем ФОМ (ФОС) соответствует учебному плану направления подготовки 31.05.01 Лечебное дело.
5. Содержание ФОМ (ФОС) соответствует целям ООП по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, профстандартам (при наличии), будущей профессиональной деятельности обучающихся.
6. Качество ФОМ(ФОС) обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения.
7. Качество ФОМ(ФОС) подтверждается следующими экспертными заключениями:

- А. Я. Кравченко– д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко Минздрава России.

- И. А. Казакова– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней с курсами лучевых методов диагностики и лечения, ВПТ ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России.

Общие выводы:

На основании проведенной экспертизы оценочных материалов можно сделать заключение о том, что ФОМ(ФОС)дисциплины «Факультетская терапия, профессиональные болезни» по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело, ООП 31.05.01 Лечебное дело позволяет установить соответствие уровня подготовки обучающихся результатам освоения ООП, а именно:

- оценить результаты освоения ООП по дисциплине «Факультетская терапия, профессиональные болезни» (по модулям «Факультетская терапия» и «Профессиональные болезни»);

- выявить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций на этапе освоения дисциплины «Факультетская терапия, профессиональные болезни»,определенных ООП с учетом ФГОС ВО.

Председатель ЦМК терапевтических дисциплин
протокол №7
от 19.06. 2019г.

подпись *Л.В. Волевач*

Председатель УМС специальности Лечебное дело
протокол № 7от 28.06. 2019г.

подпись *Д.А. Валишин*

Дата

МП

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Деканат лечебного факультета

Приложение 1

Образец билета для промежуточной аттестации по дисциплине «Факультетская терапия, профессиональные болезни»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

Специальность 31. 05. 01 Лечебное дело
Очная форма обучения
Дисциплина «Факультетская терапия, профессиональные болезни»
Модуль «Факультетская терапия»

Экзаменационный билет№ 1

1. Хронический необструктивный бронхит. Этиология, патогенез, классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.
2. ИБС: внезапная коронарная смерть. Причины развития. Неотложная помощь.
3. Ситуационная задача 1

Промежуточная аттестация
Весенняя экзаменационная сессия
2019-2020 учебного года

Зав. кафедрой
профессор _____ Мирсаева Г. Х.

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

Специальность –31. 05. 01 Лечебное дело
Очная форма обучения
Дисциплина «Факультетская терапия, профессиональные болезни»
Модуль «Факультетская терапия»

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1

Больной П. 18 лет, учащийся, 3 недели тому назад выписан из инфекционной больницы, где лечился по поводу скарлатины. После переохлаждения заметил уменьшение выделения и изменение цвета мочи.

Объективно: кожные покровы бледные. Пастозность лица. В легких везикулярное дыхание. Пульс 100 в мин., ритмичный. АД - 120/90 мм рт. ст. Границы сердца не изменены. Тоны сердца чистые, звучные. Печень не увеличена. Почки не пальпируются. Симптом поколачивания в проекции почек слабо положительный с обеих сторон.

Данные лабораторных исследований:

Анализ крови: Эр. - 3, 6 $\cdot 10^{12,}$ Нв. - 109 г/л, Цв. п. - 0, 9; Л. - 9 $\cdot 10^{9}$ /л, э. -4% n-3%, с - 60%, лимф. - 25%, мон. - 8%, СОЭ - 30 мм/час.

Мочевина крови - 6, 67 ммоль/л, креатинин - 156 мкмоль/л, фибриноген - 4 г/л, холестерин - 4, 16 ммоль/л, СРБ ++

Анализ мочи: цвет имеет красноватый оттенок, уд. вес 1026, белок 0, 99‰, эр. - свежие и выщелоченные сплошь в п. зр. Клубочковая фильтрация при пробе Реберга-Тареева - 70 мл/мин.

ЭКГ - Синусовая тахикардия.

Осмотр окулиста: Глазное дно не изменено.

Вопросы:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Назовите заболевания, при которых чаще всего встречается гематурия.
3. Объясните патогенез заболевания.
4. Какие осложнения характерны для данного заболевания?
5. Показана ли больному “пульс-терапия”?
6. Назначьте патогенетическое лечение (выпишите рецепты).
7. Какие методы определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) используются в клинической практике.
8. Назовите курорты Башкортостана для лечения больных с данной патологией.

Промежуточная аттестация
Весенняя экзаменационная сессия
2019-2020учебного года

Зав. кафедрой
профессор _____ Мирсаева Г. Х.